

А. Киселевъ.

КРАТКАЯ
АЛГЕБРА
ДЛЯ
ЖЕНСКИХЪ ГИМНАЗІЙ
И
ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЙ.

Со многими примѣрами и упражненіями.

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ИЗДАНИЕ.

Рекомендована Учебн. Ком. при Св. Синодѣ для употребленія въ духовныхъ семинаріяхъ въ качествѣ **учебника** по алгебрѣ («Церк. Вѣд.», 1897 г., № 10).


Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просв. **допущена** въ качествѣ **руководства** для женскихъ гимназій («Журн. М. Н. Пр.», мартъ, 1914).

ИЗДАНИЕ
Т-ва „В. В. ДУМНОВЪ, наслѣдн., бр. САЛАЕВЫХЪ“.

МОСКВА,
Мясницкая улица, д. № 5.

ПЕТРОГРАДЪ,
Большая Конюшенная, № 1.

1915.



6599-A

Предисловіе къ 1-му изданію.

Предлагаемая «Краткая алгебра» составлена примѣнительно къ программамъ духовныхъ семинарій по плану моей «Элементарной алгебры» (седьмое изданіе), одобренной Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Пр. въ качествѣ руководства для гимназій и реальныхъ училищъ и рекомендованной Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ для употребленія въ духовныхъ семинаріяхъ въ качествѣ учебного пособия. Книжка содержитъ въ себѣ только то, что полагается пройти въ курсѣ духовныхъ семинарій; сверхъ того она содержитъ многіе примѣры, упражненія и задачи, расположенные систематически по параграфамъ учебника. Вслѣдствіе такого расположенія преподаватель можетъ къ каждому уроку задавать ученикамъ упражненія, прямо относящіяся къ содержанію объясненнаго въ классѣ. Составляя упражненія и задачи (главнымъ образомъ по французскимъ руководствамъ: *L. Lamay—Eléments d'Algèbre*, *Bourget—Cours d'Algèbre*, *Ch. Vacquant—Eléments d'Algèbre*, *Hue et Vagnier—Algèbre*, *Ritt—Problèmes d'Algèbre* и другимъ), я старался избѣгать слишкомъ сложныхъ комбинацій, имѣя въ виду, что отъ воспитанника духовной семинаріи достаточно требовать усвоенія лишь главнѣйшихъ основъ алгебры, а не навыка въ сложныхъ практическихъ примѣненіяхъ. Количество прилагаемыхъ упражненій, какъ кажется, вполне достаточно для этой цѣли; ученики, про-

МОСКВА.

Типографія Т-ва Рябушинскихъ, Страстной бул., Путинковский пер., соб. д.
1915.

ходящіе алгебру по этому руководству, могут обойтись без особаго задачника по этому предмету.

Считаемъ пужнымъ добавить, что изложеніе этого краткаго учебника отличается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отъ изложенія моей «Элементарной алгебры» болшею простотою и наглядностью въ объясненіяхъ. Кромѣ того, такъ какъ по программамъ духовныхъ семинарій не полагается прохожденія статьи объ изслѣдованіи уравненій, въ которой по преимуществу уясняется смыслъ отрицательныхъ рѣшеній, я счелъ нужнымъ въ самомъ началѣ алгебры указать на важное значеніе отрицательныхъ и положительныхъ чиселъ для выраженія величинъ прямо противоположныхъ. Въ примѣрахъ на составленіе уравненій я счелъ полезнымъ привести и такіе, въ которыхъ получается отрицательное рѣшеніе.

Второе изданіе представляетъ собою повтореніе перваго (съ устраненіемъ замѣченныхъ опечатокъ) и, кромѣ того, **дополнено** нѣкоторыми новыми статьями, а именно: простѣйшіе случаи уравненій, приводимыхъ къ квадратнымъ или къ уравненіямъ первой степени, извлеченіе кубическихъ корней изъ чиселъ, дѣйствія надъ радикалами, обобщеніе понятія о показателѣ и логарисмы съ нѣкоторыми примѣненіями. Помѣщая эти статьи, мы преслѣдовали двѣ цѣли: 1) сдѣлать учебникъ годнымъ для употребленія **въ женскихъ гимназіяхъ** Мин. Нар. Просвѣщенія и вообще въ учебныхъ заведеніяхъ съ курсомъ алгебры, болѣе краткимъ, чѣмъ въ мужскихъ гимназіяхъ, и 2) дать возможность любознательнымъ ученикамъ духовныхъ семинарій (напр., поступающимъ въ университеты) дополнить свои свѣдѣнія по математикѣ самыми важными элементами алгебры, не прибѣгая къ другому руководству по этому предмету. Дополненія, какъ и всѣ статьи собственно курса духовныхъ

семинарій, изложены по возможности просто и кратко и снабжены достаточнымъ количествомъ упражненій. Цѣна книги оставлена безъ измѣненія.

Предисловіе къ 12-му изданію.

12-е изданіе «Краткой алгебры» въ двухъ первыхъ своихъ отдѣлахъ («Предварительныя понятія» и «Первыя четыре алгебраическія дѣйствія») значительно измѣнено въ соотвѣтствіи съ переработаннымъ 23-мъ изданіемъ нашей «Элементарной алгебры» (вышедшимъ въ 1911 г.). Измѣненію, главнымъ образомъ, подверглось изложеніе положительныхъ и отрицательныхъ чиселъ. Характеръ этого измѣненія указанъ въ слѣдующихъ словахъ предисловія къ упомятому 23-му изданію:

«Прежняя, искусственно введенная, условность въ изложеніи чиселъ отрицательныхъ теперь устранена; въ настоящемъ изданіи числа эти рассматриваются конкретно, какъ символы для выраженія величинъ, имѣющихъ «направленіе», т.-е. такихъ величинъ, которыя могутъ быть понимаемы въ двухъ противоположныхъ смыслахъ. Хотя въ такомъ видѣ изложеніе теряетъ ту краткость, которую оно имѣло прежде, но зато оно въ значительной степени выигрываетъ въ ясности и въ легкости усвоенія; да и потеря въ краткости отчасти вознаграждается тѣми сокращеніями въ дальнѣйшемъ курсѣ (при изложеніи первыхъ четырехъ алгебраическихъ дѣйствій и изслѣдованія уравненій), какія возможно было ввести, благодаря болѣе подробному изложенію отрицательныхъ чиселъ».

«Изложеніе какъ чиселъ отрицательныхъ, такъ и несоизмѣримыхъ, ведется нами все время при помощи графическаго представленія чиселъ на числовой прямой и, слѣд.,

иллюстрируется соответствующими наглядными чертежами».

Вследствие указанных изменений пришлось переменить нумерацию параграфов учебника, а также до некоторой степени (въ предѣлахъ первыхъ двухъ сотенъ) и нумерацию упражненій.

Для 13-го изданія были тщательно просмотрѣны и исправлены всѣ отвѣты на задачи и упражненія и устранены всѣ замѣченныя опечатки; кромѣ того, добавлены нѣкоторыя новыя задачи (напр., №№ 583—588).

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіе.

Предварительныя понятія.

	Стр.
Алгебраическое знакоположеніе	1
Главнѣйшія свойства первыхъ четырехъ ариметическихъ дѣйствій.	8
Положительныя и отрицательныя числа	12
Раздѣленіе алгебраическихъ выраженій.	51
Приведеніе подобныхъ членовъ.	56

Первыя четыре алгебраическія дѣйствія.

Алгебраическое сложеніе и вычитаніе.	59
Алгебраическое умноженіе	64
Умноженіе расположенныхъ многочленовъ.	68
Нѣкоторыя формулы умноженія двучленовъ	71
Алгебраическое дѣленіе.	75
Разложеніе многочленовъ на множителей.	86
Алгебраическія дроби	89

Уравненія первой степени.

Общая начала рѣшенія уравненій	100
Уравненіе съ однимъ неизвѣстнымъ	110
Система двухъ уравненій съ двумя неизвѣстными	118
Система трехъ и болѣе уравненій со многими неизвѣстными	124
Уравненія неопредѣленныя, несовмѣстныя и условныя.	131

Степени и корни.

Возвышеніе въ степень одночленовъ	134
Возвышеніе въ квадратъ многочленовъ	137
Возвышеніе въ квадратъ цѣлыхъ чиселъ	138

	<i>Стр.</i>
Извлечение корня изъ одночленовъ	140
Извлечение квадр. корня изъ наибольшаго цѣлаго квадрата, заключающагося въ данномъ числѣ	146
Извлечение приближенныхъ квадратныхъ корней	154
Извлечение квадр. корня изъ дробей	158
Квадратное уравненіе	160

Отношеніе, пропорція и прогрессіи.

Отношеніе и пропорція	171
Ариѳметическая прогрессія	178
Геометрическая прогрессія	184
Безконечная геометрическая прогрессія	187

ДОПОЛНЕНІЯ.

Нѣкоторыя уравненія, приводимыя къ квадратнымъ или къ уравненіямъ 1-й степени.

Освобожденіе уравненія отъ радикаловъ	191
Биквадратное уравненіе	195
Простѣйшіе случаи двухъ уравненій второй степени	196

Извлечение кубическаго корня.

Извлечение кубическаго корня изъ наибольшаго цѣлаго куба, заключающагося въ данномъ числѣ	198
Извлечение приближенныхъ куб. корней	203
Извлечение кубическихъ корней изъ дробей	206

Дѣйствія надъ радикалами

Отрицательные и дробные показатели

Логариомы

Сложные проценты

Отвѣты на задачи и упражненія	248
---	-----

Предварительныя понятія.

Алгебраическое знакоположеніе.

1. Употребленіе буквъ. Если желаютъ указать, какъ рѣшаются задачи, сходныя между собою по условіямъ, но различающіяся только величиною данныхъ чиселъ, то обыкновенно поступаютъ такъ: обозначаютъ данныя числа буквами (латинскаго или французскаго алфавита) и, рассуждая совершенно такъ, какъ если бы данныя были выражены числами, указываютъ посредствомъ знаковъ, какія дѣйствія надо произвести надъ данными числами и въ какой послѣдовательности, чтобы получить искомое число. При этомъ, обозначивъ одно число какою-нибудь буквою, другія числа обозначаютъ иными буквами, чтобы не смѣшать одного числа съ другимъ. Пусть, напр., мы желаемъ указать, какъ находятся процентныя деньги съ даннаго капитала за данное время. Тогда предлагаемъ задачу въ такомъ общемъ видѣ:

a руб. отдапы въ ростъ по $p\%$; опредѣлить процентныя деньги за t лѣтъ.

Капиталь отдапы по $p\%$ (напр., по 5%); это значитъ, что каждый рубль приноситъ въ годъ дохода $p/100$ руб. (т.-е. p копѣекъ); поэтому a рублей принесутъ въ годъ дохода $p/100 \times a$ (руб.), а въ t лѣтъ этотъ доходъ будетъ

$p/100 \times a \times t$ (руб.). Значить, обозначивъ искомыя процентныя деньги буквою x (руб.), мы можемъ написать:

$$x = \frac{p}{100} \times a \times t.$$

Изъ этого выраженія видно, что для рѣшенія задачи надо число процентовъ раздѣлить на 100 и полученное частное умножить на число рублей капитала и на число лѣтъ, за которое требуется вычислить процентныя деньги. Напр., процентныя деньги съ 3720 руб., отданныхъ по 4% на $5\frac{1}{2}$ лѣтъ, будутъ:

$$x = \frac{4}{100} \times 3720 \times \frac{11}{2} = \frac{4 \times 3720 \times 11}{100 \times 2} = 818 \text{ р. } 40 \text{ коп.}$$

2. Алгебраическое выраженіе. Совокупность чиселъ, изъ которыхъ всѣ или нѣкоторые выражены буквами и которыя соединены посредствомъ знаковъ, указывающихъ, какія дѣйствія и въ какой послѣдовательности надо произвести надъ этими числами, называется алгебраическимъ выраженіемъ.

Таково, напр., выраженіе: $p/100 \times a \times t$.

Вычислить алгебраическое выраженіе для данныхъ численныхъ значеній буквъ значитъ подставить въ него на мѣсто буквъ эти значенія и произвести указанныя дѣйствія; число, получившееся послѣ этого, наз. **численною величиною** алгебраическаго выраженія.

3. Тожественныя выраженія. Алгебраическія выраженія наз. **тождественными**, если при всякихъ численныхъ значеніяхъ буквъ они имѣютъ одну и ту же численную величину. Таковы, напр., выраженія.

$$\frac{p}{100} \times a \times t \text{ и } \frac{p \times a \times t}{100}.$$

4. Предметъ алгебры. Алгебра указываетъ способы, посредствомъ которыхъ можно одно алгебраическое выраженіе преобразовать въ другое, тождественное ему. Цѣль такого преобразованія различна:

или 1) упрощеніе алгебраическаго выраженія, т.-е. замѣна одного выраженія другимъ, содержащимъ меньшее число дѣйствій, или болѣе простыхъ дѣйствій;

или 2) приведеніе алгебраическаго выраженія къ виду, удобному для обнаруженія какихъ-либо свойствъ его;

или 3) приведеніе алгебраическаго выраженія къ виду, удобному для запоминанія.

О другихъ сторонахъ алгебры будетъ сказано впоследствии.

5. Дѣйствія, разсматриваемыя въ алгебрѣ, суть слѣдующія: сложеніе, вычитаніе, умноженіе, дѣленіе, возвышеніе въ степень и извлеченіе корня. Определенія первыхъ четырехъ дѣйствій извѣстны изъ ариѳметики, а именно:

Сложеніе есть дѣйствіе, посредствомъ котораго нѣсколько данныхъ чиселъ соединяются въ одно число, называемое ихъ **суммою**.

Вычитаніе есть дѣйствіе (обратное сложенію), посредствомъ котораго по данной суммѣ (уменьшаемому) и одному слагаемому (вычитаемому) отыскивается другое слагаемое (остатокъ или разность).

Умноженіе на цѣлое число есть дѣйствіе, посредствомъ котораго одно данное число (множимое) повторяется слагаемымъ столько разъ, сколько единицъ въ другомъ данномъ числѣ (во множителѣ); **умноженіе на дробь** есть дѣйствіе, посредствомъ котораго отыскивается такая дробь множимаго, какую множителъ составляетъ отъ единицъ.

Дѣленіе есть дѣйствіе (обратное умноженію), посредствомъ котораго по данному произведенію (дѣлимому) и одному сомножителю (дѣлителю) отыскивается другой сомножитель (частное).

Два остальныхъ дѣйствія опредѣляются такъ:

Возвышеніе въ степень есть дѣйствіе, посредствомъ котораго находится произведеніе одинаковыхъ сомножителей; это произведеніе называется степенью, а число одинаковыхъ сомножителей—показателемъ степени. Такъ, возвысить 2 въ четвертую степень, значитъ найти произведеніе $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$; 16 есть четвертая степень 2-хъ, 4—показатель этой степени. Вторая степень называется иначе квадратомъ, третья—кубомъ. Первою степенью числа называютъ само это число.

Извлеченіе корня есть дѣйствіе (обратное возвышенію въ степень), посредствомъ котораго по данной степени и показателю этой степени находится возвышаемое число. Напримѣръ, извлечь изъ 8 корень третьей степени значитъ найти число, которое, возвышенное въ 3-ю степень, составляетъ 8; такое число есть 2, потому что $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$; корень второй степени изъ 100 есть 10, потому что $10 \cdot 10 = 100$. Корень второй степени называется иначе квадратнымъ, а корень третьей степени—кубическимъ.

6. Знаки, употребляемые въ алгебрѣ.

Для обозначенія первыхъ четырехъ дѣйствій въ алгебрѣ употребляются тѣ же знаки, какъ и въ ариѳметикѣ; только знакъ умноженія обыкновенно не пишется, если оба сомножителя или одинъ изъ нихъ выражены буквами; напр., вмѣсто того, чтобы писать $a \cdot b$, обыкновенно пишутъ ab , и вмѣсто $3 \cdot a$ просто $3a$.

Возвышеніе въ степень обозначается такъ: показателя степени пишутъ надъ возвышаемымъ числомъ, съ правой стороны; напр., 2^4 означаетъ, что 2 возвышается въ 4-ю степень. При всякомъ числѣ можно подразумѣвать показателя 1; напр., a все равно, что a^1 , потому что первая степень числа, по опредѣленію, есть само число.

Извлеченіе корня обозначается знакомъ $\sqrt{\quad}$; подъ его горизонтальной чертой пишутъ то число, изъ котораго надо извлечь корень, а надъ отверстіемъ угла ставятъ показателя корня; напр., $\sqrt[3]{8}$ означаетъ корень 3-й степени изъ 8. Квадратный корень принято писать безъ показателя, т.-е. такъ: $\sqrt{25}$, $\sqrt{100}$ и т. д.

Какъ знаки соотношеній между численными величинами употребительны: знакъ равенства $=$ и знакъ неравенства $>$, обращаемый отверстіемъ угла къ большому числу. Напримѣръ, выраженія:

$$5+2=7; 5+2>6; 5+2<10$$

означаютъ: $5+2$ равно 7; $5+2$ больше 6; $5+2$ меньше 10.

Иногда помѣщаются два знака другъ подъ другомъ; напр., выраженія:

$$1) a \geq b; 2) a \leq b; 3) a \pm b$$

означаютъ: 1) a больше или равно b ; 2) a больше или меньше b ; 3) a плюс или минусъ b .

Употребительны еще знаки \neq , \triangleright , \triangleleft , получаемые перечеркиваніемъ знаковъ равенства или неравенства. Такое перечеркиваніе означаетъ отрицаніе того значенія, которое придается знаку перечеркнутому. Такъ, знакъ \neq означаетъ: «не равно», знакъ \triangleright означаетъ «не больше» и т. п.

6. а. Формула. Два алгебраическія выраженія, соединенныя между собою знакомъ равенства или неравенства, образуютъ формулу.

Напр., при рѣшеніи задачи, указанной въ параграфѣ первомъ, получается формула:

$$x = \frac{p}{100} \times a \times t.$$

7. Скобки. Если желаютъ выразить, что, совершивъ какое-либо дѣйствіе, надо надъ полученнымъ результатомъ произвести снова какое-либо дѣйствіе, то обозначеніе перваго дѣйствія заключаютъ въ скобки. Напр., выраженіе:

$$20 - (10 + 2)$$

означаетъ, что изъ 20 вычитается не 10, а сумма отъ сложенія 10 съ 2; слѣд., при вычисленіи этого выраженія надо сначала сложить 10 и 2 (получимъ 12) и затѣмъ полученную сумму вычесть изъ 20 (получимъ 8).

Когда приходится заключить въ скобки такое выраженіе, въ которомъ есть свои скобки, то новымъ скобкамъ придають другую форму для отличія ихъ отъ прежнихъ. Напр., выраженіе:

$$a\{b - [c + (d - e)]\}$$

означаетъ, что изъ d вычитается e , полученная разность прикладывается къ c , полученная сумма вычитается изъ b и на эту разность умножается a .

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ принято скобки опускать. Напр., скобки не ставятся при обозначеніи послѣдовательныхъ сложений, вычитаній, умноженій; такъ:

$$\begin{array}{l} \text{вмѣсто } [(a+b)+c]+d \text{ пишутъ } a+b+c+d; \\ \text{» } [(a-b)+c]-d \quad \text{»} \quad a-b+c-d; \\ \text{» } [(ab)c]d \quad \quad \quad \text{»} \quad abcd. \end{array}$$

Въ этихъ случаяхъ порядокъ дѣйствій указывается самимъ выраженіемъ (слѣва направо).

Упражненія.

Къ § 1.

1. Капиталь a руб. отданъ въ ростъ по $p\%$. Определить процентныя деньги за t дней (считая въ году 360 дней, какъ это принято въ коммерческихъ вычисленіяхъ).

2. Смѣшано три сорта чаю: перваго сорта a фунт., втораго b фунт. и третьяго c фунт.; каждый фунтъ перваго сорта стоитъ m руб., втораго сорта n руб. и третьяго сорта p руб. Определить цѣну фунта смѣси.

3. Вексель въ 3500 руб. учтенъ за 48 дней до срока по 8% . Определить учетъ и сумму, уплаченную по векселю (годъ = 360 дней).

Вексель въ a руб. учтенъ за t дней до срока по $p\%$. Определить учетъ и сумму, уплаченную по векселю.

Къ § 6.

4. Выразить посредствомъ знаковъ, принятыхъ въ алгебрѣ: 1) сумму чиселъ a , b и c ; 2) разность чиселъ m и n ; 3) произведеніе чиселъ p , q и r ; 4) квадратъ числа x , кубъ числа y ; 5) корень квадратный изъ числа a , корень кубическій изъ числа b ; 6) сумму квадратовъ чиселъ x и y ; 7) произведеніе квадрата числа m на кубъ числа n .

Къ § 7.

5. Найти численныя величины слѣдующихъ выраженій при $a=25$, $b=8$ и $c=3$: 1) $(a+b)c$, 2) $(a+b)(a-b)$, 3) $\frac{a+b}{c}$,

4) $(a+b):(b+c)$, 5) a^2+b^3 , 6) $(a+b)^2$, 7) a^2+b^2 , 8) $\sqrt{a}-\sqrt[3]{b}$.

6. Проверить слѣдующія равенства при $a=10$, $b=2$:

$$1) (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2; \quad 2) (a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$

7. Вычислить слѣдующія выраженія при $x=100$, $y=20$:

$$\begin{array}{l} 1) x - \{y + [x + y - (x - y)] + 2\} \\ 2) xy + [x^2 - (x - y)^2]. \end{array}$$

8. Выразить посредствомъ алгебраическихъ знаковъ: 1) разность квадратовъ чиселъ a и b ; 2) квадратъ разности чиселъ a и b ; 3) произведеніе суммы чиселъ a и b на ихъ разность; 4) частное отъ дѣленія суммы кубовъ чиселъ a и b на кубъ суммы этихъ чиселъ.

Главнѣйшія свойства первыхъ четырехъ ариѳметическихъ дѣйствій.

8. Свойства сложения и умножения. Изъ свойствъ этихъ дѣйствій укажемъ слѣдующія:

1°. Сумма не измѣняется отъ перемѣны порядка слагаемыхъ.

Напр., сумма $7+3+2$ равна 12; если измѣнимъ какъ бы то ни было порядокъ слагаемыхъ, напр., такъ $3+2+7$, то получимъ все ту же сумму 12.

Свойство это въ примѣненіи въ трехъ слагаемыхъ мы можемъ выразить такою буквенною формулою (обозначая буквами a , b и c какія-нибудь три числа):

$$a+b+c=a+c+b=b+a+c=b+c+a=...$$

Это свойство называется **перемѣстительнымъ**, такъ какъ оно состоитъ въ неизмѣняемости суммы отъ перемѣненія слагаемыхъ.

2°. Сумма не измѣнится, если нѣсколько слагаемыхъ мы замѣнимъ ихъ суммою.

Напр., сумма $12+3+7$, равная 22, не измѣнится, если въ ней какія-нибудь слагаемыя, напр., второе и третье, замѣнимъ ихъ суммой: $12+(3+7)=12+10=22$.

Свойства это называется **сочетательнымъ**, такъ какъ оно состоитъ въ томъ, что нѣсколько слагаемыхъ, не измѣняя суммы, мы можемъ сочетать (соединять) въ одно число.

Въ примѣненіи къ трехъ слагаемымъ сочетательное свойство мы можемъ выразить такой формулою:

$$a+b+c=a+(b+c).$$

Читая это равенство справа налѣво, т.-е. такъ: $a+(b+c)=a+b+c$, мы можемъ высказать то же сочетательное свойство въ другой словесной формѣ:

чтобы къ какому-нибудь числу прибавить сумму, достаточно прибавить къ этому числу каждое слагаемое суммы одно за другимъ.

3°. Произведеніе не измѣняется отъ перемѣны порядка сомножителей.

Такъ: $2 \cdot \frac{5}{7} \cdot 3 = 2 \cdot 3 \cdot \frac{5}{7} = \frac{5}{7} \cdot 3 \cdot 2 = \dots$

Вообще: $abc = acb = cab = \dots$

Это перемѣстительное свойство умножения доказывается въ ариѳметикѣ сначала для цѣлыхъ чиселъ, а затѣмъ и для дробей.

4°. Произведеніе не измѣнится, если нѣсколько сомножителей мы замѣнимъ ихъ произведеніемъ.

Напр., произведеніе $7 \cdot 2 \cdot 5$, равное 70, останется безъ измѣненія, если сомножителей 2 и 5 замѣнимъ ихъ произведеніемъ: $7 \cdot (2 \cdot 5) = 7 \cdot 10 = 70$.

Въ примѣненіи къ произведенію трехъ сомножителей это сочетательное свойство умножения можно выразить такимъ равенствомъ:

$$abc = a(bc).$$

Читая это равенство справа налѣво, мы можемъ то же сочетательное свойство выразить иначе:

чтобы умножить какое-нибудь число (a) на произведеніе (bc), достаточно умножить это число на перваго сомножителя, результатъ умножить на втораго сомножителя и т. д.

5°. Чтобы умножить сумму на какое-нибудь число, достаточно умножить на это число каждое слагаемое отдѣльно и полученные произведенія сложить.

Такъ, чтобы умножить сумму $300+20+5$ (т.-е. число 325) на 8, достаточно умножить на 8 отдѣльно 300, 20 и 5 и полученные числа сложить.

Это свойство произведенія называется **распределительнымъ**, такъ какъ оно состоитъ въ томъ, что дѣйствие умноженія, производимое надъ суммой, распространяется на каждое слагаемое.

Въ примѣненіи къ суммѣ двухъ слагаемыхъ это свойство можно выразить такой формулой:

$$(a+b)c=ac+bc.$$

Такъ какъ произведеніе не мѣняется отъ перемѣны порядка сомножителей, то формулу эту можно писать и такъ:

$$c(a+b)=ca+cb.$$

Поэтому распределительное свойство иногда высказываютъ такъ: чтобы умножить какое-нибудь число на сумму, достаточно умножить это число на каждое слагаемое отдѣльно и полученные произведенія сложить.

9. Свойства вычитанія и дѣленія. Изъ свойствъ, принадлежащихъ обратнымъ дѣйствіямъ, укажемъ слѣдующія:

1°. Чтобы отнять отъ какого-нибудь числа сумму, достаточно отнять отъ этого числа каждое слагаемое одно за другимъ.

Такъ: $20-(3+8+2)=20-3-8-2.$

Вообще: $a-(b+c+d)=a-b-c-d.$

Это свойство можно приять за очевидное.

2°. Чтобы прибавить къ какому-нибудь числу разность, достаточно прибавить къ этому числу уменьшаемое и вычесть вычитаемое.

Такъ: $8+(5-3)=8+5-3.$

Вообще: $a+(b-c)=a+b-c.$

Дѣйствительно, если второе слагаемое увеличимъ на c , то-есть вмѣсто $b-c$ возьмемъ b , то получимъ сумму $a+b$;

но отъ увеличенія слагаемаго на c сумма увеличивается также на c ; слѣд., искомаая сумма должна быть меньше $a+b$ на c , т.-е. она будетъ $a+b-c$.

3°. Чтобы отнять отъ какого-нибудь числа разность, достаточно прибавить къ этому числу вычитаемое и затѣмъ отнять уменьшаемое.

Такъ: $4-(5-2)=4+2-5.$

Вообще: $a-(b-c)=a+c-b.$

Дѣйствительно, если мы увеличимъ уменьшаемое и вычитаемое на c , то разность не измѣнится; но тогда уменьшаемое будетъ $a+c$, а вычитаемое b ; слѣд., разность будетъ $a+c-b$.

4°. Чтобы раздѣлить какое-нибудь число на произведеніе, достаточно раздѣлить это число на перваго сомножителя, полученный результатъ на втораго, потомъ на третьяго, и т. д.

Такъ: $400:(4 \cdot 2 \cdot 5)=[(400:4):2]:5=(100:2):5=50:5=10.$

5°. Чтобы раздѣлить произведеніе на какое-нибудь число, достаточно раздѣлить на это число какого-либо одного сомножителя.

Такъ, чтобы раздѣлить произведеніе $10 \cdot 8$ на 2, достаточно раздѣлить на 2 или 10, или 8; въ первомъ случаѣ получимъ $5 \cdot 8=40$ и во второмъ случаѣ $10 \cdot 4=40$.

10. Примѣненіе этихъ свойствъ. Указанныя свойства позволяютъ дѣлать нѣкоторыя простѣйшія преобразованія алгебраическихъ выраженій; приведемъ этому примѣры:

1) $a+b+a+2+b+a+8=(a+a+a)+(b+b)+(2+8)=$
 $=a \cdot 3+b \cdot 2+10=3a+2b+10.$

2) $a+(b+a)=a+b+a=(a+a)+b=2a+b.$

3) $a.(3xxa).(4ay)=a \cdot 3 \cdot x \cdot x \cdot a \cdot 4 \cdot a \cdot y=(3 \cdot 4)(aaa)(xx)y=$
 $=12a^3x^2y.$

4) $a^3a^2=(aaa)(aa)=aaaaa=a^5.$

- 5) $(a+x+1) \cdot 3 = (a \cdot 3) + (x \cdot 3) + 3 = 3a + 3x + 3.$
 6) $x(ax^2+x) = x(ax^2) + xx = xaxx + xx = a(xxx) + xx = ax^3 + x$
 7) $m + (a-m) = m + a - m = a + m - m = a.$
 8) $p - (q-p) = p + p - q = 2p - q.$
 9) $\frac{9ab}{3} = \frac{9}{3}ab = 3ab.$

Упражнения.

9. Упростить слѣдующія выраженія (объяснить, какими свойствами приходится пользоваться въ каждомъ примѣрѣ)

$$a+b+a+b+a; \quad x+(a-x); \quad x-(x-y);$$

$$a+(a+b)-(b-a); \quad a(ax); \quad 5aaaabbbxxxx;$$

$$10a^3b^4 : 2ab; \quad 3x^2y \cdot 2x; \quad 15ab : 5; \quad 15a^3b : a^2.$$

Положительныя и отрицательныя числа.

11. Предварительное замѣчаніе. Въ началѣ курса ариметики мы рассматривали число только какъ собраніе единицъ; въ этомъ смыслѣ число представляется всегда цѣлымъ. Перейдя затѣмъ въ ариметикѣ къ болѣе широкому понятію о числѣ, какъ о результатѣ измѣренія величинъ, мы должны были расширить область чиселъ, введя понятіе о дробномъ числѣ. Это расширеніе дало намъ возможность выражать числами и такія значенія величинъ, въ которыхъ единица измѣренія не повторяется цѣлое число разъ, или которыя меньше этой единицы. Теперь, переходя отъ ариметики къ алгебрѣ, мы прежде всего займемся дальнѣйшимъ расширеніемъ понятія о числѣ съ цѣлью имѣть возможность выражать посредствомъ чиселъ величины особаго рода, о которыхъ мы будемъ говорить сейчасъ.

12. Понятіе о величинахъ, имѣющихъ направленіе. Задача 1. Когда курьерскій поѣздъ

Николаевской желѣзной дороги (соединяющей Москву съ Петроградомъ) находился на разстояніи 100 верстъ отъ станции Бологое (эта станція лежитъ приблизительно посрединѣ между Москвой и Петроградомъ), тогда пассажирскій поѣздъ этой дороги былъ на разстояніи 50 верстъ отъ Бологова. На какомъ разстояніи находились тогда эти два поѣзда другъ отъ друга?


Въ такомъ видѣ задача эта представляется не вполне определенной: въ пей не сказано, находились ли поѣзда по одну сторону отъ Бологова, на примѣръ, въ сторону по направленію къ Петрограду, или же они были по разнымъ сторонамъ отъ Бологова. Если первое, то разстояніе между поѣздами было, очевидно, 100—50, т.-е. 50 верстъ, а если второе, то это разстояніе было 100+50, т.-е. 150 верстъ. Значитъ для того, чтобы эта задача была определенною, недостаточно задать величину разстоянія поѣздовъ отъ Бологова, но еще пужно указать, въ какомъ направленіи эти разстоянія надо считать отъ Бологова.

Мы имѣемъ здѣсь примѣръ величины, въ которой, кромѣ ея размѣра, можно разсматривать еще направленіе; это—разстояніе, считаемое по какой-нибудь линіи (напр., по желѣзной дорогѣ) отъ определеннаго на ней мѣста (напр., отъ станціи Бологое). Разстояніе это можно считать и въ одномъ направленіи (напр., къ Москвѣ), и въ другомъ, противоположномъ (напр., къ Петрограду). Обыкновенныя (арифметическія) числа недостаточны для выраженія и размѣра, и направленія разстояній. Условимся въ подобныхъ случаяхъ поступать такъ.

Назовемъ какое-нибудь одно изъ двухъ направленій Николаевской дороги (напр., направленіе отъ Петрограда къ Москвѣ) положительнымъ, а противоположное направленіе (отъ Москвы къ Петрограду) отрицатель-

ны мѣ; сообразно этому разстоянію, считаемыя въ положительномъ направленіи, будемъ называть положительными разстояніями, а разстоянія, считаемыя въ отрицательномъ направленіи, будемъ называть отрицательными. Первые будемъ выражать числами со знакомъ $+$ (или вовсе безъ знака), а вторыя—числами со знакомъ $-$. Такъ, если поѣздъ находится въ мѣстѣ, отстоящемъ на 100 верстъ отъ Бологова по направленію къ Москвѣ, то мы будемъ говорить, что его разстояніе отъ Бологова равно $+100$ вер. (или просто 100 вер.); если же поѣздъ находится, положимъ, на 50 вер. отъ Бологова по направленію къ Петрограду, то мы скажемъ, что его разстояніе отъ Бологова равно -50 вер. Здѣсь знаки $+$ и $-$, конечно, не означаютъ дѣйствій сложения и вычитанія, а только служатъ условно для обозначенія направленій.

Выразимъ теперь нашу задачу такъ: когда курьерскій поѣздъ Николаевской желѣзной дороги находился отъ Бологова на разстояніи $+100$ вер. (или просто 100 вер), тогда пассажирскій поѣздъ этой дороги былъ отъ Бологова на разстояніи -50 вер. Какъ велико было тогда разстояніе между этими поѣздами? Теперь задача выражена вполне точно, и отвѣтъ на нее получается опредѣленный (см. черт. 1, на которомъ стрѣлка указываетъ положительное направленіе дороги): поѣзда находились на разстояніи $100+50$, т.-е. 150 верстъ.



Черт. 1.

Задача 2. Термометръ въ полночь показывалъ 2 градуса, а въ полдень 5 градусовъ. На сколько градусовъ измѣнилась температура отъ полуночи до полудня?

И въ этой задачѣ условія выражены недостаточно полно; надо еще указать, 2 градуса тепла или 2 градуса холода показывалъ термометръ въ полночь, т.-е. вершина ртутнаго столбика въ термометрѣ была въ полночь на 2 дѣленія выше, или на 2 дѣленія ниже той черты, на которой стоитъ 0° ; подобныя же указанія должны быть сдѣланы и относительно температуры въ полдень. Если и въ полночь, и въ полдень термометръ указывалъ тепло, то температура за этотъ промежутокъ времени повысилась отъ 2 до 5 градусовъ, значить, измѣнилась на 3 градуса; если же въ полночь термометръ указывалъ 2 градуса холода (ниже 0°), а въ полдень 5 градусовъ тепла (выше 0°), то температура повысилась на $2+5$, т.-е. на 7 градусовъ. Могло случиться и такъ, что въ полночь температура была 2° холода и въ полдень 5° тоже холода (тогда температура не повысилась, а понизилась на 3 градуса), или такъ, что въ полночь температура была 2° тепла, а въ полдень 5° холода (тогда температура понизилась на 7 градусовъ).

Въ этой задачѣ тоже рѣчь идетъ о величинѣ, имѣющей направленіе: число градусовъ температуры можно отсчитывать в в е р х ъ отъ нулевой черты термометра и в н и з ъ отъ нея. Принято температуру выше 0° (тепло) считать положительной и обозначать числомъ градусовъ со знакомъ $+$, а температуру ниже 0° (холодъ) считать отрицательной и обозначать числомъ градусовъ со знакомъ $-$ (не будетъ недоразумѣнія, если первое число брать совсѣмъ безъ знака). Напр., если говорить, что термометръ на воздухѣ показываетъ -2° , а въ комнатѣ $+12^{\circ}$ (или просто 12°), то мы понимаемъ, что въ первомъ случаѣ вершина ртутнаго столбика стоитъ ниже 0° на 2 дѣленія, а во второмъ случаѣ выше 0° на 12 дѣленій.

Выразимъ теперь нашу задачу, примѣрно, такъ: термометръ въ полночь показывалъ -2° , а въ полдень $+5^{\circ}$. На сколько градусовъ измѣнилась температура отъ полуночи до полудня? Въ такомъ видѣ задача получаетъ вполне опредѣленный отвѣтъ: температура повысилась на $2+5$, т.-е. на 7 градусовъ.

Задача 3. Промежутокъ времени, отдѣлявшій день рожденія Андрея отъ 1-го января (нѣкотораго года), былъ равенъ 63 днямъ, а промежутокъ времени, отдѣлявшій день рожденія Петра отъ того же 1-го января, составлялъ 46 дней. Сколько дней отдѣляло день рожденія Андрея отъ дня рожденія Петра?

Въ такомъ видѣ задача представляется неопредѣленной, такъ какъ неизвѣстно, родился ли Андрей на 63 дня раньше 1-го января, или же на 63 дня послѣ 1-го января; равнымъ образомъ не сказано въ задачѣ, былъ ли день рожденія Петра за 46 дней до 1-го января, или 46 дней позже этого числа. Если Андрей и Петръ оба родились раньше, или оба послѣ 1-го января, то день рожденія Петра отстоялъ отъ дня рожденія Андрея на $63-46$, т.-е. на 17 дней; если же Андрей родился раньше 1-го января, а Петръ послѣ этого числа (или наоборотъ), то ихъ дни рожденія раздѣлялись промежуткомъ въ $63+46$, т.-е. въ 109 дней.

Можно сказать, что и въ этой задачѣ рѣчь идетъ о величинѣ, имѣющей направленіе, хотя слову «направленіе» здѣсь нельзя придавать буквального значенія. Промежутокъ времени, отдѣлявшій день рожденія Андрея отъ 1-го января, можно понимать въ двухъ противоположныхъ смыслахъ (направленіяхъ): или какъ промежутокъ, слѣдовавшій за 1-мъ январемъ (тогда Андрей родился послѣ 1-го января), или какъ промежутокъ, предшествовавшій 1-му ян-

варя (тогда Андрей родился до 1-го января). То же самое можно сказать о промежуткѣ времени, отдѣлявшемъ день рожденія Петра отъ 1-го января.


Если условимся: промежутки времени, слѣдовавшіе за 1-мъ январемъ, считать положительными и выражать ихъ числами со знакомъ $+$ (или безъ знака), а промежутки времени, предшествовавшіе 1-му январю, считать отрицательными и выражать ихъ числами со знакомъ $-$, то задачу нашу можно высказать вполне точно, напр., такъ: промежутокъ времени, отдѣлявшій день рожденія Андрея отъ 1-го января былъ равенъ -63 днямъ, а промежутокъ времени, отдѣлявшій день рожденія Петра отъ того же 1-го января, составлялъ $+46$ дней. Сколько дней раздѣляли дни рожденія Андрея и Петра? Въ такомъ видѣ задача имѣетъ опредѣленный отвѣтъ: искомый промежутокъ равенъ $63+46=109$ днямъ.

Кромѣ величинъ, указанныхъ въ этихъ задачахъ (расстояніе, температура, промежутокъ времени), многія другія также имѣютъ «направленіе», т.-е. онѣ могутъ быть разсматриваемы въ двухъ противоположныхъ смыслахъ. Таковы, напримѣръ:

доходъ	въ	противоположномъ	смыслѣ	будетъ	расходъ;
выигрышъ	»	»	»	проигрышъ	
прибыль	»	»	»	убытокъ;	
имущество	»	»	»	долги и т.п.	

Если доходъ, выигрышъ, прибыль, имущество... условимся считать величинами положительными и выражать ихъ числами со знакомъ $+$ (или безъ знака), то расходъ, проигрышъ, убытокъ, долги... надо считать соответственно величинами того же рода, но отрицательными, и выражать ихъ числами со знакомъ $-$; тогда можно говорить, что расходъ есть отрицательный доходъ, проигрышъ есть отри-

6599-1



цательный выигрышъ, и т. д. При такомъ соглашеніи понятны будутъ, напр., слѣдующія словесныя выраженія: купецъ получилъ прибыли: въ январѣ +200 руб., въ февралѣ +150, въ мартѣ —50 рублей (значить, въ мартѣ купецъ получилъ убытку 50 руб.); или такія: у старшаго брата имущества было на +50000 руб., у средняго на +30000 руб., у младшаго на —5000 руб. (значить, у младшаго брата не было совсѣмъ имущества, а былъ долгъ въ 5000 руб.).

Должно однако замѣтить, что на ряду съ указанными величинами существуетъ очень много другихъ, въ которыхъ нельзя указать «направленія»; напр., нельзя понимать въ двухъ противоположныхъ смыслахъ такія величины, какъ объемъ, площадь, вѣсъ и многія другія.

13. Алгебраическія числа. Числа, рассматриваемыя въ ариметикѣ, служатъ для выраженія такихъ величинъ, которыя не имѣютъ «направленія», или которыхъ направленіе не рассматривается (когда, напр., интересуются знать только размѣръ какого-нибудь разстоянія, а не направленіе, по которому его надо считать). Числа же, рассматриваемыя въ алгебрѣ, служатъ для выраженія величинъ, имѣющихъ «направленіе», когда, помимо размѣра величины, хотятъ еще указать и ея направленіе. Для этого величину, понимаемую въ какомъ-нибудь одномъ смыслѣ, выражаютъ числомъ съ предшествующимъ ему знакомъ +, а ту же величину, понимаемую въ противоположномъ смыслѣ, выражаютъ числомъ съ предшествующимъ ему знакомъ —.

Число съ предшествующимъ ему знакомъ + (который, впрочемъ, можетъ быть и опускаемъ), наз. **п о л о ж и т е л ь н ы м ъ**; число съ предшествующимъ ему знакомъ — наз. **о т р и ц а т е л ь н ы м ъ**. Такъ, +10, $+\frac{1}{2}$, +0,3 положительные числа, а —8, $-\frac{5}{7}$, —3,25 отрицательныя

числа. Къ этимъ числамъ присоединяютъ еще 0 (нуль), не относя его ни къ положительнымъ, ни къ отрицательнымъ. Выраженія +0, —0 и просто 0 считаютъ равносильными.

Числа положительныя, отрицательныя и нуль мы будемъ называть **а л г е б р а и ч е с к и м и** числами (или **о т н о с и т е л ь н ы м и**) въ отличие ихъ отъ чиселъ **а р и м е т и ч е с к и х ъ** (или **о б ы к н о в е н н ы х ъ**), которыя не имѣютъ передъ собой никакого знака.

А б с о л ю т н о ю величиною алгебраическаго числа называется это число, взятое безъ знака; такъ, абсолютная величина числа —10 есть 10, абсолютная величина числа +5 есть 5; абсолютная величина нуля есть 0.

Два алгебраическихъ числа считаются **р а в н ы м и**, если у нихъ одинаковы абсолютныя величины и знаки; въ противномъ случаѣ числа считаются **н е р а в н ы м и**.

Должно помнить, что знаки + и —, входящіе въ обозначеніе алгебраическихъ чиселъ, не представляютъ собою знаковъ сложенія и вычитанія, а служатъ лишь знаками для указанія «направленія» измѣряемыхъ величинъ. Чтобы не могло произойти смѣшенія этихъ знаковъ со знаками сложенія и вычитанія, алгебраическое число вмѣстѣ съ его знакомъ заключаютъ въ скобки, напр., пишутъ такъ: $(+7)+(-3)$; въ такомъ изображеніи знаки, стоящіе внутри скобокъ, суть знаки алгебраическихъ чиселъ, а знакъ +, стоящій между скобками, есть знакъ сложенія.

Положительныя числа можно писать и безъ знака +; въ такомъ случаѣ они не будутъ отличаться отъ чиселъ арифметическихъ.

14. Изображеніе чиселъ помощью отрѣзковъ прямой. Для яснаго пониманія алгебраическихъ чиселъ полезно, говоря о такихъ числахъ, всегда представлять себѣ въ умѣ какія-нибудь изъ тѣхъ вели-


числѣ, для измѣренія которыхъ служатъ эти числа. Всего проще для этой цѣли брать отрѣзки прямой линіи, если условимся, помимо длины этихъ отрѣзковъ, принимать во вниманіе еще и ихъ направленіе.

Отрѣзкомъ прямой (черт. 2) наз. часть какой-нибудь прямой линіи, ограниченная съ обѣихъ сторонъ, напр., съ одной стороны точкою A , съ другой точкою B . Въ каждомъ отрѣзкѣ мы условимся различать: во-1-хъ, длину его (которая, конечно, можетъ быть больше и меньше), во-2-хъ, направленіе, которое для данного отрѣзка можетъ быть двойное. Напримѣръ, во взятомъ нами отрѣзкѣ можно различать направленіе или отъ точки A къ точкѣ B (слѣва направо), или, наоборотъ, отъ B къ A



Черт. 2.

(справа налѣво). Если мы разсматриваемъ взятый отрѣзокъ въ направленіи отъ A къ B , то точку A мы будемъ называть началомъ отрѣзка, а точку B его концомъ и будемъ обозначать такой отрѣзокъ такъ: AB , т.-е. сначала будемъ писать ту букву, которая обозначаетъ начало отрѣзка; если же за начало отрѣзка мы беремъ точку B , а за конецъ точку A , т.-е. если мы разсматриваемъ отрѣзокъ въ направленіи отъ B къ A , то мы его обозначимъ не AB , а BA .




Черт. 3.

Отрѣзки прямой, въ которыхъ, помимо ихъ длины, мы

обращаемъ вниманіе на направленіе, мы будемъ называть **направленными отрѣзками**.

Таковыми отрѣзками мы наглядно можемъ выражать алгебраическія числа слѣдующимъ образомъ. Возьмемъ какую-нибудь прямую (черт. 4) и условимся, какое изъ двухъ направленій этой прямой считать положительнымъ. Примемъ, напр., направленіе слѣва направо (указанное стрѣлкою) за положительное; тогда противоположное направленіе—справа налѣво—мы будемъ считать отрицательнымъ. Далѣе примемъ какую-нибудь длину, ab (изображенную на



Черт. 4.

чертежѣ) за единицу длины. Пусть теперь дано какое-нибудь положительное число, напр., $+5,4$. Возьмемъ на нашей прямой произвольную точку A и отложимъ вправо отъ нея $5,4$ единицы длины, равныхъ ab . Тогда получимъ отрѣзокъ AB , длина котораго равна $5,4$ единицамъ и направленіе положительное. Этотъ отрѣзокъ и выразитъ намъ наглядно число $+5,4$.


Возьмемъ теперь какое-нибудь отрицательное число, напр., -4 . Чтобы изобразить его наглядно, отложимъ отъ той же точки A влѣво 4 единицы длины. Тогда получимъ отрѣзокъ AC , котораго длина равна 4 единицамъ, а направленіе отрицательное; значить, этотъ отрѣзокъ выражаетъ число -4 .

Очевидно, что такимъ путемъ мы всякое алгебраическое число можемъ выразить (на самомъ дѣлѣ или только мысленно) направленнымъ отрѣзкомъ. Въ большинствѣ случаевъ нѣтъ надобности въ дѣйствительности откладывать какую-нибудь единицу длины, а достаточно только вообразить, что такое отложеніе сдѣлано.

Можно представить себѣ, что всѣ алгебраическія числа выражены направленными отрѣзками, отложенными на одной и той же прямой отъ одной и той же ея точки A , принятой за начало отрѣзковъ. Тогда на той части прямой, которая расположена направо отъ A , изобразится рядъ положительныхъ чиселъ: $+1, +2, +3\dots$, а на части прямой, расположенной влѣво отъ A , изобразятся отрицательныя части: $-1, -2, -3\dots$. Прямую эту надо представлять себѣ безконечною въ обѣ стороны (хотя на чертежѣ по необходимости приходится ограничивать ее и справа, и слѣва). Число нуль выражается на этой прямой не отрѣзкомъ, а одною точкою A .

Такъ какъ направленіе отрѣзковъ, выражающихъ числа со знакомъ $+$, противоположно направленію отрѣзковъ, выражающихъ числа со знакомъ $-$, то и самые эти знаки принято называть *противоположными* знаками. Всякія два числа, какъ $+3$ и -3 , $+\frac{1}{2}$ и $-\frac{1}{2}$ и т. п., у которыхъ знаки противоположны, а абсолютныя величины одинаковы, мы будемъ называть *противоположными числами*.

Если два направленныхъ отрѣзка AB и CD (черт. 5) имѣютъ одинаковую длину и одно и то же направленіе, то они считаются равными (подразумѣвается: по величинѣ




и по направленію). Если такіе отрѣзки измѣрены одной и тою же единицею длины, то, конечно, въ результатѣ получатся равныя алгебраическія числа.

15. Сложеніе направленныхъ отрѣзковъ.
Чтобы сложить два направленные отрѣзка, поступимъ такъ: на какой-нибудь прямой отъ произвольной ея точки

отложимъ сначала отрѣзокъ, равный первому слагаемому отрѣзку; затѣмъ отъ конца отложеннаго отрѣзка отложимъ на той же прямой другой отрѣзокъ, равный второму слагаемому отрѣзку; тогда отрѣзокъ, у котораго начало есть начало перваго отложеннаго отрѣзка, а конецъ—конецъ втораго отложеннаго отрѣзка, принимается за сумму этихъ двухъ отрѣзковъ.

Приложимъ это опредѣленіе суммы къ слѣдующимъ 4-мъ частнымъ случаямъ.


1°. Пусть требуется найти сумму двухъ положительныхъ отрѣзковъ PQ и RS (черт. 6). Для этого возьмемъ произвольную точку A на какой-нибудь прямой и на ней отложимъ отрѣзокъ AB , равный PQ ; затѣмъ отъ конца B этого отрѣзка отложимъ на той же прямой отрѣзокъ BC , равный RS . Полученный послѣ этого отрѣзокъ AC есть сумма отрѣзковъ AB и BC и, слѣд., сумма равныхъ имъ отрѣзковъ PQ и RS .



Черт. 6.

Очевидно, что сумма положительныхъ отрѣзковъ есть также положительный отрѣзокъ.

2°. Пусть требуется найти сумму $PQ+RS$ двухъ отри-




Черт. 7.

цательныхъ отрѣзковъ (черт. 7). Построеніе будетъ такое же, какъ и въ первомъ случаѣ, съ тою разницей, что

отрѣзки теперь должны откладываться въ отрицательномъ направленіи. Очевидно, что сумма отрицательныхъ отрѣзковъ представляетъ собою также отрицательный отрѣзокъ.


3°. Найдемъ сумму отрѣзковъ PQ и RS (черт. 8), изъ которыхъ первый (PQ) положительный, а второй (RS) отрицательный. Отложимъ отъ точки A вправо положительный отрѣзокъ $AB=PQ$ и затѣмъ отъ точки B отложимъ влево отрицательный отрѣзокъ $BC=RS$. Получившійся



Черт. 8.

отрѣзокъ AC есть сумма $AB+BC$ и слѣд., сумма $PQ+RS$. Эта сумма у насъ оказалась положительной, благодаря тому, что длина положительнаго отрѣзка болѣе длины отрицательнаго; если бы первая длина была меньше второй, то сумма, очевидно, оказалась бы отрицательной.

4°. Пусть, наконецъ, даны отрѣзки PQ и RS (черт. 9), изъ которыхъ первый отрицательный, а второй положительный.



Черт. 9.

Построивъ $AB=PQ$ и $BC=RS$, получимъ сумму AC . Эта сумма оказалась у насъ отрицательной, благодаря тому, что длина отрицательнаго отрѣзка болѣе длины положи-

тельнаго; если бы первая длина была меньше второй, то сумма, очевидно, оказалась бы положительной.

Замѣтимъ, что если бы въ случаѣ 3° или въ случаѣ 4° длина положительнаго отрѣзка была равна длинѣ отрицательнаго, то точка C совпала бы съ точкой A , и тогда сумма обратилась бы въ 0.

Умѣя находить сумму двухъ направленныхъ отрѣзковъ, мы легко можемъ получить сумму 3-хъ, 4-хъ и болѣе отрѣзковъ; для этого надо сначала найти сумму первыхъ двухъ слагаемыхъ, затѣмъ сумму этой суммы и третьяго слагаемаго отрѣзка, далѣе сумму послѣдней суммы и четвертаго отрѣзка и т. д.

Сумма отрѣзковъ обладаетъ перемѣстительнымъ свойствомъ, т.-е. она не измѣняется отъ перемѣны порядка слагаемыхъ. Предлагаемъ самимъ учащимся убѣдиться въ этомъ, перемѣстивъ слагаемые отрѣзки въ указанныхъ выше 4 случаяхъ нахожденія суммы двухъ отрѣзковъ.

Сумма направленныхъ отрѣзковъ обладаетъ также и сочетательнымъ свойствомъ, т.-е. она не измѣнится, если нѣсколько слагаемыхъ отрѣзковъ мы замѣнимъ ихъ суммою.

Замѣчаніе. Подобно указанному сложенію направленныхъ отрѣзковъ можно складывать также и другія направленные величины, напр., прибыль и убытокъ, доходъ и расходъ, выигрышъ и проигрышъ и т. п. Существенная особенность такого сложенія состоитъ въ томъ, что двѣ противоположно направленные величины, имѣющія одинаковый абсолютный размѣръ, при сложеніи взаимно уничтожаются (даютъ въ суммѣ нуль); напр., 5 рублей прибыли уничтожаются 5-ю рублями убытку, 10 рублей выигрыша уничтожаются 10-ю рублями проигрыша и т. п.

Сложение алгебраических чиселъ.

16. Опреѣленіе. Суммою алгебраическихъ чиселъ называется такое число, которое выражаетъ сумму направленныхъ отрѣзковъ (и вообще направленныхъ величинъ), выраженныхъ данными числами.


Напр., сумма: $(+8)+(-5)+(-2)$ есть число, выражающее сумму трехъ направленныхъ отрѣзковъ, изъ которыхъ одинъ измѣряется числомъ $+8$, другой числомъ -5 и третій числомъ -2 (предполагается, конечно, что всѣ измѣренія сдѣланы при помощи одной и той же единицы).

Дѣйствіе, посредствомъ котораго находится сумма нѣсколькихъ чиселъ, наз. сложениемъ.

17. Сложение двухъ чиселъ. Правило 1-е. Чтобы сложить два алгебраическихъ числа одинаковыхъ знаковъ, складываютъ ихъ абсолютныя величины и передъ суммою ставятъ тотъ знакъ какой имѣютъ слагаемыя.

Такъ: $(+3)+(+5)=+8$; $(-3)+(-5)=-8$.

Дѣйствительно, сумма двухъ отрѣзковъ прямой: $AB=+3$ и $BC=+5$ (черт. 10, верхній) есть отрѣзокъ $AC=+8$, и сумма двухъ отрѣзковъ $AB=-3$ и $BC=-5$ (нижній чертежъ) составляетъ отрѣзокъ $AC=-8$.



Черт. 10.


Подобно этому 3 рубля прибыли вмѣстѣ съ 5 рублями прибыли составляютъ 8 руб. прибыли; 3 руб. расхода вмѣстѣ съ 5 руб. расхода составляютъ 8 руб. расхода, и т. п.

Такъ какъ положительныя числа пишутся и безъ знака, то вмѣсто равенства: $(+3)+(+5)=+8$ можно написать болѣе простое: $3+5=8$, что согласуется со сложениемъ арифметическихъ чиселъ.

Правило 2-е. Чтобы сложить два алгебраическихъ числа противоположныхъ знаковъ, находятъ разность ихъ абсолютныхъ величинъ и передъ нею ставятъ знакъ того изъ слагаемыхъ чиселъ, у котораго абсолютная величина больше.

Такъ: $(+5)+(-3)=+2$; $(-5)+(+3)=-2$.

Дѣйствительно, сложивъ два отрѣзка (черт. 11, верхній), $AB=+5$ и $BC=-3$, мы получимъ сумму $AC=+2$, и, сложивъ (нижній чертежъ) два отрѣзка: $AB=-5$ и $BC=+3$, найдемъ сумму $AC=-2$.



Черт. 11.

Подобно этому 5 руб. дохода вмѣстѣ съ 3 руб. расхода равносильны 2 руб. дохода; 5 руб. долгу при 3 руб. имущества равносильны 2 руб. долгу, и т. п.

Отбросивъ знакъ $+$ передъ положительными числами, мы можемъ написанныя выше равенства переписать короче:

$$5+(-3)=2; (-5)+3=-2.$$

Слѣдствіе. Сумма двухъ противоположныхъ чиселъ равна нулю.

Такъ: $(+3)+(-3)=0$; $(-8)+(+8)=0$.

Напримѣръ, если я въ одной игрѣ выигралъ 3 руб., а въ другой проигралъ 3 руб., то въ результатѣ я ничего не выигралъ и ничего не проигралъ.

Къ указаннымъ правиламъ сложения надо добавить еще слѣдующее соглашеніе:

прибавить 0 къ какому-нибудь числу или прибавить къ 0 какое-нибудь число значитъ оставить это число безъ измѣненія.

$$\begin{aligned} \text{Такъ: } (+3)+0 &= +3; (-3)+0 = -3; 0+(+5) = +5; \\ 0+(-2) &= -2; 0+0 = 0. \end{aligned}$$

18. Сложеніе трехъ и болѣе чиселъ. Сначала находятъ сумму двухъ первыхъ слагаемыхъ, къ ней прибавляютъ третье слагаемое, затѣмъ четвертое и т. д.

Пусть, напр., требуется найти сумму:

$$(+8)+(-5)+(-4)+(+3),$$

которую можно выразить короче такъ:

$$8+(-5)+(-4)+3.$$

Сложимъ два первыхъ слагаемыхъ: $8+(-5)=3$; приложимъ третье слагаемое: $3+(-4)=-1$; добавимъ четвертое слагаемое: $(-1)+3=2$.

Впрочемъ, такого порядка сложения нѣтъ надобности всегда придерживаться, какъ это будетъ видно изъ свойствъ суммы, которыя мы сейчасъ укажемъ.

19. Свойства суммы. 1°. **Перемѣстительное свойство:** сумма не измѣняется отъ перемѣны порядка слагаемыхъ.

$$\begin{aligned} \text{Напр.: } (-4)+(+3)+(-1)+(+5) &= +3; \\ (-4)+(-1)+(+5)+(+3) &= +3; \\ (+5)+(-1)+(-4)+(+3) &= +3 \text{ и т. д.} \end{aligned}$$

Такъ, если торговецъ, продавъ 4 предмета, получилъ прибыли на одномъ изъ нихъ 3 руб., на другомъ 5 руб., на

третьемъ же предметѣ имѣлъ убытокъ 4 руб. и на четвертомъ также убытокъ 1 руб., то для него безразлично, въ какомъ порядкѣ слѣдовали эти продажи: проданы ли были сначала тѣ предметы, на которыхъ получена прибыль, или сначала тѣ, которые дали убытокъ, или какъ-нибудь иначе; при всякомъ порядкѣ окажется одно и то же, именно: послѣ 4-хъ продажъ торговецъ получилъ прибыли 3 рубля.

2°. **Сочетательное свойство:** сумма не измѣнится, если нѣсколько слагаемыхъ мы замѣнимъ ихъ суммой.

Возьмемъ, напр., такую задачу: торговецъ получилъ прибыли: въ первый день +10 руб., во второй день —3 руб., въ третій день +12 руб.; сколько прибыли получилъ торговецъ за всѣ эти 3 дня? Мы можемъ узнать это различными способами; напр., узнаемъ сначала, сколько прибыли получилъ торговецъ за первые два дня и затѣмъ добавимъ къ этой прибыли ту, которую онъ получилъ за третій день:

$$[(+10)+(-3)]+(+12)=(+7)+(+12)=+19.$$

Но тотъ же результатъ, очевидно, мы получимъ, если узнаемъ сначала, сколько прибыли имѣлъ торговецъ за два послѣднихъ дня, и потомъ эту прибыль приложимъ къ той, которую онъ имѣлъ за первый день:

$$(+10)+[(-3)+(+12)]=(+10)+(+9)=+19.$$

Наконецъ, мы можемъ сдѣлать и такъ: узнаемъ сначала, какъ велика прибыль за первый и третій день вмѣстѣ, а потомъ добавимъ ее къ прибыли второго дня:

$$(-3)+[(+10)+(+12)]=(-3)+(+22)=+19.$$

Во всѣхъ случаяхъ мы получаемъ одно и то же число +19.

Вообще, если a , b , c означаютъ какія-нибудь алгебраическія числа, то сочетательное свойство въ примѣненіи къ суммѣ трехъ слагаемыхъ можно выразить такою формулой:

$$a+b+c=a+(b+c).$$

Читая это равенство справа налево, мы можем высказать сочетательное свойство так:

чтобы прибавить сумму къ какому-нибудь числу, достаточно къ этому числу прибавить каждое слагаемое одно за другимъ.

Слѣдствіе. Основываясь на сочетательномъ свойствѣ, мы можем вычислить сумму алгебраическихъ чиселъ такъ: сначала найдемъ сумму всѣхъ положительныхъ слагаемыхъ, затѣмъ сумму всѣхъ отрицательныхъ слагаемыхъ и эти двѣ суммы соединимъ въ одну.

Наприм., чтобы найти сумму: $(-4) + (+3) + (-1) + (+5)$, мы можем сгруппировать слагаемыя такъ:

$$[(+3) + (+5)] + [(-4) + (-1)] = (+8) + (-5) = +3.$$

3°. **Перемѣна знаковъ у слагаемыхъ:** если у каждаго слагаемаго перемѣнимъ знакъ на противоположный, то и у суммы перемѣнится знакъ на противоположный.

$$\begin{array}{l} \text{Такъ:} \quad (+5) + (+3) = +8; \quad | \quad (+5) + (-3) = +2; \\ \quad \quad (-5) + (-3) = -8; \quad | \quad (-5) + (+3) = -2. \end{array}$$

Вычитаніе алгебраическихъ чиселъ.


20. Опредѣленіе. Вычитаніе есть дѣйствіе (обратное сложенію), посредствомъ котораго по данной суммѣ двухъ слагаемыхъ и одному изъ этихъ слагаемыхъ отыскивается другое.

Такъ, вычесть изъ $+3$ число -2 значитъ найти такое алгебраическое число x , чтобы сумма $(-2) + x$ или, что все равно, сумма $x + (-2)$ равнялась $+3$; такое число есть и при томъ только одно, именно $+5$, такъ какъ $(+5) + (-2) = +3$ и никакое иное число, сложенное съ -2 , не даетъ въ суммѣ $+3$.

21. Вычитаніе большаго числа изъ меньшаго. Въ ариметикѣ вычитаніе невозможно, если вычитаемое превосходитъ уменьшаемое. Въ области алгебраическихъ чиселъ это ограниченіе должно быть отброшено. Пусть, напримѣръ, требуется изъ 7 вычесть 10. Это значитъ: найти такое алгебраическое число x , которое, сложенное съ вычитаемымъ 10, дастъ въ суммѣ уменьшаемое 7. Такое число существуетъ, и притомъ только одно, именно, отрицательное число -3 , такъ какъ, согласно правилу сложенія алгебраическихъ чиселъ, $10 + (-3) = +7 = 7$ и никакое иное число, сложенное съ 10, не можетъ составить числа 7; значитъ: $7 - 10 = -3$. Подобно этому: $20 - 30 = -10$; $5 - 7\frac{1}{2} = -2\frac{1}{2}$; $0 - 8 = -8$; $a - (a + m) = -m$; и т. п.

Такимъ образомъ, разность отъ вычитанія большаго арифметическаго числа изъ меньшаго равна избытку большаго числа надъ меньшимъ, взятому со знакомъ—.

Примѣръ. Пѣшеходъ прошелъ m верстъ отъ точки A до точки B (черт. 12); затѣмъ, повернувъ назадъ, онъ про-




Черт. 12.

шелъ еще n верстъ до точки C . Какъ велико разстояніе между A и C ?

Искомое разстояніе равно $m - n$ верстъ. Вычислимъ эту разность для слѣдующихъ 3 случаевъ: 1) $m = 15$, $n = 5$; тогда $m - n = 15 - 5 = 10$. Въ этомъ случаѣ точка C лежитъ вправо отъ A на разстояніи 10 верстъ отъ нея. 2) $m = 15$, $n = 15$; тогда $m - n = 15 - 15 = 0$. Въ этомъ случаѣ точка C совпадаетъ съ A , и, слѣд., ея разстояніе отъ A равно нулю. 3) $m = 15$, $n = 20$; тогда $m - n = 15 - 20 = -5$. Въ этомъ случаѣ

разстояніе точки C отъ A надо считать по противоположному направленію, т.-е. влѣво отъ A (черт. 13).



Черт. 13.

22. Правило вычитанія. Чтобы вычесть какое-нибудь число, достаточно къ уменьшаемому прибавить число, противоположное вычитаемому.

Для вывода этого правила рассмотрим особо 3 случая: 1) когда вычитаемое положительное число, 2) когда вычитаемое отрицательное число и 3) когда оно есть 0.

1) Пусть изъ какого-нибудь алгебраическаго числа a требуется вычесть положительное число $+3$ (или просто 3); это значитъ: требуется найти число x , которое, сложенное съ $+3$, дастъ a . Такое число равно суммѣ $a+(-3)$, потому что, приложивъ къ этой суммѣ число $+3$, получимъ уменьшаемое a :

$$a+(-3)+(+3)=a+[(-3)+(+3)]=a+0=a.$$

Такимъ образомъ: $a-(+3)=a+(-3)$,

и вообще: $a-(+b)=a+(-b)$.

Значитъ, вмѣсто того, чтобы вычитать число $+b$, можно прибавить противоположное число $-b$.

2) Пусть изъ того же числа a требуется вычесть отрицательное число -5 ; это значитъ: найти число x , которое, сложенное съ -5 , дастъ уменьшаемое a . Такое число равно суммѣ $a+(+5)$ потому что, приложивъ къ этой суммѣ вычитаемое -5 , получимъ уменьшаемое a :

$$a+(+5)+(-5)=a+[(+5)+(-5)]=a+0=a.$$

Такимъ образомъ: $a-(-5)=a+(+5)$,
и вообще: $a-(-b)=a+(+b)$.

Значитъ, вмѣсто того, чтобы вычитать число $-b$ можно прибавить противоположное число $+b$.

3) Наконецъ, общее правило вычитанія примѣнимо и къ тому случаю, когда вычитаемое есть 0; надо только имѣть въ виду, что число, противоположное нулю, есть тоже число 0. Такимъ образомъ:

$$a-0=a+0=a.$$

Примѣры. 1) $(+10)-(-2)=(+10)+(+2)=+12$;
2) $(-10)-(+2)=(-10)+(-2)=-12$;
3) $(-10)-(-2)=(-10)+(+2)=-8$.

23. Другое выраженіе правилъ сложенія и вычитанія. Правила сложенія и вычитанія, данныя нами раньше (§§ 17, 22), можно замѣнить другими, болѣе удобными для практическаго примѣненія. Эти правила слѣдующія:

1) Чтобы прибавить положительное число, достаточно прибавить его абсолютную величину.

Пусть, напр., требуется къ $+7$ прибавить $+3$; согласно 1-му правилу сложенія (§ 17) сумма будетъ $+10$. Но то же самое число мы получимъ, если къ $+7$ приложимъ абсолютную величину числа $+3$, такъ какъ $+7+3=7+3=10$.

Точно такъ же, согласно второму правилу сложенія, сумма $(-7)+(+3)$ равна -4 ; но то же число мы получимъ, прибавивъ къ -7 просто 3, такъ какъ $(-7)+3=-4$.

2) Чтобы вычесть положительное число, достаточно вычесть его абсолютную величину.

Такъ, разность $(+7)-(+10)$, согласно общему правилу вычитанія (§ 22), равна суммѣ $(+7)+(-10)$, т.-е. числу -3 ; но то же число мы получимъ, если изъ $+7$ вычтемъ абсолютную

величину числа +10, такъ какъ $(+7)-10=7-10=-3$. Точно такъ же, согласно общему правилу вычитанія, разность $(-7)-(+3)$ равна суммѣ $(-7)+(-3)$, т.е. числу -10 ; по то же число мы получимъ, если изъ -7 вычтемъ 3, такъ какъ $-7-3=-10$.

3) Чтобы прибавить отрицательное число, достаточно отнять его абсолютную величину.

$$\begin{aligned} \text{Такъ: } (+7)+(-10) &= -3 \text{ и } +7-10=7-10=-3 \\ (-7)+(-10) &= -17 \text{ и } -7-10=-17. \end{aligned}$$

4) Чтобы отнять отрицательное число, достаточно прибавить его абсолютную величину.

$$\begin{aligned} \text{Такъ: } (+5)-(-3) &= (+5)+(+3)=+8 \text{ и } 5+3=8, \\ (-5)-(-3) &= (-5)+(+3)=-2 \text{ и } -5+3=-2. \end{aligned}$$

24. Формулы двойныхъ знаковъ. Обозначимъ абсолютную величину какого-нибудь алгебраическаго числа черезъ a ; тогда 4 правила, изложенныя въ предыдущемъ параграфѣ, мы можемъ выразить такими формулами двойныхъ знаковъ:

$$\begin{array}{ll} 1) \quad +(+a)=+a, & 3) \quad +(-a)=-a, \\ 2) \quad -(+a)=-a, & 4) \quad -(-a)=+a. \end{array}$$

Формулы эти остаются вѣрными и тогда, когда буква a означаетъ алгебраическое число, а не абсолютную величину, какъ мы предполагали раньше. Въ этомъ легко убѣдиться повѣркой. Положимъ, напр., что $a=-2$. Возьмемъ, какую-нибудь одну изъ указанныхъ формулъ, напр., 4-ю: $-(-a)=+a$ и подставимъ въ нее на мѣсто a число -2 . Тогда получимъ такое равенство:

$$-[-(-2)]=+(-2).$$

Такъ какъ выраженіе $-(-2)=+2$, то лѣвая часть написаннаго равенства есть то же самое, что $-(+2)$, а это выраженіе равно -2 ; но и правая часть равенства даетъ -2 ; значить,

равенство это вѣрно. Подобнымъ образомъ можно провѣрить и всѣ другія формулы.

25. Алгебраическая сумма. Разность двухъ чиселъ можетъ быть представлена въ видѣ суммы. Напримѣръ, разность $7-3$ можетъ быть написана такъ: $7+(-3)$, или такъ: $(+7)+(-3)$.

Подобно этому, выраженіе, представляющее собою рядъ послѣдовательныхъ сложений и вычитаній, можетъ быть представлено въ видѣ суммы. Напримѣръ, выраженіе

$$20-5+3-7$$

можетъ быть написано такъ:

$$20+(-5)+3+(-7), \text{ или } (+20)+(-5)+(+3)+(-7).$$

Сумма, въ которой слагаемыя могутъ быть числами положительными, отрицательными и равными нулю, называется алгебраическою въ отличіе отъ арифметической, въ которой слагаемыя всегда числа положительные.

Такъ какъ алгебраическая сумма представляетъ собою сумму алгебраическихъ чиселъ, то она обладаетъ всѣми свойствами, указанными нами для суммы алгебраическихъ чиселъ (§ 19).

26. Сравненіе алгебраическихъ чиселъ по величинѣ. Опредѣленіе: число a считается большимъ числа b тогда, когда разность $a-b$ положительное число; число a считается меньшимъ числа b тогда, когда разность $a-b$ отрицательное число.

Опредѣленіе это находится въ согласіи съ нашимъ понятіемъ о большемъ и меньшемъ въ примѣненіи къ арифметическимъ числамъ. Мы говоримъ, напр., что 10 больше 7, или 7 меньше 10, разумѣя при этомъ, что число 10 включаетъ въ себѣ, какъ часть, число 7 и что, слѣд., отъ 10 можно отдѣлить 7, при чемъ останется еще нѣкоторое число, тогда какъ отъ 7 нельзя отдѣлить 10; но это, другими сло-

вами, означает, что разность $10-7$ есть положительное число, тогда как разность $7-10$ есть отрицательное число.

Изъ данного опредѣленія можно вывести слѣдующія слѣдствія:


1) Всякое положительное число больше всякаго отрицательнаго, потому что разность между первымъ и вторымъ всегда положительна; такъ, $+3 > -2$, потому что разность $(+3)-(-2)$, равная суммѣ $3+2$, есть число положительное.

2) Всякое положительное число больше нуля по той же причинѣ; напр., $+2 > 0$, такъ какъ $(+2)-0=2$.

3) Всякое отрицательное число меньше нуля, потому что разность между первымъ и вторымъ всегда отрицательна; напр., $-3 < 0$, такъ какъ $(-3)-0=-3$.

4) Изъ двухъ отрицательныхъ чиселъ то больше, у котораго абсолютная величина меньше; напр., -7 больше -9 , такъ какъ разность $(-7)-(-9)$, равная $(-7)+9=9-7$, есть число положительное.

Для яснаго представленія сравнительной величины алгебраическихъ чиселъ всего лучше обратиться къ наглядному изображенію ихъ помощью направленныхъ отрѣзковъ прямой, какъ это было нами указано раньше (§ 14). Выбравъ произвольную единицу длины ab (черт. 14), вообразимъ,



Черт. 14.

что на неограниченной прямой вправо отъ какой-нибудь ея точки A , принятой за начало, отложены отрѣзки, изображающіе положительныя числа $+1, +2, +3, +4\dots$, а влѣво

отъ той же точки отложены отрѣзки, изображающіе отрицательныя числа $-1, -2, -3, -4\dots$ Тогда, двигаясь по этой прямой слѣва направо (какъ указываетъ стрѣлка на чертежѣ), мы будемъ постоянно переходить отъ чиселъ меньшихъ къ бѣльшимъ, а двигаясь въ обратномъ направленіи—справа налѣво—будемъ постоянно переходить отъ чиселъ бѣльшихъ къ меньшимъ.

Упражненія.

Къ § 17.

10. $(+7)+(+3)$; $(-7)+(-3)$; $(+\frac{1}{2})+(+2\frac{1}{2})$; $(-\frac{1}{2})+(-2\frac{1}{2})$.
11. $(+10)+(-2)$; $(+10)+(-12)$; $(-5)+(+6)$; $(-5)+(+2)$.
12. $4+(-3)$; $(-4)+3$; $8+(-10)$; $(-8)+10$.
13. $(+5)+(-5)$; $5+(-5)$; $0,4+(-0,4)$; $(-\frac{1}{2})+0,5$.
 $8+0$; $\frac{3}{4}+0$; $0+2$; $0+0,3$; $0+0$.

Къ § 18.

14. $(+8)+(-5)+(-3)+(+2)$; $(-0,5)+2+(-\frac{3}{4})+(-7)$.
15. $10+(-20)+(-3,7)+8$; $(-7)+(-3)+(-1)+(+11)$.

Къ § 19.

16. Проверить перемѣстительное свойство суммы на слѣдующихъ примѣрахъ:

$$\begin{aligned} (+3)+(-7)+(+5) &= (+3)+(+5)+(-7) = (-7)+(+5)+(+3); \\ (-1)+(+10)+(-2)+(-3) &= (+10)+(-2)+(-1)+(-3) = \\ &= (-3)+(-2)+(-1)+(+10) = (+10)+(-2)+(-1)+(-3). \end{aligned}$$

17. Проверить сочетательное свойство суммы на слѣдующемъ примѣрѣ:

$$\begin{aligned} (-10)+(-5)+2+3 &= (-10)+[(-5)+2+3] = (-10)+(-5)+ \\ &+ (2+3) = (2+3)+[(-10)+(-5)] = 2+[(-10)+(-5)+3]. \end{aligned}$$

18. Убѣдиться на слѣдующихъ 2-хъ примѣрахъ, что перемѣна знаковъ на противоположные передъ каждымъ слагаемымъ влечетъ за собою перемѣну знака на противоположный и передъ суммой:

$$1) (+10)+(+8)+(-5)+(-3); 2) (-4)+(+7)+(-1)+(+2).$$

Къ § 21.

Произвести вычитаніе:

19. $8-12$; $10-25$; $\frac{1}{4}-\frac{1}{2}$; $\frac{3}{8}-\frac{5}{6}$.

20. $0,72-2,3$; $0,(37)-0,(46)$.

21. $a-(a+b)$; $x-(x+y)$.

22. Товаръ купленъ за a руб., а проданъ за b руб. Сколько получено прибыли? Вычислить эту прибыль при $a=40$ и $b=35$. Что означает здѣсь отрицательный отвѣтъ?

23. Нѣкто получаетъ ежегодно доходу a руб., а тратитъ въ годъ b руб. Сколько ежегодно остается? Вычислить отвѣтъ при $a=1200$, $b=1300$. Что означает отрицательный отвѣтъ?

24. Гребецъ въ стоячей водѣ подвигается впередъ на m футовъ въ минуту. Но онъ плыветъ противъ течения, которымъ лодка относится назадъ въ минуту на n футовъ. На сколько футовъ лодка подвигается противъ течения въ минуту? Если $m=2000$, $n=250$, какой будетъ отвѣтъ? Что онъ означает?

25. Если мнѣ сейчасъ 30 лѣтъ, то черезъ сколько лѣтъ мнѣ будетъ 50? Черезъ сколько лѣтъ мнѣ будетъ 25 лѣтъ? Что означаетъ отрицательный отвѣтъ?

Къ §§ 22 и 23.

26. $12-(-2)$; $5-(-5)$; $(+8)-(-10)$; $(+1)-(-1)$.

27. $a-(-b)$; $(+m)-(-n)$; $+2x-(-3x)$.

28. $9-0$; $x-0$; $2m-0$; $a-0$.

29. $10+(-2)-(-4)-(-2)+(+2)$.

30. $(+100)-(-15)-(-8)+(-10)-(+7)$.

Къ § 25.

31. Вычислить сумму $a+b+c+d$ при $a=2$, $b=-3$, $c=-\frac{1}{2}$, $d=-\frac{1}{4}$.

32. Вычислить разность $m-n$ при $m=-10$, $n=-15$.

33. Представить выраженіе $10-2-3+7$ въ видѣ суммы.

34. Представить сумму $10+8$ въ видѣ разности.

35. Представить сумму $a+x$ въ видѣ разности.

36. Представить выраженіе $a-b-c$ въ видѣ суммы.


Умноженіе алгебраическихъ чиселъ.

27. **Задача.** Въ полдень поѣздъ Николаевской желѣзной дороги (соединяющей Петроградъ съ Москвою) прослѣдовала черезъ станцію Бологое (расположенную приблизительно по-

среди́и между Петроградомъ и Москвою). Определить мѣсто, въ которомъ находился этотъ поѣздъ въ моментъ времени, отстоящій отъ полудня (того же дня) на t часовъ, если извѣстно, что поѣздъ двигался со скоростью v верстъ въ каждый часъ (предполагается для простоты, что поѣздъ двигался безостановочно).

Положимъ, что въ этой задачѣ буквы v и t означаютъ какія-нибудь а р и е м е т и ч е с к і я ч и с л а (пусть, напр., скорость v поѣзда была 40 верстъ въ часъ, а моментъ времени, въ который требуется определить мѣстонахожденіе поѣзда, отстоялъ отъ полудня на 3 часа). Тогда въ отвѣтъ на вопросъ задачи мы только можемъ сказать, что въ указанный моментъ времени поѣздъ находился на такомъ разстояніи отъ Бологова, какое онъ можетъ пройти въ t часовъ, т.-е. на разстояніи, равномъ vt верстъ. Но мы не можемъ сказать, нужно ли это разстояніе считать отъ Бологова по направленію къ Москвѣ, или по направленію къ Петрограду, такъ какъ, во-1-хъ, въ задачѣ не указано, въ какомъ направленіи двигался поѣздъ: отъ Петрограда ли къ Москвѣ, или отъ Москвы къ Петрограду; и во-2-хъ, мы не знаемъ, идетъ ли рѣчь о моментѣ времени, который былъ п о з ж е полудня на t часовъ, или же о томъ моментѣ, который былъ р а н ѣ е полудня на t часовъ. Такимъ образомъ, задача наша, чтобы быть вполне определенной, должна распасться на слѣдующія 4 отдѣльныя задачи:

1) Въ полдень поѣздъ, двигавшійся отъ Петрограда къ Москвѣ со скоростью v верстъ въ часъ, проходилъ черезъ станцію Бологое. Определить мѣстонахожденіе этого поѣзда t часовъ послѣ полудня.




Черт. 15.


Тогда отвѣтъ будетъ таковъ: въ указанный моментъ времени поѣздъ находился на разстояніи vt верстъ отъ Бологова по направленію къ Москвѣ (черт. 15).

2) Въ полдень поѣздъ, двигавшійся отъ Москвы къ Петрограду со скоростью v верстъ въ часъ, прослѣдовала черезъ станцію Бологое. Определить мѣстонахожденіе этого поѣзда t часовъ послѣ полудня.

Отвѣтъ будетъ: на разстояніи vt верстъ отъ Бологова по направлению къ Петрограду (черт. 16).




3) Въ полдень поѣздъ, двигавшійся отъ Петрограда къ Москвѣ со скоростью v верстъ въ часъ, проходилъ черезъ станцію Бологое. Опредѣлить мѣстонахождение этого поѣзда t часовъ до полудня.



Отвѣтъ: на разстояніи vt верстъ отъ Бологова по направлению къ Петрограду (черт. 17).

4) Въ полдень поѣздъ, двигавшійся отъ Москвы къ Петрограду со скоростью v верстъ въ часъ, проходилъ черезъ станцію Бологое. Опредѣлить мѣстонахождение этого поѣзда t часовъ до полудня.

Отвѣтъ: на разстояніи vt верстъ отъ Бологова по направлению къ Москвѣ (черт. 18).



Введеніе въ алгебру отрицательныхъ чиселъ и правилъ дѣйствій надъ ними позволяетъ эти 4 отдѣльныя задачи выразить одною общею задачею и дать для нея одно общее рѣшеніе. Для этого предварительно условимся, во-1-хъ, какое изъ двухъ возможныхъ направленій скорости поѣзда (отъ Петрограда къ Москвѣ, или наоборотъ) считать за положительное и какое

за отрицательное; и, во-2-хъ, какой промежутокъ времени, слѣдующій за полуднемъ или предшествующій ему, считать положительнымъ и какой отрицательнымъ. Условимся, напр., скорость поѣзда при движеніи его отъ Петрограда къ Москвѣ считать положительной, а скорость при обратномъ движеніи—отъ Москвы къ Петрограду—считать отрицательной; такимъ образомъ мы будемъ, напр., говорить: поѣздъ двигался со скоростью $+40$ верстъ въ часъ, или поѣздъ двигался со скоростью -35 верстъ въ часъ, разумѣя при этомъ, что въ первомъ случаѣ поѣздъ шелъ отъ Петрограда къ Москвѣ со скоростью 40 верстъ въ часъ, а во второмъ случаѣ онъ шелъ отъ Москвы къ Петрограду со скоростью 35 верстъ въ часъ. Далѣе условимся считать положительными всѣ тѣ промежутки времени, которые слѣдуютъ за полуднемъ, и отрицательными тѣ, которые предшествуютъ полудню; напр., мы будемъ говорить, что моментъ времени, въ который требуется опредѣлить мѣстонахождение поѣзда, отстоитъ отъ полудня на $+4$ часа, или моментъ этотъ отстоитъ отъ полудня на -3 часа, разумѣя при этомъ, что въ первомъ случаѣ моментъ времени надо считать позднѣе полудня на 4 часа, а во второмъ случаѣ его надо брать раньше полудня на 3 часа.

Допустимъ теперь, что въ задачѣ нашей буквы t и v будутъ означать не числа ариметическія, какъ мы прежде предполагали, а числа алгебраическія; напр. t можетъ означать въ задачѣ и $+4$, и -3 ; v можетъ означать и $+40$, и -35 , и другія алгебраическія числа. Тогда мы можемъ сказать, что задача наша включаетъ въ себѣ всѣ 4 частные случая, указанные выше, и точнымъ отвѣтомъ на нее будетъ слѣдующій общій отвѣтъ:

въ указанный моментъ времени поѣздъ находился на разстояніи отъ Бологова, равномъ vt верстъ,

если только подъ произведеніемъ vt алгебраическихъ чиселъ v и t условимся разумѣть произведеніе ихъ абсолютныхъ величинъ, взятое со знакомъ плюсъ въ томъ случаѣ, когда оба сомножителя числа положительныя или оба числа отрицательныя, и со знакомъ минусъ въ томъ случаѣ, когда одинъ сомножитель число положительное, а другой—отрицательное. При этомъ условиі нашъ общій отвѣтъ (указанный выше) будетъ годенъ для всѣхъ частныхъ случаевъ. Дѣйствительно:

1) Пусть буквы v и t означаютъ положительныя числа, напр., $v=+40$ и $t=+3$. Эти заданія означаютъ, что поѣздъ шелъ по направлению отъ Петрограда къ Москвѣ со скоростью 40 верстъ

въ часъ, и что требуется опредѣлить мѣстопахожденіе поѣзда въ моментъ времени, бывшій 3 часа послѣ полудня. Въ этомъ случаѣ искомое мѣсто лежитъ, какъ мы видѣли, на 120 верстѣ отъ Бологова по направленію къ Москвѣ (см. черт. 15). Значитъ, искомое разстояніе равно $+120$ вер. Но, согласно нашему условію, и произведеніе vt въ этомъ случаѣ даетъ: $(+40)(+3) = +120$. Слѣд., можно сказать, что искомое разстояніе равно произведенію vt верстѣ.

2) Пусть v отрицательное число, напр., -40 , а t положительное число, напр. $+3$. Эти заданія надо понимать въ томъ смыслѣ, что поѣздъ шель отъ Москвы къ Петрограду, и надо опредѣлить его мѣсто въ моментъ, бывшій 3 часа послѣ полудня. Мы видѣли, что тогда оно лежитъ на 120 верстѣ отъ Бологова, по направленію къ Петрограду (см. черт. 16), т.-е. искомое разстояніе равно -120 вер. Но и произведеніе vt въ этомъ случаѣ даетъ: $(-40)(+3) = -120$; значитъ, опять также можно сказать, что искомое разстояніе равно vt вер.

3) Пусть v положительное число, напр. $+40$, а t отрицательное число, напр. -3 . Эти заданія означаютъ, что поѣздъ шель отъ Петрограда къ Москвѣ, и требуется опредѣлить его мѣсто въ моментъ, бывшій 3 часа до полудня. Это мѣсто находится на 120 верстѣ отъ Бологова по направленію къ Петрограду (см. черт. 17); значитъ, искомое разстояніе равно -120 вер. Но и произведеніе vt въ этомъ случаѣ даетъ: $(+40)(-3) = -120$; слѣдовательно, можно сказать, что искомое разстояніе равно vt верстѣ.

4) Пусть, наконецъ, и v , и t означаютъ отрицательныя числа, напр., $v = -40$, $t = -3$. Эти заданія означаютъ, что поѣздъ шель по направленію отъ Москвы къ Петрограду, и что моментъ времени, въ который требуется опредѣлить мѣстопахожденіе поѣзда, былъ за 3 часа до полудня. Въ этомъ случаѣ, какъ мы видѣли, искомое мѣсто лежитъ на разстояніи 120 верстѣ отъ Бологова, по направленію къ Москвѣ (см. черт. 18), т.-е. искомое разстояніе равно $+120$ вер. Но и произведеніе vt въ этомъ случаѣ даетъ: $(-40)(-3) = +120$; значитъ, и теперь можно сказать, что искомое разстояніе равно vt верстѣ.

28. Опредѣленіе. Произведеніемъ двухъ алгебраическихъ чиселъ наз. произведеніе ихъ абсолютныхъ величинъ, взятое со знакомъ $+$ въ томъ случаѣ, когда перемножаемыя числа имѣютъ одинаковые знаки, и со знакомъ $-$ въ томъ случаѣ, когда они противоположныхъ знаковъ.

Часть этого опредѣленія, касающаяся знаковъ, носитъ названіе **правила знаковъ**; его обыкновенно выражаютъ такъ: при умноженіи плюсь на плюсь и минусъ на минусъ даютъ плюсь, а плюсь на минусъ и минусъ на плюсь даютъ минусъ; или короче: при умноженіи двухъ чиселъ одинаковые знаки даютъ $+$, разные знаки даютъ $-$.

Примѣры. $(+10)(+2) = +20$; вообще: $(+a)(+b) = +ab$;
 $(-10)(+2) = -20$; $(-a)(+b) = -ab$;
 $(+10)(-2) = -20$; $(+a)(-b) = -ab$;
 $(-10)(-2) = +20$. $(-a)(-b) = +ab$.

Опредѣленіе произведенія можно примѣнять и въ томъ случаѣ, когда какой-нибудь сомножитель равенъ нулю; надо только помнить, что абсолютная величина числа 0 есть 0 и что выраженія $+0$, -0 и просто 0 равносильны. Такимъ образомъ, $(+2) \cdot 0 = +(2 \cdot 0) = 0$; $(-2) \cdot 0 = -(2 \cdot 0) = -0 = 0$; $0 \cdot (+2) = +(0 \cdot 2) = +0 = 0$ и пр.

29. Замѣчанія. Изъ опредѣленія произведенія можно вывести слѣдующія 2 слѣдствія:

1) Умноженіе на положительное число имѣетъ тотъ смыслъ, какой придается этому дѣйствию въ ариметикѣ, если только, какъ это мы дѣлали и прежде, всякое положительное число мы будемъ разсматривать, какъ обыкновенное арифметическое. Напр., умножить -5 на $+3$ означаетъ повторить число -5 слагаемымъ 3 раза (получимъ -15); умножить -12 на $+3/4$ значитъ найти $3/4$ отъ -12 (получимъ -9).

2) Умноженіе на отрицательное число означаетъ умноженіе на его абсолютную величину съ переменною знака передъ результатомъ на противоположныя.

Напр., умножить +3 на —2 все равно, что умножить +3 на 2 (получим +6) и результатъ взять съ противоположнымъ знакомъ (получимъ —6).

30. Обобщеніе формулъ умноженія. Формулы: $(+a)(+b)=+ab$, $(-a)(+b)=-ab$, $(+a)(-b)=-ab$, $(-a)(-b)=+ab$, которыми выражается опредѣленіе произведенія алгебраическихъ чиселъ, остаются вѣрными и тогда, когда подъ буквами a и b будемъ подразумѣвать числа алгебраическія. Въ этомъ легко убѣдиться повѣркою. Возьмемъ, напр., равенство: $(-a)(-b)=+ab$ и посмотримъ, во что оно обратится, если въ него на мѣсто a подставимъ число —5 и на мѣсто b число —2:

$$[-(-5)][-(-2)]=+(-5)(-2).$$

Такъ какъ выраженія: $-(-5)$ и $-(-2)$ равносильны соответственно такимъ: $+5$ и $+2$, то лѣвая часть равенства представляетъ собою произведеніе $(+5)(+2)$, что, согласно правилу умноженія, равно $+10$. Въ правой части равенства произведеніе $(-5)(-2)$ равно $+10$, а выраженіе $+(+10)$ равносильно $+10$. Такимъ образомъ, обѣ части равенства даютъ одно и то же число $+10$, и, значитъ, оно вѣрно. Подобнымъ образомъ можемъ провѣрить и всѣ другія равенства.

31. Произведеніе 3-хъ и болѣе сомножителей. Произведеніемъ 3-хъ и болѣе данныхъ алгебраическихъ чиселъ, взятыхъ въ опредѣленномъ порядкѣ, называется (какъ и въ ариметикѣ) число, которое получится, если сначала умножимъ первое данное число на второе, потомъ полученное произведеніе умножимъ на третье данное число и т. д. Напр., произведеніе 6 чиселъ:

$$(+2)(-1)(+3)(-10)(-4)(-1)$$

получится, если мы произведемъ умноженія въ такомъ порядкѣ:

$$\begin{aligned} (+2)(-1) &= -2; & (-2)(+3) &= -6; & (-6)(-10) &= +60; \\ (+60)(-4) &= -240; & (-240)(-1) &= +240. \end{aligned}$$

32. Знакъ произведенія. Если перемножаются только одни положительныя числа, то знакъ окончательнаго произведенія долженъ быть $+$. Но когда всѣ

или нѣкоторые сомножители числа отрицательныя (при чемъ ни одинъ изъ остальныхъ сомножителей не есть 0), то произведеніе окажется со знакомъ $+$ въ томъ случаѣ, когда число отрицательныхъ сомножителей четное, и со знакомъ $-$ въ томъ случаѣ, когда это число нечетное. Такъ, произведенія:

$$(+2)(-1)(+3)(-10)=+60$$

$$\text{и} \quad (+2)(-1)(+3)(-10)(-4)(-1)=+240$$

оказались со знакомъ $+$ вслѣдствіе того, что въ нихъ число отрицательныхъ сомножителей четное (въ первомъ 2, во второмъ 4); тогда какъ произведенія:

$$\begin{aligned} (+2)(-1) &= -2, & (+2)(-1)(+3) &= -6, \\ (+2)(-1)(+3)(-10)(-4) &= -240 \end{aligned}$$

оказались со знакомъ $-$ вслѣдствіе того, что въ каждомъ изъ нихъ отрицательные сомножители входятъ въ нечетномъ числѣ.

33. Свойства произведенія. Эти свойства тѣ же, какія принадлежатъ и произведенію ариметическихъ чиселъ (§ 8), а именно:

1) **Перемѣстительное свойство:** произведеніе не измѣняется отъ перемѣны порядка сомножителей.

Для двухъ сомножителей это слѣдуетъ непосредственно изъ правила умноженія алгебраическихъ чиселъ и перемѣстительнаго свойства произведенія ариметическихъ чиселъ. Такъ, принявъ во вниманіе, что если a и b означаютъ какія-нибудь ариметическія числа, то $ab=ba$, мы будемъ имѣть согласно правилу умноженія алгебраическихъ чиселъ:

$$\begin{aligned} (+a)(+b) &= +ab & \text{и} & & (+b)(+a) &= +ba = +ab \\ (-a)(+b) &= -ab & \text{и} & & (+b)(-a) &= -ba = -ab \\ (+a)(-b) &= -ab & \text{и} & & (-b)(+a) &= -ba = -ab \\ (-a)(-b) &= +ab & \text{и} & & (-b)(-a) &= +ba = +ab. \end{aligned}$$

Точно такъ же: $(+a) \cdot 0 = 0$ и $0 \cdot (+a) = 0$.

Возьмемъ теперь произведение, состоящее болѣе, чѣмъ изъ 2-хъ сомножителей, напр., такое:

$$(+a)(-b)(-c)(+d).$$

Абсолютная величина этого произведенія равна $abcd$; знакъ же окажется $+$ или $-$, смотря по тому, въ четномъ числѣ, или въ нечетномъ, входятъ въ произведение отрицательные сомножители. Если мы переставимъ сомножителей какъ-нибудь, напр. такъ:

$$(-c)(+d)(-b)(+a),$$

то получимъ новое произведение, у котораго абсолютная величина равна $cdba$ и знакъ будетъ $+$ или $-$, смотря по тому, въ четномъ числѣ, или въ нечетномъ, входятъ въ это новое произведение отрицательные сомножители. Такъ какъ $cdba = abcd$ (по перемѣстительному свойству произведенія ариметическихъ чиселъ), и число отрицательныхъ сомножителей отъ перемѣщенія ихъ, очевидно, не могло измѣниться, то у обоихъ произведеній абсолютная величина будетъ одна и та же и знаки одинаковы; слѣдовательно:

$$(+a)(-b)(-c)(+d) = (-c)(+d)(-b)(+a).$$

Равенство это остается въ силѣ и тогда, когда въ числѣ сомножителей есть равные нулю, такъ какъ въ этомъ случаѣ всѣ произведенія окажутся нулями.

2) Сочетательное свойство: произведение не измѣнится, если нѣсколько сомножителей мы замѣнимъ ихъ произведеніемъ.

Напр., вычисляя произведение $(-5)(+3)(-2)$, мы можемъ сомножителей $(+3)$ и (-2) замѣнить ихъ произведеніемъ -6 . Дѣйствительно, сомножителей этихъ мы можемъ, согласно перемѣстительному свойству, переставить къ началу ряда: $(+3)(-2)(-5)$; тогда, вычисляя произведение, придется прежде всего умножить $(+3)$ на (-2) и потомъ полу-

ченное число (-6) умножить на (-5) . Но вмѣсто того, чтобы умножить (-6) на (-5) , мы можемъ умножить (-5) на (-6) . Значить:

$$\begin{aligned} (-5)(+3)(-2) &= (+3)(-2)(-5) = (-6)(-5) = \\ &= (-5)(-6) = (-5)[(+3)(-2)]. \end{aligned}$$

Въ примѣненіи къ произведенію трехъ алгебраическихъ чиселъ abc мы можемъ сочетательное свойство выразить такою формулой:

$$abc = a(bc)$$

Читая это равенство справа налѣво, мы можемъ то же свойство высказать другими словами такъ: **чтобы умножить какое-нибудь число на произведение, достаточно умножить это число на перваго сомножителя, полученное произведение умножить на втораго сомножителя и т. д.**

Основываясь на сочетательномъ свойствѣ, мы можемъ, вычисляя произведение нѣсколькихъ сомножителей, разбить ихъ на какія угодно группы, произвести умноженіе въ каждой группѣ отдѣльно и полученные числа перемножить. Напр.:

$$\begin{aligned} (-2)(+8)(-5)(-9) &= [(+8)(-9)][(-2)(-5)] = (-72)(+10) = \\ &= -720. \end{aligned}$$

3) Распределительное свойство: чтобы умножить алгебраическую сумму на какое-нибудь число, достаточно умножить на это число каждое слагаемое отдѣльно и полученные произведенія сложить.

Ограничимся повѣркою этого свойства на примѣрахъ.

Примѣръ 1. $[(-2)+9+(-3)] \cdot (+7)$.

Если вычислимъ сначала сумму, а потомъ сдѣлаемъ умноженіе, то найдемъ:

$$(+4)(+7) = +28.$$

Умножимъ теперь каждое слагаемое отдѣльно на $+7$ и сложимъ результаты:

$$\begin{aligned} (-2)(+7) &= -14; & (+9)(+7) &= +63; & (-3)(+7) &= -21; \\ & & -14 + 63 - 21 &= +63 - 35 & &= +28. \end{aligned}$$

Мы получили то же самое число $+28$.

Примѣръ 2. $[8 + (-2) + (-3)](-10)$.

Вычисливъ сумму и умноживъ ее на -10 , находимъ:
 $(+3)(-10) = -30$. Произведя умноженіе каждаго слагаемаго отдѣльно, получимъ то же самое число -30 :

$$\begin{aligned} 8(-10) &= -80; & (-2)(-10) &= +20; & (-3)(-10) &= +30; \\ & & -80 + 20 + 30 &= & &= -30. \end{aligned}$$

Упражненія.

Къ § 29.

37. $(-2)(+3)$; $(+7)(-2)$; $(-8)(-10)$.
 38. $(-8\frac{1}{2})(+2\frac{3}{4})$; $(+0,36)(-\frac{2}{9})$; $(-\frac{3}{5})(-0,7)$.
 39. $(-1)^2$; $(-1)^3$; $(-1)^4$; $(-1)^5$.
 40. $(-2)^2$; $(-2)^3$; $(-2)^4$; $(-2)^5$.
 41. Вычислить $ax^2 + bx + c$ при $a=3$, $b=-4$, $c=-5$ и $x=4$.
 42. Вычислить то же выраженіе при $a=-4$, $b=3$, $c=-5$, $x=-2$.
 43. $4 \cdot 0$; $5\frac{1}{2} \cdot 0$; $0 \cdot 3$; $0 \cdot 0$.

Къ § 31.

44. $(-3)(+2)(-4)(-7)$. 45. $(+0,2)(-1)(-1)(-7)$.
 46. $(-\frac{1}{2})(+3,5)(+2)(-\frac{7}{8})$.

Къ § 33.

Убѣдиться повѣркою, что:

47. $(-5)(+2)(-1) = (+2)(-1)(-5) = (+2)(-5)(-1)$.
 48. $10(-3)(-2)(+5) = 10[(-3)(-2)(+5)] = 10(-2)[(-3)(+5)]$.
 49. $[10 + (-3) + (-2)](-7) = 10(-7) + (-3)(-7) + (-2)(-7)$.

Дѣленіе алгебраическихъ чиселъ.

34. Опредѣленіе. Дѣленіе есть дѣйствіе (обратное умноженію), посредствомъ котораго по данному про-

изведенію двухъ сомножителей и одному изъ этихъ сомножителей отыскивается другой. Такъ, раздѣлить $+10$ на -2 значитъ найти такое число x , чтобы произведеніе $(-2)x$, или — что все равно — произведеніе $x(-2)$, равнялось $+10$; такое число есть, и притомъ только одно, именно -5 , такъ какъ произведеніе $(-5)(-2)$ равно $+10$, а произведеніе какого-нибудь иного числа на -2 не можетъ составить $+10$.

35. Случай, когда какое-нибудь данное число равно нулю. Такихъ случаевъ можетъ быть три, а именно:

1) Если дѣлимое равно 0, а дѣлитель не равенъ 0, то частное должно быть 0.

Въ самомъ дѣлѣ, раздѣлить 0 на какое-нибудь число a значитъ найти такое число, которое, умноженное на a , даетъ въ произведеніи 0. Такое число есть, и только одно (если a не равно 0), именно 0; значитъ, $0 : a = 0$.

2) Если дѣлимое равно 0 и дѣлитель равенъ 0, то частное можетъ равняться любому числу,

потому что всякое число, умноженное на 0, даетъ въ произведеніи 0; слѣд., частное $0 : 0$ равно всякому числу.

3) Если дѣлимое не равно 0, а дѣлитель равенъ 0, то частное не существуетъ,

потому что, какое бы число мы не предположили въ частномъ, оно, умноженное на 0, даетъ въ произведеніи 0, а не какое-нибудь другое число; значитъ, частное $a : 0$ невозможно, если a не равно 0.

Такимъ образомъ, если дѣлитель равенъ 0, то дѣленіе или невозможно (если дѣлимое не равно 0), или есть дѣйствіе неопредѣленное (если дѣлимое равно 0); поэтому случай этотъ мы вообще будемъ исключать.

36. Правило дѣленія. Чтобы раздѣлить одно алгебраическое число на другое, достаточно раздѣлить ихъ

абсолютныя величины и результатъ взять со знакомъ +, когда дѣлимое и дѣлитель имѣютъ одинаковые знаки, и со знакомъ —, когда у дѣлимаго и дѣлителя знаки разные.

Такъ: $(+10) : (+2) = +5$ потому что $(+2)(+5) = +10$;
 $(-10) : (-2) = +5$, « « $(-2)(+5) = -10$;
 $(-10) : (+2) = -5$, « « $(+2)(-5) = -10$;
 $(+10) : (-2) = -5$, « « $(-2)(-5) = +10$.

Такимъ образомъ, правило знаковъ при дѣленіи остается то же самое, что и при умноженіи.

37. Нѣкоторые свойства дѣленія. 1) Чтобы раздѣлить какое-нибудь число на произведеніе, достаточно раздѣлить это число на перваго сомножителя, полученное частное раздѣлить на втораго сомножителя, это частное на третьаго сомножителя и т. д.

Такъ: $(-40) : [(+5)(-2)] = [(-40) : (+5)] : (-2) =$
 $= (-8) : (-2) = +4.$

Вообще: $a : (bc) = (a : b) : c$

Чтобы убѣдиться въ вѣрности этого равенства, умножимъ предполагаемое частное на дѣлителя bc ; если послѣ умноженія получимъ дѣлимое a , то это будетъ значить, что предполагаемое частное вѣрно. вмѣсто того, чтобы умножить на bc , мы можемъ умножить на cb . Чтобы умножить какое-нибудь число на cb , можно умножить это число на c и затѣмъ результатъ умножить на b . Умноживъ предполагаемое частное $(a : b) : c$ на c , получимъ (по опредѣленію дѣленія) число $a : b$; умноживъ это число на b , получимъ дѣлимое a . Слѣд., предполагаемое частное вѣрно.

2) Чтобы раздѣлить произведеніе на какое-нибудь число, достаточно раздѣлить на это число одного изъ сомножителей.

Такъ: $[(-20)(+15)] : (-5) = [(-20) : (-5)](+15) =$
 $= (+4)(+15) = +60;$

или $[(-20)(+15)] : (-5) = (-20)[(+15) : (-5)] =$
 $= (-20)(-3) = +60.$

Вообще: $(ab) : c = (a : c)b,$

или $(ab) : c = a(b : c).$

Чтобы убѣдиться въ вѣрности этихъ равенствъ, умножимъ каждое изъ этихъ предполагаемыхъ частныхъ на дѣлителя c ; если послѣ умноженія получимъ дѣлимое ab , то заключимъ, что равенства вѣрны. Оба предполагаемыхъ частныхъ представляютъ собой произведенія. Чтобы умножить произведеніе, достаточно умножить одного изъ сомножителей. Умноживъ на c въ первомъ предполагаемомъ частномъ сомножителя $(a : c)$, а во второмъ предполагаемомъ частномъ сомножителя $(b : c)$, мы получимъ въ окончательномъ результатѣ дѣлимое ab ; значитъ, оба равенства вѣрны.

Упражненія.

Къ § 35.

50. $0 : 8$; $0 : \frac{1}{2}$; $0 : 0,3$; $0 : a$;
 $1 : 0$; $5 : 0$; $a : 0$; $0 : 0.$

Къ § 36.

51. $(+20) : (+4)$; $(+20) : (-4)$; $(-20) : (+4)$; $(-20) : (-4).$
 52. $(+2a) : (-2)$; $(-5x) : x$; $(-7x^2) : (-7).$

Къ § 37.

Убѣдиться повѣркою, что:

53. $(-100) : [(+5)(-4)(-5)] = \{ [(-100) : (+5)] : (-4) \} : (-5)$
 54. $[(-100)(+20)] : (-5) = [(-100) : (-5)](+20) =$
 $= (-100)[(+20) : (-5)].$

Раздѣленіе алгебраическихъ выраженій.

38. Предварительныя замѣчанія. 1) Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы будемъ предполагать (если не сдѣлано особыхъ оговорокъ), что буквы, входящія въ алге-

браическія выраженія, означаютъ числа алгебраическія, какъ положительныя, такъ и отрицательныя; буквы могутъ также означать и число 0, кромѣ случая, когда онѣ входятъ въ выраженіе въ качествѣ дѣлителя: дѣленіе на 0 мы вообще исключаемъ (§ 35).

2) Если случится, что въ какомъ-либо произведеніи есть нѣсколько сомножителей, выраженныхъ цифрами, или нѣкоторые буквенные сомножители повторяются, то такіа произведенія можно упростить, пользуясь сочетательнымъ свойствомъ произведенія (§ 33, 2°). Возьмемъ, напр., произведеніе: $a3aba(-2)cb$. Сгруппируемъ его сомножителей такъ: къ первой группѣ отнесемъ всѣхъ сомножителей, выраженныхъ цифрами, ко второй группѣ—всѣхъ сомножителей, обозначенныхъ буквою a , къ третьей—всѣхъ сомножителей, обозначенныхъ буквою b , и т. д. Тогда мы получимъ выраженіе: $[3 \cdot (-2)](aaa)(bb)c$, которое можно написать проще такъ: $-6a^3b^2c$.

Въ дальнѣйшемъ мы всегда будемъ предполагать, что произведенія приведены къ такому упрощенному виду.

39. Раздѣленіе алгебраическихъ выраженій. Алгебраическое выраженіе наз. рациональнымъ относительно какой-нибудь буквы, входящей въ это выраженіе, если буква эта не стоитъ подъ знакомъ извлеченія корня; въ противномъ случаѣ выраженіе наз. иррациональнымъ.

Напр., выраженіе $3ab+2\sqrt{x}$ есть рациональное относительно a и b и иррациональное относительно x .

Въ началѣ курса алгебры мы будемъ говорить только о такихъ алгебраическихъ выраженіяхъ, которыя рациональны относительно всѣхъ входящихъ въ нихъ буквъ (такія выраженія наз. просто рациональными, безъ добавленія: «относительно всѣхъ буквъ»).

Алгебраическое выраженіе наз. цѣлымъ относительно какой-нибудь буквы, если эта буква не входитъ въ него дѣлителемъ или частью дѣлителя; въ противномъ случаѣ выраженіе наз. дробнымъ.

Напр., выраженіе $x^2 + \frac{2x}{a-1}$ есть цѣлое относительно x , но дробное относительно a .

Въ началѣ курса алгебры мы будемъ говорить бѣльшею частью только о такихъ алгебраическихъ выраженіяхъ, которыя можно назвать цѣлыми относительно всѣхъ буквъ, входящихъ въ нихъ (ихъ просто называютъ цѣлыми, безъ добавленія: «относительно всѣхъ буквъ»).

Алгебраическое выраженіе, представляющее собою произведеніе нѣсколькихъ сомножителей, наз. одночленомъ.

Напр., выраженія: $6a^3b^2c$, $+0,5xy^3$, $2m^3$ и т. п. суть одночлены.

Одночленомъ принято называть также и всякое отдѣльно взятое число, выраженное буквою или цифрами, напр.: a , x , -3 .

Число всѣхъ буквенныхъ сомножителей, составляющихъ одночленъ, наз. его измѣреніемъ; такъ, одночленъ $3a^2bc$, который представляетъ собою произведеніе $3abc$, есть одночленъ четвертаго измѣренія, одночленъ $10x^3$ —третьяго измѣренія.

40. Коэффициентъ. Выраженный цифрами сомножитель, стоящій впереди одночлена, наз. коэффициентомъ его. Такъ, въ одночленѣ $-6a^3b^2c$ число -6 есть коэффициентъ этого одночлена.

Цѣлый положительный коэффициентъ означаетъ, сколько разъ повторяется слагаемымъ то буквенное выраженіе, передъ которымъ онъ стоитъ. Напр., $3ab = (ab) : 3 = ab + ab + ab$.

“Дробный положительный коэффициентъ означаетъ, какая дробь берется отъ буквеннаго выраженія, къ которому онъ относится. Такъ, въ выраженіи $\frac{5}{4}x^2$ коэффициентъ означаетъ, что отъ x^2 берется $\frac{5}{4}$, потому что $\frac{5}{4}x^2 = x^2 \cdot \frac{5}{4}$, а умножить на $\frac{5}{4}$ значитъ взять $\frac{5}{4}$ отъ множимаго.

Отрицательный коэффициентъ означаетъ, что буквенное выраженіе, передъ которымъ онъ стоитъ, умножается на абсолютную величину этого коэффициента и результатъ берется съ противоположнымъ знакомъ.

Замѣчанія. 1) При одпочленѣ, не имѣющемъ коэффициента, можно подразумѣвать коэффициентъ $+1$ или -1 , смотря по знаку, который стоитъ (или подразумѣвается) передъ одпочленомъ; такъ, $+ab$ (или ab) все равно, что $+1ab$, и $-ab$ все равно, что $(-1)ab$.

2) Не должно думать, что одпочленъ, передъ которымъ стоитъ знакъ $-$, представляетъ собою всегда отрицательное число, а одпочленъ со знакомъ $+$ есть всегда число положительное. Напримѣръ, при $a = -3$ и $b = +4$ одпочленъ $+2ab$ даетъ отрицательное число: $(+2)(-3)(+4) = -24$, тогда какъ при тѣхъ же значеніяхъ буквъ одпочленъ $-2ab$ даетъ число положительное: $(-2)(-3)(+4) = +24$.

41. Многочленъ. Алгебраическое выраженіе, составленное изъ нѣсколькихъ другихъ алгебраическихъ выраженій, соединенныхъ между собою знаками $+$ или $-$, наз. многочленомъ. Таково, напр., выраженіе:

$$ab - a^2 + 3b^2 - bc + \frac{a-b}{2}.$$

Отдѣльные выраженія, отъ соединенія которыхъ знаками $+$ или $-$ составилъ многочленъ, наз. ч л е н а м и е г о. Члены многочлена разсматриваются вмѣстѣ съ тѣми знаками, которые стоятъ передъ ними; напр., говорятъ:

членъ $-a^2$, членъ $+3b^2$, и т. п. Передъ первымъ членомъ, если передъ нимъ не поставлено никакого знака (какъ въ приведенномъ примѣрѣ), можно подразумѣвать знакъ $+$.

Многочленъ, состоящій изъ двухъ членовъ, наз. д в у ч л е н о мъ (или бинмомъ), изъ трехъ членовъ—т р е х ч л е н о мъ (или триномомъ) и т. д.

Многочленъ наз. р а ц і о н а л ь н ы мъ, если всѣ его члены рациональные, и ц ѣ л ы мъ, если всѣ его члены цѣлые.

Цѣлый многочленъ наз. о д н о р о д н ы мъ, если всѣ его члены суть одпочлены, имѣющіе одинаковое измѣреніе. Напримѣръ, выраженіе $2ab^2 + a^3 - 5abc$ есть однородный многочленъ третьяго измѣренія.

42. Главнѣйшія свойства многочлена.

Всякій многочленъ можно разсматривать, какъ сумму его членовъ. Напр., многочленъ:

$$2a^2 - ab + b^2 - \frac{1}{2}a + b$$

можно представить въ видѣ такой суммы:

$$(+2a^2) + (-ab) + (+b^2) + (-\frac{1}{2}a) + (+b)$$

такъ какъ выраженіе $(+2a^2)$ равносильно выраженію $2a^2$, выраженіе $(-ab)$ равносильно выраженію $-ab$ и т. д. Вслѣдствіе этого всѣ свойства суммы алгебраическихъ чиселъ (§ 19) принадлежать также и многочлену. Эти свойства слѣдующія:

1) Перемѣстительное свойство: численная величина многочлена не зависитъ отъ порядка его членовъ.

Положимъ, напр., мы находимъ численную величину многочлена: $2a^2 - ab + b^2 - \frac{1}{2}a + b$ при $a = 4$ и $b = -3$. Для этого предварительно вычислимъ каждый членъ отдѣльно:

$$2a^2 = 2(4 \cdot 4) = 32; \quad -ab = -4 \cdot (-3) = +12; \\ +b^2 = +(-3)(-3) = +9; \quad -\frac{1}{2}a = -\frac{1}{2} \cdot 4 = -2.$$

Теперь сложим всё полученные числа или въ томъ порядкѣ, въ какомъ написаны члены многочлена:

$$32+(+12)+(+9)+(-2)+(-3)=32+12+9-2-3=48,$$

или въ какомъ-нибудь иномъ порядкѣ; всегда получимъ одно и то же число 48.

2) Сочетательное свойство: численная величина многочлена не измѣнится, если нѣсколько его членовъ мы замѣнимъ ихъ алгебраическою суммою. Такъ, если въ данномъ выше многочленѣ мы замѣнимъ члены: $-ab$, $+b^2$ и $-\frac{1}{2}a$ ихъ алгебраическою суммою, т.е. возьмемъ этотъ членъ въ такомъ видѣ:

$$2a^2+(-ab+b^2-\frac{1}{2}a)+b,$$

то при $a=4$ и $b=-3$ получимъ:

$$32+(12+9-2)-3=32+19-3=48,$$

т.е. получимъ то же самое число 48, какое получили прежде.

3) Перемѣна знаковъ передъ членами многочлена: если передъ каждымъ членомъ многочлена перемѣнимъ знакъ на противоположный, то получимъ новый многочленъ, численная величина котораго противоположна численной величинѣ перваго многочлена.

Напр., численная величина многочлена $2a^2-ab+b^2-\frac{1}{2}a+b$ при $a=4$ и $b=-3$ равна, какъ мы видѣли, 48; перемѣнивъ передъ всѣми членами знаки на противоположные, мы получимъ новый многочленъ:

$$-2a^2+ab-b^2+\frac{1}{2}a-b,$$

численная величина котораго при тѣхъ же значеніяхъ буквъ составляетъ не 48, а -48 :

$$-32+(-12)-9+2-(-3)=-32-12-9+2+3=-48.$$

Приведеніе подобныхъ членовъ.

43. Подобные члены. Члены многочлена, отличающіеся только коэффициентами, или же не отличающіеся

ничѣмъ, наз. подобными. Напримѣръ, въ такомъ многочленѣ:

$$4a^2b^3-3ab+0,5a^2b^3+3a^2c+8ab$$

первый членъ подобенъ третьему, потому что отличается отъ него только коэффициентомъ (у перваго члена коэффициентъ $+4$, а у третьяго $+0,5$); второй членъ подобенъ пятому по той же причинѣ (коэффициентъ у втораго члена -3 , а у пятаго $+8$). Членъ $+3a^2c$ не имѣетъ себѣ подобныхъ, потому что онъ отличается отъ остальныхъ членовъ буквами и показателями при нихъ.

44. Приведеніе подобныхъ членовъ. Когда въ многочленѣ встрѣчаются подобные члены, то его можно упростить, соединяя всѣ подобные между собою члены въ одинъ. Такое соединеніе наз. приведеніемъ подобныхъ членовъ. Положимъ, напр., что въ какомъ-нибудь многочленѣ имѣются такіе подобные члены: $+3a$, $-2a$, $-a$, $+5\frac{1}{2}a$. Будутъ ли эти члены слѣдовать одинъ за другимъ, или они будутъ раздѣляться какими-нибудь другими членами, мы всегда можемъ, основываясь на сочетательномъ свойствѣ многочлена, замѣнить всѣ эти члены ихъ алгебраическою суммою $+3a-2a-a+5\frac{1}{2}a$. Но

$$+3a-2a-a+5\frac{1}{2}a=(+3-2-1+5\frac{1}{2})a,$$

такъ какъ (согласно распределительному свойству умноженія) чтобы умножить алгебраическую сумму $+3-2-1+5\frac{1}{2}$ на число a , достаточно умножить на a каждое слагаемое этой суммы отдѣльно. Сумма $+3-2-1+5\frac{1}{2}$ равна $+5\frac{1}{2}$; поэтому:

$$+3a-2a-a+5\frac{1}{2}a=+5\frac{1}{2}a.$$

Такимъ образомъ: нѣсколько подобныхъ членовъ многочлена можно замѣнить однимъ подобнымъ имъ членомъ, у котораго коэффициентъ равенъ алгебраической суммѣ коэффициентовъ этихъ членовъ.

Примѣры.

- 1) $a + 5mx - 2mx + 7mx - 8mx = a + (5 - 2 + 7 - 8)mx = a + 2mx;$
- 2) $4ax + b^2 - 7ax - 3ax + 2ax = (4 - 7 - 3 + 2)ax + b^2 = -4ax + b^2 = b^2 - 4ax.$
- 3) $4a^2b^3 - 3ab + 0,5a^2b^3 + 3a^2c + 8ab = (4 + 0,5)a^2b^3 + (-3 + 8)ab + 3a^2c = 4,5a^2b^3 + 5ab + 3a^2c.$

Упражненія.

Къ § 40.

55. Написать сокращенно (при помощи коэффициента) слѣдующія выраженія:

$x + x + x + x;$	$ab + ab + ab;$
$(a + b) + (a + b) + (a + b);$	$a^2x^3y + a^2x^3y;$
$\frac{m}{9} + \frac{m}{9} + \frac{m}{9} + \frac{m}{9};$	$ax + ax - \frac{b}{2} - \frac{b}{2} - \frac{b}{2}.$

56. Написать безъ помощи коэффициентовъ и показателей степеней слѣдующія выраженія:

$$3a^2b^3, \quad \frac{2}{3}a^2, \quad 3a^2 - \frac{3}{4}b.$$

Вычислить слѣдующіе одночлены:

57. $7a^2bc$ при $a=3, b=2, c=5/7.$
58. $0,8a(b+c)$ при $a=1, b=5/6, c=0,25.$
59. $\frac{3(a+b)^2}{c}$ при $a=5, b=1/2; c=3.$

Къ § 41.

Вычислить слѣдующіе многочлены:

60. $2x^4 - x^3 + 5x^2 - 7x + 1$ при $x=1; x=2; x=3; x=10.$
61. $x^5 - 15x^4 + 85x^3 - 225x^2 + 274x - 120$ при $x=1; x=2; x=3.$
62. $x^4 + ax^3 - a^2x^2 + a^3x - a^4$ при $x=5, a=3.$

Къ § 42.

63. Убѣдиться повѣркою, что при $x=2$ многочленъ:
 $x^3 - 2x^2 + 3x - 5$
 обладаетъ свойствами перемѣстительнымъ и сочетательнымъ.

64. Убѣдиться повѣркою, что при $x=2$ два многочлена:

$$x^3 - 2x^2 + 3x - 5 \text{ и } -x^3 + 2x^2 - 3x + 5$$

даютъ числа, одинаковыя по абсолютной величинѣ, но противоположныхъ знаковъ.

Къ § 44.

Сдѣлать приведеніе подобныхъ членовъ:

65. $5a^2b + 7a^2b + a^2b.$
66. $2\frac{1}{2}ax^3 + \frac{3}{4}ax^3 + 0,3ax^3.$
67. $a^3x^2 + 3a^2x^3 + \frac{1}{2}a^2x^3 + a^2x^3.$
68. $2x - 5xy - 8xy - 3,1xy - 0,2xy.$
69. $a + 8mxy^2 - 4\frac{1}{2}mxy^2.$
70. $a - 8mxy^2 + 4\frac{1}{2}mxy^2.$
71. $7b^2x + 2ax - 8b^2x.$
72. $0,5ab^3 - 4a^3b - 0,25ab^3.$
73. $5a^3 - 7a^2b + 7ab^2 + a^2b - 2a^3 - 8ab^2 + a^3 - 12ab^2 + 3a^2b.$
74. $x^5 - 4ax^4 - 2ax^4 + 2a^2x^3 + 5ax^4 - 2a^2x^3 + ax^4 - 7a^2x^3.$
75. $4x^7 - 2a^2x^4 + 2ax^6 - 3a^4x^3 + 3ax^6 + 5a^3x^4 + a^4x^3 - 3a^2x^4 - 9ax^6.$

Первыя четыре алгебраическія дѣйствія.

Алгебраическое сложение и вычитаніе.

45. Сложение одночленовъ. Пусть требуется сложить одночлены: $3a, -5b, +0,2a, -7b$ и c . Ихъ сумма выразится многочленомъ:

$$3a + (-5b) + (+0,2a) + (-7b) + c,$$

который, согласно формуламъ двойныхъ знаковъ (24), можно переписать проще такъ:

$$\underline{3a} - \underline{5b} + \underline{0,2a} - \underline{7b} + c.$$

Послѣ приведенія подобныхъ членовъ получимъ: $3,2a - 12b + c.$

Правило. Чтобы сложить нѣсколько одночленовъ, достаточно написать ихъ одинъ за другимъ съ ихъ знаками и сдѣлать приведеніе подобныхъ членовъ, если они окажутся.

46. Сложение многочленовъ. Пусть требуется къ какому-нибудь числу A приложимъ многочленъ $a-b+c-d$:
 $A+(a-b+c-d)$.

Многочленъ $a-b+c-d$ представляетъ собою сумму алгебраическихъ чиселъ: $a+(-b)+c+(-d)$; но чтобы прибавить сумму, достаточно прибавить каждое слагаемое одно за другимъ; слѣд.:

$$A+(a-b+c-d)=A+a+(-b)+c+(-d),$$

что согласно формуламъ сложения, можно переписать такъ:

$$A+(a-b+c-d)=A+a-b+c-d.$$

Правило. Чтобы прибавить многочленъ къ какому-нибудь числу, приписываютъ къ этому числу всѣ члены многочлена одинъ за другимъ съ ихъ знаками (при чемъ передъ тѣмъ членомъ, при которомъ не стоитъ никакого знака, должно подразумѣвать знакъ $+$) и дѣлаютъ приведение подобныхъ членовъ, если они окажутся.

Примѣръ: $(3a^2-5ab+b^2)+(4ab-b^2+7a^2)$.

То, что мы обозначали сейчасъ буквой A , дано теперь въ видѣ многочлена $3a^2-5ab+b^2$. Примѣняя указанное правило сложения, пайдемъ:

$$(3a^2-5ab+b^2)+(4ab-b^2+7a^2)=(3a^2-5ab+b^2)+4ab-b^2+7a^2.$$

Въ полученномъ результатѣ скобки могутъ быть отброшены, потому что отъ этого смыслъ выраженія не измѣнится:

$$3a^2-5ab+b^2+4ab-b^2+7a^2.$$

Приведя въ этомъ многочленѣ подобные члены, получимъ окончательно: $10a^2-ab$.

Если данные многочлены содержатъ подобные члены, то полезно писать слагаемые одно подъ другимъ такъ, чтобы подобные члены стояли подъ подобными; напр.:

$$+ \begin{cases} 3ax^2 - \frac{1}{2}a^2x + 2a^3 \\ - 5ax^2 + 7a^2x - a^3 \\ \frac{3}{4}ax^2 - 2a^2x + 0,3a^3 \\ - 1\frac{1}{4}ax^2 + 4\frac{1}{2}a^2x + 1,3a^3 \end{cases}$$

47. Вычитаніе одночленовъ. Пусть требуется изъ одночлена $10a^2x$ вычесть одночленъ $-3a^2x$:

$$10a^2x - (-3a^2x).$$

Для этого, согласно общему правилу вычитанія (§ 22), достаточно къ уменьшаемому прибавить число, противоположное вычитаемому. Число, противоположное одночлену $-3a^2x$, есть $3a^2x$; значить:

$$10a^2x - (-3a^2x) = 10a^2x + 3a^2x,$$

что, послѣ приведенія подобныхъ членовъ, даетъ $13a^2x$.

Правило. Чтобы вычесть одночленъ, достаточно къ уменьшаемому приписать этотъ одночленъ съ противоположнымъ знакомъ и сдѣлать приведеніе подобныхъ членовъ, если они окажутся.

48. Вычитаніе многочленовъ. Пусть требуется изъ какого-нибудь числа A вычесть многочленъ $a-b+c$:

$$A - (a - b + c).$$

Для этого достаточно прибавить къ A число, противоположное числу $a-b+c$. Такое число получимъ (§ 42), если передъ каждымъ членомъ многочлена $a-b+c$ перемѣнимъ знакъ на противоположный:

$$A - (a - b + c) = A + (-a + b - c).$$

Примѣняя теперь правило сложения многочленовъ, получимъ:

$$A - (a - b + c) = A - a + b - c.$$

Правило. Чтобы вычесть многочленъ, приписываютъ къ уменьшаемому всѣ члены вычитаемого съ противоположными знаками и дѣлаютъ приведеніе подобныхъ членовъ, если они окажутся.

Когда въ многочленахъ есть подобные члены, то вычитаемый многочленъ полезно писать подъ уменьшаемымъ,

перемѣняя у вычитаемого многочлена знаки на противоположные; напр., вычитаніе:

$$(7a^2 - 2ab + b^2) - (5a^2 - 2b^2 + 4ab)$$

всего удобнѣе расположить такъ:

$$\begin{array}{r} 7a^2 - 2ab + b^2 \\ + 5a^2 - 4ab + 2b^2 \\ \hline 2a^2 - 6ab + 3b^2 \end{array}$$

(въ вычитаемомъ многочленѣ верхніе знаки поставлены тѣ, какіе были даны, а внизу они перемѣнены на противоположные).

49. Раскрытие скобокъ, передъ которыми стоитъ знакъ + или —. Пусть требуется раскрыть скобки въ выраженіи:

$$2a + (a - 3b + c) - (2a - b + 2c).$$

Это надо понимать такъ, что требуется надъ многочленами, стоящими внутри скобокъ, произвести тѣ дѣйствія, которыя указываются знаками передъ скобками. Произведя эти дѣйствія по правиламъ сложения и вычитанія, получимъ:

$$2a + a - 3b + c - 2a + b - 2c = a - 2b - c.$$

Изъ правилъ сложения и вычитанія многочленовъ слѣдуетъ, что раскрывая скобки, передъ которыми стоитъ +, мы не должны измѣнять знаковъ внутри скобокъ, а раскрывая скобки, передъ которыми стоитъ знакъ —, мы должны передъ всѣми членами, стоящими внутри скобокъ, измѣнить знаки на противоположные.

Пусть еще требуется раскрыть скобки въ выраженіи:

$$10p - [3p + (5p - 10) - 4].$$

Для этого раскроемъ сначала внутреннія скобки, а затѣмъ внѣшнія:

$$10p - [3p + 5p - 10 - 4] = 10p - 3p - 5p + 10 + 4 = 2p + 14.$$

Можно поступить и въ обратномъ порядкѣ, т.-е. сначала раскрыть внѣшнія скобки, а потомъ внутреннія. Раскрывая

внѣшнія скобки, мы должны принимать многочленъ, стоящій во внутреннихъ скобкахъ, за одинъ членъ и поэтому не должны измѣнять знаковъ внутри этихъ скобокъ:

$$\begin{aligned} 10p - [3p + (5p - 10) - 4] &= 10p - 3p - (5p - 10) + 4 = \\ &= 10p - 3p - 5p + 10 + 4 = 2p + 14. \end{aligned}$$

50. Заключение въ скобки. Для преобразованія многочлена часто бываетъ полезно заключить въ скобки совокупность нѣкоторыхъ его членовъ, при чемъ передъ скобками иногда желательно поставить +, т.-е. изобразить многочленъ въ видѣ суммы, а иногда —, т.-е. изобразить многочленъ въ видѣ разности. Пусть, напр., въ многочленѣ $a + b - c$ мы желаемъ заключить въ скобки два послѣднихъ члена, поставивъ передъ скобками знакъ +. Тогда пишемъ такъ:

$$a + b - c = a + (b - c),$$

т.-е. внутри скобокъ оставляемъ тѣ же знаки, какіе были въ данномъ многочленѣ. Что такое преобразование вѣрно, убѣдимся, если раскроемъ скобки по правилу сложения; тогда получимъ снова данный многочленъ.

Пусть въ томъ же многочленѣ $a + b - c$ требуется заключить въ скобки два послѣднихъ члена, поставивъ передъ скобками знакъ м и н у с ъ. Тогда пишемъ такъ:

$$a + b - c = a - (-b + c) = a - (c - b),$$

т.-е. внутри скобокъ передъ всѣми членами перемѣняемъ знаки на противоположные. Что такое преобразование вѣрно, убѣдимся, если раскроемъ скобки по правилу вычитанія; тогда получимъ снова данный многочленъ.

Упражненія.

Къ § 46.

76. $A + (x - y - z)$. 77. $(2m^2 - n^3) + (3n^2 - m^2)$.
 78. $(5a + 3b - 2c) + (2b - 7a + 5c)$.
 79. $(m^2 + 2mn + n^2) + (m^2 - 2mn + n^2) + (m^2 - n^2)$.

$$80. + \begin{cases} 4a^3 - 5a^2b + 7ab^2 - 9b^3 \\ -2a^3 + 4a^2b - ab^2 - 4b^3 \\ 6a^3 - 10a^2b + 8ab^2 + 10b^3 \end{cases}$$

$$81. (5a^3 - 4a^2 + 7a - 5) + (2a^3 - 3a^2 + 5a - 8) + (6a^3 - 3a + 7).$$

$$82. 5ax^3 - 2ab^2x + c^3 - abcx + (-2c^3 + 4ab^2x + 2ax^3 - 3c^2d).$$

Къ § 48.

$$83. A - (m - n - p). \quad 84. 18 - (x - 7). \quad 85. 40 - (-5 + 2a).$$

$$86. 3a^2 - (5b + 2a^2 - c). \quad 87. (3a - 3b + c) - (a + 2b - c).$$

$$88. (2a - 3b) - (3a - 4b) - (a + b) - (a - 3b).$$

$$89. 5ax^3 - 2ab^2x + c^2 - abcx - (-2c^3 + 4ab^2x + 2ax^3 - abcx).$$

$$90. (5a^3 - 4a^2b - 4ab^2 + 8c^3) - (2a^3 - 5a^2b - 6ab^2 + b^3).$$

$$91. \text{Упростить выражение:}$$

$$x = (2a^2 - 2b^2 + c^2) - (a^2 + b^2 - 4c^2) - (a^2 - 2b^2 - c^2) + (3a^2 + 4b^2 - 3c^2)$$

Къ § 49.

Раскрыть скобки въ слѣдующихъ выраженіяхъ и сдѣлать діленіе:

$$92. x + [x - (x - y)]. \quad 93. m - \{n - [m + (m - n)] + m\}.$$

$$94. 2a - (2b - d) - [a - b - (2c - 2d)].$$

$$95. a - \{a - [a - (a - 1)]\}.$$

$$96. a + b - c - [a - (b - c)] - [a + (b + c) - (a - c)].$$

$$97. a - (b - c) - [b - (c - a)] + [c - (b - a)] - [c - (a + b)].$$

$$98. [3a^3 - (5a^2b + 7ab^2 - 3b^3)] - [10b^3 + 12a^2 - (14ab^2 + 5a^2b)].$$

$$99. (3x^2 - 4y^2) - (x^2 - 2xy + y^2) + [2x^2 + 2xy + (-4xy + 3y^2)].$$

Къ § 50.

100. Въ многочленѣ $a - b - c + d$, не измѣняя его численной величины, 1) заключить въ скобки три послѣднихъ члена, поставивъ передъ скобками знакъ $-$; 2) заключить въ скобки два послѣднихъ члена, поставивъ передъ скобками знакъ $+$; 3) заключить въ скобки два среднихъ члена, поставивъ передъ скобками знакъ $-$.

101. Многочленъ $5x^3 - 3x^2 + x - 1$ представить въ видѣ суммы двухъ слагаемыхъ, изъ которыхъ первое было бы $5x^3 - 3x^2$.

102. Тотъ же многочленъ представить въ видѣ разности, въ которой уменьшаемое было бы $5x^3 + x$.

Алгебраическое умноженіе.

51. Умноженіе степеней одного и того же числа. Пусть надо умножить a^4 на a^3 ; другими словами,

требуется умножить a^4 на произведеніе трехъ сомножителей: aaa . Но чтобы умножить на произведеніе, достаточно умножить на перваго сомножителя, полученный результатъ умножить на втораго сомножителя и т. д.; поэтому;

$$a^4 a^3 = a^4 (aaa) = aaaaaaa = a^{4+3} = a^7.$$

m разъ n разъ $m+n$ разъ

Вообще: $a^m a^n = (aa\dots a)(aa\dots a) = aa\dots aaa\dots a = a^{m+n}$.

Правило. При умноженіи степеней одного и того же числа показатели ихъ складываются.

Примѣры: 1) $aa^6 = a^{1+6} = a^7$; 2) $m^{10} m^3 = m^{10+3} = m^{13}$;

$$3) x^{2n} x^{3n} = x^{2n+3n} = x^{5n};$$

$$4) p^{r-2} p^{r+2} = p^{(r-2)+(r+2)} = p^{r-2+r+2} = p^{2r}.$$

55. Умноженіе одночленовъ. Пусть даю умножить $+3a^2b^3c$ на $-5a^3b^4d^2$. Такъ какъ одночленъ $-5a^3b^4d^2$ представляетъ собою произведеніе 4-хъ сомножителей: $-5 \cdot a^3 \cdot b^4 \cdot d^2$, то для умноженія $+3a^2b^3c$ на $-5a^3b^4d^2$ достаточно умножить множимое на перваго сомножителя -5 , результатъ умножить на втораго сомножителя a^3 и т. д. Значить:

$$\begin{aligned} (+3a^2b^3c)(-5a^3b^4d^2) &= (+3a^2b^3c)(-5)a^3b^4d^2 = \\ &= (+3)a^2b^3c(-5)a^3b^4d^2. \end{aligned}$$

Въ послѣднемъ произведеніи, основываясь на сочетательномъ свойствѣ (§ 35₂), соединимъ сомножителей въ такія группы:

$$[(+3)(-5)](a^2a^3)(b^3b^4)cd^2 = -15a^5b^7cd^2.$$

$$\text{Слѣдовательно: } (+3a^2b^3c)(-5a^3b^4d^2) = -15a^5b^7cd^2.$$

Правило. Чтобы перемножить одночлены, перемножаютъ ихъ коэффициенты, складываютъ показатели одинаковыхъ буквъ, а тѣ буквы, которыя входятъ только въ одного сомножителя, переносятъ въ произведеніе съ ихъ показателями.

При умноженіи коэффициентовъ надо, конечно, руководиться правиломъ знаковъ, т.-е. что при умноженіи двухъ чиселъ одинаковые знаки даютъ +, а разные —.

- Примѣры:** 1) $(0,7a^3xy^2)(3a^4x^2)=2,1a^7x^3y^2$;
 2) $(\frac{1}{2}mq^3)^2=(\frac{1}{2}mq^3)(\frac{1}{2}mq^3)=\frac{1}{4}m^2q^6$;
 3) $(1,2a^r m^{n-1})(\frac{3}{4}am)=0,9a^{r+1}m^n$.
 4) $(-3,5x^2y)(\frac{3}{4}x^3)=-\frac{21}{8}x^5y$;
 5) $(4a^nb^3)(-7ab^n)=-28a^{n+1}b^{n+3}$.

56. Умноженіе многочлена на одночленъ.

Пусть дано умножить многочленъ $a+b-c$ на одночленъ, который мы обозначимъ одною буквою m :

$$(a+b-c)m.$$

Всякій многочленъ представляетъ собою сумму алгебраическихъ чиселъ. Но чтобы умножить сумму, достаточно умножить каждое слагаемое отдѣльно и результаты сложить; поэтому:

$$(a+b-c)m=[a+b+(-c)]m=am+bm+(-c)m.$$

Но $(-c)m=-cm$ и $+(-cm)=-cm$; значитъ:

$$(a+b-c)m=am+bm-cm.$$

Правило. Чтобы умножить многочленъ на одночленъ, умножаютъ на этотъ одночленъ каждый членъ многочлена и полученные произведенія складываютъ.

Такъ какъ произведеніе не измѣняется отъ перемѣны мѣстъ сомножителей, то это правило примѣнимо также и къ умноженію одночлена на многочленъ.

Примѣръ. Пусть требуется произвести умноженіе:

$$(3x^3-2ax^2+5a^2x-1)(-4a^2x^3).$$

Производимъ дѣйствія въ такомъ порядкѣ:

$$(3x^3)(-4a^2x^3)=-12a^2x^6; \quad (-2ax^2)(-4a^2x^3)=+8a^3x^5;$$

$$(+5a^2x)(-4a^2x^3)=-20a^4x^4; \quad (-1)(-4a^2x^3)=+4a^2x^3.$$

Искомое произведеніе будетъ:

$$-12a^2x^6+8a^3x^5-20a^4x^4+4a^2x^3.$$

Примѣры.

- 1) $(a^2-ab+b^2)3a=a^2(3a)-(ab)(3a)+b^2(3a)=3a^3-3a^2b+3ab^2$;
 2) $(7x^3+\frac{3}{4}ax-0,3)(2,1a^2x)=(7x^3)(2,1a^2x)+(\frac{3}{4}ax)(2,1a^2x)-$
 $-(0,3)(2,1a^2x)=14,7a^2x^4+1,575a^3x^2-0,63a^2x$.
 3) $(5x^{n-1}-3x^{n-2}+1)(-2x)=-10x^n+6x^{n-1}-2x$.

57. Умноженіе многочлена на многочленъ.

Пусть дано умножить:

$$(a+b-c)(d-e).$$

Разсматривая множимое, какъ одночленъ, мы можемъ сдѣлать умноженіе по правилу умноженія одночлена на многочленъ:

$$(a+b-c)(d-e)=(a+b-c)d-(a+b-c)e.$$

Разсматривая теперь выраженіе $a+b-c$, какъ многочленъ, мы можемъ вторично примѣнить правило умноженія многочлена на одночленъ:

$$(a+b-c)(d-e)=ad+bd-cd-(ae+be-ce).$$

Наконецъ, раскрывъ скобки по правилу вычитанія, получимъ:

$$(a+b-c)(d-e)=ad+bd-cd-ae-be+ce.$$

Правило. Чтобы умножить многочленъ на многочленъ, умножаютъ каждый членъ множимаго на каждый членъ множителя и полученные произведенія складываютъ.

Примѣръ. $(a^2-5ab+b^2-3)(a^3-3ab^2+b^3)$.

Умножимъ сначала всѣ члены множимаго на 1-й членъ множителя:

$$(a^2-5ab+b^2-3)a^3=a^5-5a^4b+a^3b^2-3a^3.$$

Затѣмъ умножимъ всѣ члены множимаго на 2-й членъ множителя:

$$(a^2-5ab+b^2-3)(-3ab^2)=-3a^3b^2+15a^2b^3-3ab^4+9ab^2.$$

Далѣе умножимъ всѣ члены множимаго на 3-й членъ множителя:

$$(a^2-5ab+b^2-3)(+b^3)=a^2b^3-5ab^4+b^5-3b^3.$$

Наконецъ, сложимъ полученные произведенія и сдѣлаемъ приведеніе подобныхъ членовъ; окончательный результатъ будетъ:

$$a^5 - 5a^4b - 2a^3b^2 - 3a^3 + 16a^2b^3 - 8ab^4 + 9ab^2 + b^5 - 3b^2.$$

Примѣры.

1) $(a-b)(m-n-p) = am - bm - an + bn - ap + bp;$

2) $(x^2 - y^2)(x + y) = x^3 - xy^2 + x^2y - y^3;$

3) $(3an + 2n^2 - 4a^2)(n^2 - 5an) =$
 $= 3an^3 + 2n^4 - 4a^2n^2 - 15a^2n^2 - 10an^3 + 20a^3n =$
 $= -7an^3 + 2n^4 - 19a^2n^2 + 20a^3n;$

4) $(2a^2 - 3)^2 = (2a^2 - 3)(2a^2 - 3) = (2a^2)^2 - 3(2a^2) -$
 $- 3(2a^2) + 9 = 4a^4 - 6a^2 - 6a^2 + 9 = 4a^4 - 12a^2 + 9.$

Умноженіе расположенныхъ многочленовъ.

58. Опредѣленіе. Расположить многочленъ по степенямъ какой-нибудь одной буквы значитъ написать его члены въ такомъ порядкѣ, чтобы показатели этой буквы увеличивались или уменьшались отъ перваго члена къ послѣднему.

Такъ, многочленъ $1 + 2x + 3x^2 - x^3 - \frac{1}{2}x^4$ расположенъ по возрастающимъ степенямъ буквы x . Тотъ же многочленъ будетъ расположенъ по убывающимъ степенямъ буквы x , если члены его напишемъ въ обратномъ порядкѣ:

$$-\frac{1}{2}x^4 - x^3 + 3x^2 + 2x + 1.$$

Буква, по которой расположить многочленъ, наз. г л а в н о й его буквой. Когда члены многочлена содержать нѣсколько буквъ и ни одной изъ нихъ не приписывается какого-либо особаго значенія, то безразлично, какую изъ нихъ считать за главную.

Членъ, содержащій главную букву съ наибольшимъ показателемъ, наз. в ы с ш и м ь членомъ многочлена; членъ, содержащій главную букву съ наименьшимъ показателемъ или не содержащій ея вовсе, наз. н и з ш и м ь членомъ многочлена.

59. Умноженіе расположенныхъ многочленовъ всего удобнѣе производить такъ, какъ будетъ указано на слѣдующихъ примѣрахъ.

Примѣръ 1. Умножить $3x - 5 + 7x^2 - x^3$ на $2 - 8x^2 + x$.

$$\begin{array}{r} -x^3 + 7x^2 + 3x - 5 \\ -8x^2 + x + 2 \\ \hline 8x^5 - 56x^4 - 24x^3 + 40x^2 \dots \text{произведен. множимаго на } -8x^2. \\ -x^4 + 7x^3 + 3x^2 - 5x \dots \text{произведен. множимаго на } +x. \\ \hline -2x^3 + 14x^2 + 6x - 10 \text{ произведен. множимаго на } +2. \\ \hline 8x^5 - 57x^4 - 19x^3 + 57x^2 + x - 10 \text{ полное произведеніе.} \end{array}$$

Расположивъ оба многочлена по убывающимъ степенямъ одной и той же буквы, пишутъ множителемъ подъ множимымъ и подъ множителемъ проводятъ черту. Умножаютъ всѣ члены множимаго на 1-й членъ множителя (на $-8x^2$) и полученное частное произведеніе пишутъ подъ чертою. Умножаютъ затѣмъ всѣ члены множимаго на 2-й членъ множителя (на $+x$) и полученное второе частное произведеніе пишутъ подъ первымъ частнымъ произведеніемъ такъ, чтобы подобные члены стояли подъ подобными. Такъ же поступаютъ при умноженіи всѣхъ членовъ множимаго на слѣдующіе члены множителя. Подъ послѣднимъ частнымъ произведеніемъ проводятъ черту; подъ этою чертою пишутъ полное произведеніе, складывая всѣ частныя произведенія.

Можно также оба многочлена расположить по возрастающимъ степенямъ главной буквы и затѣмъ

производить умноженіе въ томъ порядкѣ, какъ было указано:

$$\begin{array}{r}
 -5+3x+7x^2-x^3 \\
 \underline{2+x-8x^2} \\
 -10+6x+14x^2-2x^3 \dots \dots \dots \text{произведеніе на } 2. \\
 \underline{-5x+3x^2+7x^3-x^4} \dots \dots \dots \text{произведеніе на } +x. \\
 +40x^2-24x^3-56x^4+8x^5 \dots \text{произведеніе на } -8x^2. \\
 \underline{+10+x+57x^2-19x^3-57x^4+8x^5} \dots \text{полное произведеніе.}
 \end{array}$$

Удобство этихъ приемовъ, очевидно, состоитъ въ томъ, что при этомъ подобные члены располагаются другъ подъ другомъ и, слѣд., ихъ не нужно отыскивать.

Примѣръ 2. Умножить a^3+5a-3 на a^2+2a-1 .

$$\begin{array}{r}
 a^3 \quad \gg \quad +5a-3 \\
 \underline{a^2+2a-1} \\
 a^5 \quad +5a^3-3a^2 \\
 \quad +2a^4 \quad +10a^2-6a \\
 \quad \quad -a^3 \quad -5a+3 \\
 \hline
 a^5+2a^4+4a^3+7a^2-11a+3
 \end{array}$$

Когда въ данныхъ многочленахъ недостаетъ нѣкоторыхъ промежуточныхъ членовъ, то на мѣстѣ этихъ членовъ полезно оставлять пустыя пространства для болѣе удобнаго подписыванія подобныхъ членовъ, какъ мы это сдѣлали въ этомъ примѣрѣ.

60. Высшій и низшій члены произведенія.

Изъ разсмотрѣннхъ примѣровъ умноженія расположенныхъ многочленовъ слѣдуетъ:

высшій членъ произведенія равенъ произведенію высшаго члена множимаго на высшій членъ множителя; низшій членъ произведенія равенъ произведенію низшаго члена множимаго на низшій членъ множителя.

Остальные члены произведенія могутъ получиться отъ соединенія нѣсколькихъ подобныхъ членовъ въ одинъ.

Можетъ даже случиться, что въ произведеніи, послѣ приведенія въ немъ подобныхъ членовъ, всѣ члены уничтожатся, кромѣ высшаго и низшаго.

Примѣръ. $x^4+ax^3+a^2x^2+a^3x+a^4$

$$\begin{array}{r}
 x-a \\
 \hline
 x^5+ax^4+a^2x^3+a^3x^2+a^4x \\
 -ax^4-a^2x^3-a^3x^2-a^4x-a^5 \\
 \hline
 x^5 \quad \gg \quad \gg \quad \gg \quad -a^5=x^5-a^5.
 \end{array}$$

61. Число членовъ произведенія. Пусть во множимомъ 5, а во множителѣ 3 члена. Умноживъ каждый членъ множимаго на 1-й членъ множителя, мы получимъ 5 членовъ произведенія; умноживъ каждый членъ множимаго на 2-й членъ множителя, получимъ еще 5 членовъ произведенія, и т. д.; значитъ, всѣхъ членовъ произведенія будетъ 5 · 3, т.-е. 15. Вообще, число членовъ произведенія, до соединенія въ немъ подобныхъ членовъ, равно произведенію числа членовъ множимаго на число членовъ множителя.

Такъ какъ высшій и низшій члены произведенія не могутъ имѣть подобныхъ членовъ, а всѣ прочіе могутъ уничтожиться, то наименьшее число членовъ произведенія, послѣ приведенія въ немъ подобныхъ членовъ, равно 2.

Нѣкоторыя формулы умноженія двучленовъ.

62. I. Произведеніе суммы двухъ чиселъ на ихъ разность равно разности квадратовъ тѣхъ же чиселъ; т.-е.

$$(a+b)(a-b)=a^2-b^2.$$

Дѣйствительно: $(a+b)(a-b)=a^2+ab-ab-b^2=a^2-b^2$.

II. Квадратъ суммы двухъ чиселъ равенъ квадрату перваго числа, плюсъ удвоенное произведеніе перваго числа на второе, плюсъ квадратъ втораго числа; т.-е.

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2.$$

Дѣйствительно: $(a+b)^2=(a+b)(a+b)=a^2+ab+ab+b^2=a^2+2ab+b^2$.

III. Квадратъ разности двухъ чиселъ равенъ квадрату перваго числа, минусъ удвоенное произведение перваго числа на второе, плюсъ квадратъ втораго числа, т.-е.

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Дѣйствительно: $(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - \underline{ab} - \underline{ab} + b^2 = a^2 - 2ab + b^2.$

IV. Кубъ суммы двухъ чиселъ равенъ кубу перваго числа, плюсъ утроенное произведение квадрата перваго числа на второе, плюсъ утроенное произведение перваго числа на квадратъ втораго, плюсъ кубъ втораго числа; т.-е.

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Дѣйствительно: $(a+b)^3 = (a+b)^2(a+b) = (a^2 + 2ab + b^2)(a+b) = a^3 + \underline{2a^2b} + \underline{ab^2} + \underline{a^2b} + \underline{2ab^2} + b^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$

V. Кубъ разности двухъ чиселъ равенъ кубу перваго числа, минусъ утроенное произведение квадрата перваго числа на второе, плюсъ утроенное произведение перваго числа на квадратъ втораго, минусъ кубъ втораго числа; т.-е.

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3.$$

Дѣйствительно: $(a-b)^3 = (a-b)^2(a-b) = (a^2 - 2ab + b^2)(a-b) = a^3 - \underline{2a^2b} + \underline{ab^2} - \underline{a^2b} + \underline{2ab^2} - b^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3.$

63. Примѣненія этихъ формулъ. При помощи этихъ формулъ можно иногда производить умноженіе многочленовъ проще, чѣмъ обыкновеннымъ путемъ, какъ это видно изъ слѣдующихъ примѣровъ:

1) $(4a^3 - 1)^2 = (4a^3)^2 - 2(4a^3) \cdot 1 + 1^2 = 16a^6 - 8a^3 + 1;$

2) $(x+y)(y-x) = (y+x)(y-x) = y^2 - x^2;$

3) $\left(\frac{1}{3}x^{2m-1}y^3 + \frac{3}{4}x^{m+1}y\right)^2 = \left(\frac{1}{3}x^{2m-1}y^3\right)^2 + 2\left(\frac{1}{3}x^{2m-1}y^3\right)\left(\frac{3}{4}x^{m+1}y\right) + \left(\frac{3}{4}x^{m+1}y\right)^2 = \frac{1}{9}x^{4m-2}y^6 + \frac{1}{2}x^{3m}y^4 + \frac{9}{16}x^{2m+2}y^2;$

4) $(x+y+1)(x-y+1) = [(x+1)+y][(x+1)-y] = (x+1)^2 - y^2 = x^2 + 2x + 1 - y^2;$

5) $(a-b+c)(a+b-c) = [a-(b-c)][a+(b-c)] = a^2 - (b-c)^2 = a^2 - (b^2 - 2bc + c^2) = a^2 - b^2 + 2bc - c^2;$

6) $(2a+1)^3 = (2a)^3 + 3(2a)^2 \cdot 1 + 3(2a) \cdot 1^2 + 1^3 = 8a^3 + 12a^2 + 6a + 1;$

7) $(1-3x^2)^3 = 1^3 - 3 \cdot 1^2 \cdot 3x^2 + 3 \cdot 1 \cdot (3x^2)^2 - (3x^2)^3 = 1 - 9x^2 + 27x^4 - 27x^6.$

У п р а ж н е н і я.

Къ 54.

103. $a^8 \cdot a; a^8 \cdot a^3; a^m \cdot a^n; (2a)^3 \cdot (2a)^4.$
 104. $x^{m-1} \cdot x; x^{m-3} \cdot x^{m+2}; y^{2m} \cdot y^m \cdot y.$

Къ § 55.

105. $(5a^2b^3)(3ab^4c);$ 106. $\left(\frac{3}{4}ax^3\right)\left(\frac{5}{6}ax^3\right).$ 107. $(0,3abx^m)(2,7a^2bx^2).$
 108. $(7a^2b^4c)(3ab^3c^2)^{(1/21)a^3b}.$ 109. $(\sqrt[3]{7mx^2y^3})^2.$ 110. $(0,1x^m y^{m+1})^2.$
 111. $(2a^3bx^2)^3.$ 112. $(\sqrt[1/2]{m^2ny^3})^3.$ 113. $(3a^3bc^2)(-\sqrt[2]{3a^4b^2c}).$
 114. $(-0,8x^3y)(-\sqrt[3]{8xy^m}).$ 115. $(+5a^mb^2)(-7ab^m).$
 116. $(-\sqrt[5]{6m^3n^4y})(-\sqrt[3]{7mn^2y^3}).$ 117. $(-0,2a^3b^2)^2.$
 118. $(-2x^3y^2)^3.$

Къ § 56.

119. $(a-b+c)8; (m+n-p)0,8; (2x-3y+z)^5/4.$
 120. $(3a^2-2b^3+c)2ab$ 121. $(5a-4a^2b+3a^3b^2-7a^4b^3)(5a^2b)$
 122. $(3a^2b)(3a^3-4a^2b+6ab-b^3).$
 123. $(\sqrt[2]{7a^3b})(\sqrt[2]{7a^2b^3c})(\sqrt[4]{5a^2b^2-5ab^3}).$
 124. Упростить выраженіе: $(x^2-xy+y^2)z + (y^2-yz+z^2)x + (z^2-zx+x^2)y + 3xyz$ и показать, что оно тождественно съ выраженіемъ: $xy(x+y) + yz(y+z) + zx(z+x).$

Къ § 57.

125. $(a+b-c)(m-n).$ 126. $(2a-b)(3a+b^2).$
 127. $(a+\sqrt[1/2]{b})(2a-b).$ 128. $(x^2+xy+y^2)(x-y).$
 129. $(x^2-xy+y^2)(x+y).$ 130. $(7x-8y)^2; (0,3ax^2-\frac{1}{2})^2.$
 131. $(\sqrt[1/4]{a^3x-2a^2x^2})^2.$
 132. $(15a^2-10b)(3a-2b) - (4a^2-5b)(5a-2b).$
 133. $(2x^3-x^2+3x-2)(3x^2+2x-1) - (5x^2-x-1)(x-1).$

Къ §§ 59, 60, 61.

134. Расположить многочлены по убывающимъ степенямъ буквы x и сдѣлать ихъ умноженіе: $24x+6x^2+x^3+60$ и $12x-6x^2+12+x^3$.

135. Расположить многочлены по возрастающимъ степенямъ буквы x и сдѣлать умноженіе: $4x^2y^2+x^4+8xy^3-2x^3y+16y^4$ и $-2y+x$.

136. $(x^5-x^3+x-1)(x^4+x^2-1)$.

137. $(a^3-3a^2x+3ax^2-x^3)(a+x)$.

138. $(3x^3-5x^2y+4xy^2-y^3)(2x^2-4xy+3y^2)$.

139. $(a^4-a^3b+a^2b^2-ab^3+b^4)(a+b)$.

140. Въ последнемъ примѣрѣ какой будетъ высшій и какой низшій членъ произведенія? Какъ ихъ получить?

141. Въ томъ же примѣрѣ какое число членовъ въ произведеніи до соединенія въ немъ подобныхъ членовъ? Какое число членовъ остается послѣ приведенія подобныхъ членовъ? Почему въ произведеніи не можетъ быть меньше 2-хъ членовъ?

Къ §§ 62, 63.

142. $(m+n)(m-n)$; повѣрить при $m=10, n=2$.

143. $(a+1)(a-1)$. 144. $(2a+5)(2a-5)$.

145. $(3ax^2-1/2)(3ax^2+1/2)$. 146. $(a^2+1)(1-a^2)$.

147. $(2b+a)(a-2b)$. 148. $(\frac{2}{3}a-\frac{2}{5}b)(\frac{2}{3}a+\frac{2}{5}b)$.

149. $(b+\frac{1}{2})(b-\frac{1}{2})$. 150. $(0,3x^2-10y^3)(0,3x^2+10y^3)$.

151. $(x+y)^2$; повѣрить при $x=3, y=2; x=1/2, y=1/2$.

152. $(a+1)^2$. 153. $(1+2a)^2$. 154. $(x+\frac{1}{2})^2$. 155. $(2x+3)^2$.

156. $(3a^2+1)^2$. 157. $(0,1xm+5x)^2$. 158. $(4a^2b+1/2ab^2)^2$.

159. $(0,8a^3x+3/8ax^2)^2$. 160. $(m-n)^2$; повѣрить при $m=5, n=3; m=1/2, n=1/3$. 161. $(5a-2)^2$. 162. $(3a^2b-1/2)^2$.

163. $(3a^2b-4ac)^2$. 164. $(0,2x^3-3/8x)^2$. 165. $(2m+3n)^2$.

166. $(x-1)^3$. 167. $(3a^2+4b^2)^3$. 168. $(4a^2b-2ab^2)^3$.

169. $(x^2+1)(x+1)(x-1)$. 170. $(4x^2+y^2)(2x+y)(2x-y)$.

171. $(m+n-p)(m+n+p)$. 172. $(a+b+c)(a-b-c)$.

173. $[(a+b)+(c+d)][(a+b)-(c+d)]$.
Упростить выраженія:

174. $x=(a+b)^2+(a-b)^2$. 175. $y=(a+b)^2-(a-b)^2$.

Алгебраическое дѣленіе.

64. Дѣленіе степеней одного и того же числа. Пусть дано раздѣлить $a^8 : a^5$. Такъ какъ дѣлимое равно дѣлителю, умноженному на частное, а при умноженіи показатели одинаковыхъ буквъ складываются, то $a^8 : a^5 = a^{8-5} = a^3$; дѣйствительно: $a^8 = a^5 \cdot a^3$.

Правило. При дѣленіи степеней одного и того же числа показатель дѣлителя вычитается изъ показателя дѣлимаго.

65. Нулевой показатель. Когда показатель дѣлителя равенъ показателю дѣлимаго, то частное равно 1; напр.: $a^5 : a^5 = 1$, потому что $a^5 = a^5 \cdot 1$. Условимся производить вычитаніе показателей и въ этомъ случаѣ, тогда получимъ въ частномъ букву съ нулевымъ показателемъ: $a^5 : a^5 = a^{5-5} = a^0$. Показатель 0 не имѣетъ того значенія, которое мы придавали показателямъ раньше, такъ какъ нельзя повторить число множителемъ 0 разъ. Мы условимся подъ видомъ a^0 разумѣть частное отъ дѣленія одинаковыхъ степеней числа a , и такъ какъ это частное равно 1, то мы должны принять, что $a^0 = 1$. Въ такомъ смыслѣ обыкновенно и рассматриваютъ это выраженіе.

66. Дѣленіе одночленовъ. Пусть дано раздѣлить $12a^7b^5c^2d^3$ на $-4a^4b^3d^3$. По опредѣленію дѣленія частное, умноженное на дѣлителя, должно составить дѣлимое. Но при умноженіи одночленовъ коэффициенты ихъ перемножаются, показатели одинаковыхъ буквъ складываются, а тѣ буквы, которыя входятъ только въ одного сомножителя, переносятся въ произведеніе съ ихъ показателями (§ 55). Значитъ, у искомаго частнаго коэффициентъ долженъ быть $12 : 4$, т.-е. 3, показатели буквъ a и b получатся вы-

читаніемъ изъ показателей дѣлимаго показателей тѣхъ же буквъ дѣлителя; буква c должна перейти въ частное съ своимъ показателемъ, а буква d совсѣмъ не должна войти въ частное, или войдетъ въ него съ показателемъ 0. Такимъ образомъ:

$$12a^7b^5c^2d^3 : 4a^4b^3d^3 = 3a^3b^2c^2d^0 = 3a^3b^2c^2.$$

Что найденное частное вѣрно, можно убѣдиться повѣркой: умноживъ $3a^3b^2c^2$ на $4a^4b^3d^3$, получимъ дѣлимое.

Правило. Чтобы раздѣлить одночленъ на одночленъ, коэффициентъ дѣлимаго дѣлятъ на коэффициентъ дѣлителя, изъ показателей буквъ дѣлимаго вычитаютъ показатели тѣхъ же буквъ дѣлителя и переносятъ въ частное, безъ измѣненія показателей, тѣ буквы дѣлимаго, которыхъ нѣтъ въ дѣлителѣ.

Примѣры.

1) $3m^3n^4x : 4m^2nx = \frac{3}{4}mn^3x^0 = \frac{3}{4}mn^3;$

2) $-ax^ny^m : \frac{3}{4}axy^2 = -\frac{4}{3}a^0x^{n-1}y^{m-2} = -\frac{4}{3}x^{n-1}y^{m-2};$

3) $-0,6a^3(x+y)^4 : -2,5a(x+y)^2 = 0,24a^2(x+y)^2.$

67. Невозможное дѣленіе. Когда частное отъ дѣленія одночленовъ не можетъ быть выражено одночленомъ, то говорятъ, что дѣленіе н е в о з м о ж н о. Это бываетъ въ двухъ случаяхъ:

1) когда въ дѣлителѣ есть буквы, какихъ нѣтъ въ дѣлимомъ;

2) когда показатель какой-нибудь буквы дѣлителя больше показателя той же буквы въ дѣлимомъ.

Пусть, напр., дано раздѣлить $4a^2b$ на $2ac$. Всякій одночленъ, умноженный на $2ac$, даетъ въ произведеніи такой одночленъ, который содержитъ букву c ; такъ какъ въ нашемъ дѣлимомъ нѣтъ этой буквы, то, значитъ, частное не можетъ быть выражено одночленомъ.

Также невозможно дѣленіе $10a^3b^2 : 5ab^3$, потому что всякій одночленъ, умноженный на $5ab^3$, даетъ въ произведеніи такой одночленъ, который содержитъ букву b съ показателемъ 3 или бѣльшимъ 3, тогда какъ въ нашемъ дѣлимомъ эта буква стоитъ съ показателемъ 2.

68. Дѣленіе многочлена на одночленъ.

Пусть требуется раздѣлить многочленъ $a+b-c$ на одночленъ, который мы обозначимъ одною буквою m . Искомое частное можно выразить такъ:

$$(a+b-c) : m = \frac{a}{m} + \frac{b}{m} - \frac{c}{m}.$$

Чтобы убѣдиться въ вѣрности этого равенства, умножимъ предполагаемое частное на дѣлителя m . Если въ произведеніи получимъ дѣлимое, то частное вѣрно. Примѣняя правило умноженія многочлена на одночленъ, получимъ:

$$\left(\frac{a}{m} + \frac{b}{m} - \frac{c}{m}\right)m = \frac{a}{m} \cdot m + \frac{b}{m} \cdot m - \frac{c}{m} \cdot m = a + b - c.$$

Значитъ, предполагаемое частное вѣрно.

Правило. Чтобы раздѣлить многочленъ на одночленъ, дѣлятъ на этотъ одночленъ каждый членъ дѣлимаго и полученные частныя складываютъ.

Примѣры: 1) $(20a^3x^2 - 8a^2x^3 - ax^4 + 3a^3x^3) : 4ax^2 =$

$$= 5a^2 - 2ax - \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}a^2x;$$

2) $(14m^2 - 21m^2 - 1) : -7m^2 = -2m^{2-2} + 3m^{2-3};$

3) $\left(\frac{1}{2}x^3y^3 - 0,3x^2y^4 + 1\right) : 2x^2y^2 =$

$$= \frac{1}{4}xy - 0,15y^2 + \frac{1}{2x^2y^2}.$$

69. Дѣленіе одночлена на многочленъ.

Частное отъ дѣленія одночлена на многочленъ не можетъ

быть выражено ни одночленомъ, ни многочленомъ. Дѣйстви- тельно, если предположимъ, что частное $a : (b+c-d)$ равно какому-нибудь одночлену или многочлену, то произ- веденіе этого частнаго на многочленъ $b+c-d$ дало бы тоже многочленъ, а не одночленъ a , какъ требуется дѣленіемъ.

70. Дѣленіе многочлена на многочленъ.

Частное отъ дѣленія многочлена на многочленъ можетъ быть выражено въ видѣ цѣлаго алгебраическаго выраженія лишь въ рѣдкихъ случаяхъ. Въ этомъ мы убѣдимся, когда разсмотримъ на примѣрѣ, какъ можно находить это част- ное.

Примѣръ 1. $(5x^2-19x^3+17x+6x^4-4) : (1-5x+3x^2)$.

Напишемъ оба многочлена по убывающимъ степенямъ буквы x и расположимъ дѣйствіе такъ, какъ оно располагается при дѣленіи цѣлыхъ чиселъ:

$$\begin{array}{r}
 6x^4-19x^3+5x^2+17x-4 \quad | \quad 3x^2-5x+1 \\
 \underline{+6x^4-10x^3+2x^2} \\
 \text{1-й остатокъ} \quad \quad -9x^3+3x^2+17x-4 \\
 \quad \underline{+9x^3+15x^2+3x} \\
 \text{2-й остатокъ} \quad \quad -12x^2+20x-4 \\
 \quad \underline{+12x^2+20x+4} \\
 \text{3-й остатокъ...} \quad \quad 0
 \end{array}$$

Предположимъ, что искомое частное равно какому- нибудь многочлену, и что члены этого многочлена распо- ложены тоже по убывающимъ степенямъ буквы x . Чтобы найти этотъ многочленъ, рассуждаемъ такъ.

Дѣлимое есть произведеніе дѣлителя на частное. Изъ умноженія расположенныхъ многочленовъ извѣстно (§ 60), что высшій членъ произведенія равенъ произведенію высшаго члена множимаго на высшій членъ мно- жителя. Въ дѣлимомъ высшій членъ есть первый, въ дѣли- телѣ и частномъ высшіе члены тоже первые. Значитъ, 1-й членъ дѣлимаго ($6x^4$) долженъ быть произведеніемъ

1-го члена дѣлителя ($3x^2$) на 1-й членъ частнаго. Отсюда слѣдуетъ: чтобы найти первый членъ частнаго, достаточно раздѣлить первый членъ дѣли- маго на первый членъ дѣлителя. Раздѣливъ, на- ходимъ первый членъ частнаго $2x^2$. Пишемъ его подъ чертою.

Умножимъ всѣ члены дѣлителя на первый членъ част- наго и полученное произведеніе вычтемъ изъ дѣлимаго. Для этого напишемъ его подъ дѣлимымъ такъ, чтобы по- добные члены стояли подъ подобными, и у всѣхъ членовъ вычитаемаго перемѣнимъ знаки на обратные. Получимъ послѣ вычитанія первой остатокъ. Если бы этотъ остатокъ оказался равнымъ нулю, то это значило бы, что въ частномъ никакихъ другихъ членовъ, кромѣ найденнаго перваго, нѣтъ, т.-е. что частное есть одночленъ. Если же, какъ въ нашемъ примѣрѣ, первый остатокъ не есть нуль, то будемъ рассуждать такъ:

Дѣлимое есть произведеніе всѣхъ членовъ дѣлителя на каждый членъ частнаго. Мы вычли изъ дѣлимаго произве- деніе всѣхъ членовъ дѣлителя на 1-й членъ частнаго; слѣд., въ 1-мъ остаткѣ заключается произведеніе всѣхъ членовъ дѣлителя на 2-й, на 3-й и т. д. члены частнаго. Высшій членъ въ остаткѣ есть 1-й; высшій членъ дѣлителя тоже 1-й; высшій членъ въ частномъ (не считая 1-го) есть 2-й членъ. Значитъ, 1-й членъ остатка ($-9x^3$) долженъ быть произведеніемъ 1-го члена дѣлителя на 2-й членъ частнаго. Отсюда заключаемъ: чтобы найти 2-й членъ частнаго, достаточно раздѣлить пер- вый членъ перваго остатка на первый членъ дѣлителя. Раздѣливъ, находимъ второй членъ частнаго $-3x$. Пишемъ его подъ чертою.

Умножимъ на 2-й членъ частнаго всѣ члены дѣлителя и полученное произведеніе вычтемъ изъ 1-го остатка. Полу-

чимъ 2-й остатокъ. Если этотъ остатокъ равенъ нулю, то дѣленіе окончено; если же, какъ въ нашемъ примѣрѣ, 2-й остатокъ не равенъ нулю, то будемъ разсуждать такъ:

Второй остатокъ есть произведеніе всѣхъ членовъ дѣлителя на 3-й, на 4-й и т. д. члены частнаго. Такъ какъ изъ этихъ членовъ частнаго высшій есть 3-й, то, подобно предыдущему, 3-й членъ частнаго найдемъ, если первый членъ 2-го остатка раздѣлимъ на первый членъ дѣлителя. Раздѣливъ, находимъ —4. Умноживъ на —4 всѣ члены дѣлителя и вычтя произведеніе изъ остатка, получимъ 3-й остатокъ. Въ нашемъ примѣрѣ этотъ остатокъ оказался нулемъ: это показываетъ, что въ частномъ другихъ членовъ, кромѣ найденныхъ, не можетъ быть. Если бы 3-й остатокъ былъ не 0, то, подобно предыдущему, надо было бы дѣлить 1-й членъ этого остатка на 1-й членъ дѣлителя; отъ этого получился бы 4-й членъ частнаго, и т. д.

Подобнымъ же образомъ можно выполнить дѣленіе, расположивъ оба многочлена по возрастающимъ степенямъ главной буквы:

$$\begin{array}{r|l} -4+17x+5x^2-19x^3+6x^4 & 1-5x+3x^2 \\ \hline +4+20x+12x^2 & -4-3x+2x^2 \\ \hline \text{» } -3x+17x^2-19x^3 & \\ +3x+15x^2+9x^3 & \\ \hline 2x^2-10x^3+6x^4 & \\ +2x^2+10x^3+6x^4 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

При такомъ расположеніи первые члены въ дѣлимомъ, дѣлителѣ, частномъ и остаткахъ будутъ низшіе. Такъ какъ низшій членъ произведенія (дѣлимаго) долженъ

равняться произведенію низшаго члена множимаго (дѣлителя) на низшій членъ множителя (частнаго), то ходъ разсужденій и порядокъ дѣйствія остаются тѣ же самые, какъ и въ томъ случаѣ, когда дѣлимое и дѣлитель расположены по убывающимъ степенямъ главной буквы.

Вотъ еще нѣкоторые примѣры дѣленія многочленовъ:

Примѣръ 2. $28x^4-13cx^3-26c^2x^2+15c^3x \mid 7x^2+2cx-5c^2$

$$\begin{array}{r|l} \text{» } \pm 8cx^2+20c^2x^2 & 4x^2-3cx \\ \hline -21cx^3-6c^2x^2+15c^3x & \\ \text{» } \mp 6c^2x^2+15c^3x & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Мы здѣсь не писали произведеній 1-го члена дѣлителя на 1-й, на 2-й и т. д. члены частнаго, потому что эти произведенія всегда равны тѣмъ членамъ, подъ которыми они подписываются, и при вычитаніи всегда сокращаются. Обыкновенно такъ и дѣлаютъ.

Примѣръ 3. $\frac{5}{2}+\frac{47}{12}x-3x^2+x^3 \mid \frac{-3+2x}{\frac{5}{6}-\frac{3}{4}x+\frac{1}{2}x^2}$

$$\begin{array}{r|l} \text{» } \frac{5}{3}x & \\ \hline \frac{9}{4}x-3x^2\dots & \\ \text{» } +\frac{3}{2}x^2 & \\ \hline \frac{3}{2}x^2+x^3 & \\ \text{» } -x^3 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Подписывая вычитаемаыя, мы можемъ писать ихъ прямо съ обратными знаками, какъ это мы дѣлали въ этомъ примѣрѣ. Въ остатку нѣтъ надобности сносить всѣ члены дѣлимаго.

Примѣръ 4.
$$\begin{array}{r} x^5 - a^5 \quad | \quad x - a \\ \gg + ax^4 \quad | \quad x^4 + ax^3 + a^2x^2 + a^3x + a^4 \\ \hline ax^4 - a^5 \\ \gg + a^2x^3 \\ \hline a^2x^3 - a^5 \\ \gg + a^3x^2 \\ \hline a^3x^2 - a^5 \\ \gg + a^4x \\ \hline a^4x - a^5 \\ \gg + a^5 \\ \hline 0 \end{array}$$

Подобнымъ образомъ можемъ убѣдиться, что разности: $x^3 - a^3$, $x^4 - a^4$, $x^6 - a^6$... (и вообще $x^m - a^m$) дѣлятся безъ остатка на разность $x - a$, т.-е. разность одинаковыхъ степеней двухъ чиселъ дѣлится безъ остатка на разность этихъ чиселъ.

71. Признаки невозможности дѣленія многочлена на многочленъ. Когда частное отъ дѣленія многочлена на многочленъ не можетъ быть выражено многочленомъ (или одночленомъ), то дѣленіе называютъ невозможнымъ. Вотъ признаки невозможнаго дѣленія:

1) Если показатель главной буквы въ высшемъ членѣ дѣлимаго меньше показателя той же буквы въ высшемъ членѣ дѣлителя, то дѣленіе невозможно, потому что тогда нельзя получить высшаго члена частного.

2) Если показатель главной буквы въ низшемъ членѣ дѣлимаго меньше показателя той же буквы въ низшемъ членѣ дѣлителя, то дѣленіе невозможно, потому что тогда нельзя получить низшаго члена частного.

3) Если показатели главной буквы въ высшемъ и низшемъ членахъ дѣлимаго не меньше соответственно показателей этой буквы въ высшемъ и низшемъ членахъ дѣлителя, то еще нельзя сказать, чтобы дѣленіе было возможно.

Въ этомъ случаѣ, чтобы судить о возможности дѣленія, надо приступить къ выполнению самаго дѣйствія и продолжать его до тѣхъ поръ, пока окончательно не убѣдимся въ возможности или невозможности получить цѣлое частное. При этомъ надо различать два случая:

I. Когда многочлены расположены по убывающимъ степенямъ главной буквы, то продолжаютъ дѣйствіе до тѣхъ поръ, пока въ остаткѣ не получится 0 (тогда дѣленіе возможно), или пока не доидутъ до такого остатка, первый членъ котораго содержитъ главную букву съ показателемъ, меньшимъ, чѣмъ первый членъ дѣлителя (тогда дѣленіе невозможно)

II. Когда многочлены расположены по возрастающимъ степенямъ главной буквы, то сколько бы ни продолжать дѣленія, нельзя получить такого остатка, у котораго первый членъ содержалъ бы главную букву съ показателемъ меньшимъ, чѣмъ у перваго члена дѣлителя, потому что при такомъ расположении показатели главной буквы въ первыхъ членахъ остатковъ идутъ, увеличиваясь (см. стран. 80). Въ этомъ случаѣ поступаютъ такъ: предположивъ, что цѣлое частное возможно, вычисляютъ заранее послѣдній членъ его, дѣля высшій членъ дѣлимаго (т.-е. послѣдній) на высшій членъ дѣлителя (на послѣдній). Найдя высшій членъ частного, продолжаютъ дѣленіе до тѣхъ поръ, пока въ частномъ не получится члена, у котораго показатель главной буквы равенъ показателю вычисленнаго члена. Если при этомъ получится остатокъ, то дѣленіе невозможно, потому что цѣлое частное не должно содержать членовъ выше того, который получается отъ дѣленія высшаго члена дѣлимаго на высшій членъ дѣлителя.

Примѣръ 1. $(3x^2 + 5x - 8) : (2x^3 - 4)$.

Дѣленіе невозможно, потому что $3x^2$ не дѣлится на $2x^3$.

Примѣръ 2. $(b^4 + 5b^3 - 3b^2 + 2b) : (b^3 - 2b^2)$.

Дѣленіе невозможно, потому что $2b$ не дѣлится на $2b^2$.

Примѣръ 3. $10a^4 - 2a^3 \gg + 3a + 4 \mid 2a^2 - 1$

$$\begin{array}{r} \gg + 5a^2 \\ \hline -2a^3 + 5a^2 + 3a \dots \\ \gg - a \\ \hline 5a^2 + 2a + 4 \\ \gg + \frac{5}{2} \\ \hline 2a + 6\frac{1}{2} \end{array}$$

Дѣленіе невозможно, потому что мы дошли до такого остатка, у котораго первый членъ не дѣлится на первый членъ дѣлителя.

Примѣръ 4. $4 + 3a \gg - 2a^3 + 10a^4 \mid \frac{-1 + 2a^2}{-4 - 3a - 8a^2}$

$$\begin{array}{r} \gg + 8a^2 \\ \hline 3a \mid 8a^2 - 2a^3 \\ \gg + 6a^3 \\ \hline 8a^2 + 4a^3 + 10a^4 \\ \gg + 16a^4 \\ \hline 4a^3 \mid 26a^4 \end{array}$$

Дѣленіе невозможно, потому что, продолжая дѣйствіе, мы получили бы въ частномъ членъ $-4a^3$, тогда какъ послѣдній членъ цѣлаго частнаго долженъ бы быть $5a^2$.

72. Повѣрка дѣленія. Чтобы повѣрить дѣленіе умножаютъ частное на дѣлителя и прибавляютъ къ произведенію остатокъ, если онъ есть; при правильномъ выполненіи дѣйствія въ результатѣ должно получиться дѣлимое. Для примѣра повѣримъ правильность послѣдняго дѣленія предыдущаго параграфа:

$$\begin{array}{r} -4 - 3a - 8a^2 \\ - 1 + 2a^2 \\ \hline + 4 + 3a + 8a^2 \\ - 8a^2 - 6a^3 - 16a^4 \\ \hline 4 + 3a - 6a^3 - 16a^4 \\ + 4a^3 + 26a^4 \\ \hline 4 + 3a - 2a^3 + 10a^4 \end{array}$$

Упражненія.

Къ § 66.

176. $10a^4 : 5$; 177. $8x^2y : 4$; 178. $17a^3 : -a^2$;
 179. $4a^8 : 2a^3$. 180. $10a^3b^2 : 2ab$; 181. $8a^5x^3y : 4a^3x^2$;
 182. $3ax^3 : -5ax$. 183. $-5mx^3y^5 : mx^3y$;
 184. $-ab^3x^4 : -5ab^2x^2$; 185. $\frac{3}{4}a^4b^2c : 7a^3b^2$.
 186. $-3,2x^{12}y^7z^4 : \frac{3}{4}x^{10}y^6z^4$; 187. $a^8b : -\frac{5}{6}a^5b$;
 188. $36a^mbx^3 : 6a^2bx$. 189. $10(a+b)^5 : 2(a+b)^3$;
 190. $12a^3mb^3 : 4a^{2mb}$.

Къ § 67.

191. Объяснить, почему невозможно дѣленіе слѣдующихъ одночленовъ: $3a^3b : 2abc$; $48x^5y^2 : 6x^3yz$; $20a^3b : 4a^3b^2$; $8a^2b^4c : 2a^3bc^2$;
 $3(a+x)^4 : (a+x)^5$.

Къ § 68.

192. $(27ab - 12ac + 15ad) : 3a$; 193. $(4a^2b + 6ab^2 - 12a^3b^5) : \frac{3}{4}ab$.
 194. $(36a^2x^5y^3 - 24a^3x^4y^2z + 4a^4x^3yz^2) : 4a^2x^2y$.
 195. $(3a^2x^5y + 6a^2x^2y^2 + 3a^2xy^3 - 3a^2xyz^2) : 3a^2xy$.

Къ § 70.

196. $(18x^5 - 54x^4 - 5x^3 - 9x^2 - 26x + 16) : (3x^2 - 7x - 8)$.
 197. $(x^4 - 5x^2 + 4) : (x^2 - 3x + 2)$.
 198. $(3ax^5 - 15a^2x^4 + 6a^3x^3) : (x^4 - 5ax^3 + 2a^2x^2)$.
 199. $(35a^7 - 36a^6 + 62a^5 - 53a^4 + 4a^3 - 7a^2 - 17a + 4) : (5a^4 - 3a^3 + 4a^2 - 3a - 4)$.
 200. $(x^6 - a^6) : (x^5 + ax^4 + a^2x^3 + a^3x^2 + a^4x + a^5)$.
 201. $(x^3 - a^3) : (x - a)$; 202. $(x^4 - a^4) : (x - a)$.

Къ §§ 71 и 72.

203. $(3a^6 - 5a^5 + 3a^4 - 2a^3 - 5a^2 + a) : (a^3 - 3a^2 + 4a - 2)$.
 204. $(2 - 3x + 4x^2 - 5x^3) : (1 - 3x + 4x^2)$ } (повѣрить дѣйствіе).
 205. $(2 - x + x^2 - 5x^3 + 4x^4) : (1 + x - 2x^2)$ }
 206. Раздѣлить $x^5 - 3ax^4 - 2a^2x^3 + 7a^3x^2 + a^4x - a^5$ на $x - a$ и убѣдиться, что остатокъ равенъ дѣлительному, къ которому x замѣненъ на a .
 207. Раздѣлить $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ на $x - 1$ и убѣдиться, что остатокъ равенъ дѣлительному, въ которомъ x замѣнено на 1, т.-е. остатокъ $= a + b + c + d + e$.

Разложение многочленовъ на множителей.

73. Укажемъ нѣкоторые простѣйшіе случаи, когда многочленъ можетъ быть разложенъ на множителей.

I. Если всѣ члены многочлена содержатъ общаго множителя, то его можно вынести за скобки, такъ какъ:

$$am + bm + cm = (a + b + c)m$$

Примѣры. 1) $16a^2b^3x - 4a^3b^2x^2 = 4a^2b^2x(4b - ax)$

2) $x^{n+1} - 2x^n + 3x^{n-1} = x^{n-1}(x^2 - 2x + 3)$

3) $4m(a-1) - 3n(a-1) = (4m - 3n)(a-1)$.

II. Если данный трехчленъ есть сумма квадратовъ двухъ чиселъ, увеличенная или уменьшенная удвоеннымъ произведеніемъ этихъ чиселъ, то его можно замѣнить квадратомъ суммы или разности этихъ чиселъ, такъ какъ:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \text{ и } a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2.$$

Примѣры. 1) $a^2 + 2a + 1 = a^2 + 2a \cdot 1 + 1^2 = (a + 1)^2$

2) $x^4 + 4 - 4x^2 = (x^2)^2 + 2^2 - 2(2x^2) = (x^2 - 2)^2$

3) $-x + 25x^2 + 0,01 = (5x)^2 + (0,1)^2 - 2(5x \cdot 0,1) = (5x - 0,1)^2$

4) $(a+x)^2 + 2(a+x) + 1 = [(a+x) + 1]^2 = (a+x+1)^2$

5) $4x^n - x^{2n} - 4 = -(x^{2n} + 4 - 4x^n) = -(x^n - 2)^2$

III. Если данный двучленъ есть квадратъ одного числа безъ квадрата другого числа, то его можно замѣнить произведеніемъ суммы этихъ чиселъ на ихъ разность, такъ какъ:

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b).$$

Примѣры. 1) $m^4 - n^4 = (m^2)^2 - (n^2)^2 = (m^2 + n^2)(m^2 - n^2) = (m^2 + n^2)(m + n)(m - n)$

2) $25x^2 - 4 = (5x)^2 - 2^2 = (5x + 2)(5x - 2)$

3) $y^2 - 1 = y^2 - 1^2 = (y + 1)(y - 1)$

4) $x^2 - (x-1)^2 = [x + (x-1)][x - (x-1)] = (x+x-1)(x-x+1) = 2x-1$

IV. Иногда можно замѣтить, что данный четырехчленъ представляетъ собою кубъ суммы или разности двухъ чиселъ.

Примѣры. 1) $a^3 + 3a^2 + 3a + 1 = a^3 + 3a^2 \cdot 1 + 3a \cdot 1^2 + 1^3 = (a + 1)^3$

2) $8x^3 - 36x^2 + 54x - 27 = (2x)^3 - 3(2x)^2 \cdot 3 + 3(2x) \cdot 3^2 - 3^3 = (2x - 3)^3$.

V. Иногда многочленъ, состоящій изъ 4-хъ или болѣе членовъ, можно привести къ виду $a^2 - b^2$ или $a^2 \pm 2ab + b^2$, разбивъ его предварительно на части.

Примѣры. 1) $m^2 + n^2 - 2mn - p^2 = (m^2 + n^2 - 2mn) - p^2 = (m - n)^2 - p^2 = (m - n + p)(m - n - p)$

2) $x^2 - y^2 + 6y - 9 = x^2 - (y^2 - 6y + 9) = x^2 - (y - 3)^2 = [x + (y - 3)][x - (y - 3)] = (x + y - 3)(x - y + 3)$;

3) $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc = (a^2 + b^2 + 2ab) + c^2 + (2ac + 2bc) = (a + b)^2 + c^2 + 2(a + b)c = (a + b + c)^2$.

VI. Иногда члены многочлена можно соединить въ нѣсколько группъ, изъ которыхъ каждая разлагается на множителей; если въ числѣ этихъ множителей окажутся общіе, то ихъ можно вынести за скобки.

Примѣры. 1) $ac + ad + bc + bd = (ac + ab) + (bc + bd) = a(c + d) + b(c + d) = (c + d)(a + b)$

2) $12 - 4x - 3x^2 + x^3 = (12 - 4x) - (3x^2 - x^3) = 4(3 - x) - x^2(3 - x) = (3 - x)(4 - x^2) = (3 - x)(2 + x)(2 - x)$.

VII. Иногда бываетъ полезно ввести вспомогательные члены, или какой-нибудь членъ разложить на два члена.

Примѣры.

- 1) $a^3 - b^3 = a^3 - a^2b + a^2b - b^3 = a^2(a-b) + b(a^2 - b^2) = a^2(a-b) + b(a+b)(a-b) = (a-b)[a^2 + b(a+b)] = (a-b)(a^2 + ab + b^2).$
- 2) $a^3 + b^3 = a^3 + a^2b - a^2b + b^3 = a^2(a+b) - b(a^2 - b^2) = a^2(a+b) - b(a+b)(a-b) = (a+b)[a^2 - b(a-b)] = (a+b)(a^2 - ab + b^2).$
- 3) $2x^2 + 3xy + y^2 = 2x^2 + 2xy + xy + y^2 = 2x(x+y) + y(x+y) = (x+y)(2x+y).$

Разложение разности и суммы двухъ кубовъ, указанныя въ примѣрахъ 1-мъ и 2-мъ, полезно запомнить:

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2),$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2).$$

Упражненія.

Разложить на множители слѣдующія выраженія:

- I. 208. $ab + ac$; 209. $3x + 3y - 3z$; 210. $5a^2 - 3a^3 + a$.
 211. $4ax - 2ay$; 212. $5a^2x - 10a^2x^3 + 40a^2x^2$.
 213. $8a^2b^2x - 4ab^2x^3 + 12ab^4$; 214. $xy^2 - 7xy + 4x^2y$.
 215. $x^m + 2x^{m+1} - 3x^{m+2}$. 216. $2x^{2m} - 6x^m + 4x^{3m}$.
 217. $4(a-b)^2x - 12(a-b)x$.
 II. 218. $x^2 - 2xy + y^2$; 219. $m^2 + n^2 + 2mn$; 220. $2ab + a^2 + b^2$.
 221. $a^2 - 4ab + 4b^2$; 222. $x^2 + 8x + 16$. 223. $x^2 + 1 + 2x$;
 224. $a^2 + 4 - 4a$; 225. $-a^2 - b^2 + 2ab$. 226. $a^2 + a + \frac{1}{4}$;
 227. $a^4 - 2a^2b + b^2$. 228. $25x^4 + 30x^2y + 9y^2$;
 229. $0,01a^2b^2 - 0,2ab + 1$. 230. $5a^3 - 20a^2b + 20ab^2$.
 231. $(x+1)^2 + 2(x+1) + 1$; 232. $(a+b)^2 + 4 + 4(a+b)$.
 III. 233. $m^2 - n^2$; 234. $a^2 - 1$; 235. $1 - a^2$; 236. $x^2 - 4$.
 237. $x^4 - 1$ (на три множителя); 238. $-9a^2 + 25b^2$.
 239. $\frac{1}{x^4} - \frac{1}{y^6}$; 240. $81x^4 - 25$; 241. $0,01a^6 - 9$.
 242. $16a^2b^4c^6 - 9x^4y^2$; 243. $3a^5 - 48ab^3$. 244. $(a+b)^2 - c^2$;
 245. $a^2 - (b+c)^2$. 246. $a^2 - (b-c)^2$; 247. $(x+y)^2 - (x-y)^2$.
 248. $a^4 - x^4$ (на четыре множителя).
 IV. 249. $x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a^3$; 250. $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$.
 251. $a^3 - 6a^2 + 12a - 8$; 252. $\frac{1}{8}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x - 1$.
 253. $8 - 12a^2 + 6a^4 - a^6$.
 V. 254. $a^2 + 2ab + b^2 - c^2$; 255. $a^2 - b^2 + 2bc - c^2$.

256. $a^2 - b^2 + 2b - 1$; 257. $x^2 + 1 + 2x - y^2$. 258. $m^2 - n^2 - 2n - 1$;
 259. $-c^2 + 4a^2 - 4ab + b^2$. 260. $25x^4 - 10x^2y + y^2 - 9z^4$.

VI. 261. $ax + bx + ay + by$; 262. $ac - ad - bc + bd$.
 263. $ax + ay - bx - by$; 264. $3x - 3y + ax - ay$. 265. $a^2 + ab - a - b$;
 266. $xz - 3y - 3z + xy$. 267. $8a^3 - 12a^2 - 18a + 27$ (на три множителя).

VII. 267a. Разложить многочлены, заданные выше въ упражненіяхъ 249—253, посредствомъ группировки перваго члена съ послѣднимъ и третьяго члена съ четвертымъ и примѣняя затѣмъ разложение суммы и разности двухъ кубовъ.

Алгебраическія дроби.

74. Опредѣленіе. Алгебраическою дробью называется частное отъ дѣленія двухъ алгебраическихъ выраженій въ томъ случаѣ, когда дѣленіе только указано.

Такъ: $\frac{a}{b}$, $\frac{a+b}{c-d}$ и тому подобныя выраженія суть алгебраическія дроби. Въ такихъ выраженіяхъ дѣлимое наз. числителемъ, дѣлитель—знаменателемъ, а то и другое—членами дроби.

Алгебраическая дробь отличается отъ арифметической тѣмъ, что члены арифметической дроби всегда числа цѣлыя и положительныя, тогда какъ члены алгебраической дроби могутъ быть числами какими угодно. Напримѣръ, $\frac{3}{4}$ есть арифметическая дробь, а выраженіе $\frac{2/5}{-3}$ представляетъ собою частный случай алгебраической дроби. Покажемъ, что, несмотря на это различіе, съ дробями алгебраическими можно поступать по тѣмъ же правиламъ, какія указаны въ арифметикѣ для дробей арифметическихъ.

75. Основное свойство дроби. Величина дроби не измѣнится, если оба ея члена умножимъ или раздѣлимъ на одно и то же число, не равное нулю.

Пусть имѣемъ дробь $\frac{a}{b}$ и какое-нибудь положительное или отрицательное число m . Докажемъ, что $\frac{a}{b} = \frac{am}{bm}$.

Обозначимъ частное отъ дѣленія a на b черезъ q , а частное отъ дѣленія am на bm черезъ q' , т.-е. положимъ, что

$$\frac{a}{b} = q \quad [1] \qquad \frac{am}{bm} = q' \quad [2].$$

Изъ этихъ равенствъ, согласно опредѣленію дѣленія, выводимъ:

$$a = bq \quad [3], \quad am = bm q' \quad [4].$$

Умножимъ обѣ части равенства [3], на m :

$$am = bqm \quad [5].$$

Сравнивая равенства [5] и [4], находимъ:

$$bqm = bm q'.$$

Раздѣлимъ обѣ части этого равенства на bm (что возможно сдѣлать, такъ какъ числа b и m не нули):

$$\frac{bqm}{bm} = \frac{bm q'}{bm}, \text{ т.-е. } q = q' \text{ и, слѣд., } \frac{a}{b} = \frac{am}{bm}.$$

Переходя въ этомъ равенствѣ отъ правой части къ лѣвой, видимъ, что величина дроби не измѣняется отъ дѣленія ея членовъ на одно и то же число, не равное нулю.

Число m не должно равняться 0, такъ какъ отъ умноженія членовъ дроби $\frac{a}{b}$ на 0 мы получили бы частное $\frac{0}{0}$, которое равняется любому числу, а отъ дѣленія на 0 получили бы невозможное выраженіе $\frac{a : 0}{b : 0}$ (§ 37).

76. Приведеніе членовъ дроби къ цѣлому виду. Умножая оба члена дроби на выбранное надлежащимъ образомъ число или алгебраическое выраженіе, мы всегда можемъ преобразовать данную дробь такъ, что

числитель и знаменатель ея будутъ цѣлыми алгебраическими выраженіями.

Примѣры.

- 1) $\frac{\frac{3}{4}a}{b} = \frac{3a}{4b}$ (оба члена умножены на 4);
- 2) $\frac{7a}{2\frac{1}{2}b} = \frac{35a}{13b}$ (на 5);
- 3) $\frac{\frac{2}{3}a}{\frac{7}{8}b} = \frac{16a}{21b}$ (на 24);
- 4) $\frac{2a + \frac{5}{6}}{1-a} = \frac{12a + 5}{6-6a}$ (на 6);
- 5) $\frac{ax-1}{1-\frac{1}{x}} = \frac{ax^2-x}{x-1}$ (на x).

77. Перемена знаковъ у членовъ дроби.

1°. Переменить знакъ на противоположный и передъ числителемъ, и передъ знаменателемъ дроби—это все равно, что переменить знакъ у дѣлимаго и дѣлителя; отъ этого величина частного не измѣняется. Напримѣръ:

$$\frac{-8}{-4} = 2 \text{ и } \frac{8}{4} = 2; \quad \frac{-10}{+2} = -5 \text{ и } \frac{+10}{-2} = -5.$$

2°. Переменить знакъ на противоположный передъ какимъ-нибудь однимъ членомъ дроби—все равно, что переменить знакъ передъ самою дробью; напр.:

$$\frac{-a}{b} = -\frac{a}{b}, \quad \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b},$$

(при дѣленіи минусъ на плюсъ и плюсъ на минусъ даютъ минусъ).

Этими свойствами дроби иногда пользуются для преобразованія ея; напр.:

$$\frac{-3x}{a-b} = \frac{3x}{b-a}; \quad \frac{1-a}{2-b} = \frac{a-1}{b-2};$$

$$\frac{m^2-n^2}{n-m} = \frac{m^2-n^2}{-(m-n)} = -\frac{m^2-n^2}{m-n} = -(m+n).$$

78. Сокращеніе дроби. Если числитель и знаменатель имѣютъ общаго множителя, то на него можно сокра-

т и т ь дробь (потому что величина дроби не измѣнится отъ дѣленія обоихъ ея членовъ на одно и то же число).

Разсмотримъ отдѣльно слѣдующіе два случая сокращенія дробей.

I. Числитель и знаменатель одночлены.

Примѣры. 1) $\frac{12a^2x^3}{15ax^2y} = \frac{4ax}{5y}$ (сокращено на $3ax^2$).

2) $\frac{54a^nb^{n-3}}{72ab^{n-1}} = \frac{3a^{n-1}}{4b^2}$ (сокращено на $18ab^{n-3}$).

Правило. Чтобы сократить дробь, у которой числитель и знаменатель одночлены съ цѣлыми коэффициентами, предварительно находятъ общаго наибольшаго дѣлителя этихъ коэффициентовъ, приписываютъ къ нему множителями всѣ буквы, которыя входятъ одновременно въ числителя и знаменателя дроби, беря каждую изъ этихъ буквъ съ наименьшимъ показателемъ, съ какимъ она входитъ въ члены дроби; составивъ такое произведеніе, дѣлятъ на него оба члена дроби.

II. Числитель или знаменатель многочлены.

Примѣры:

$$1) \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^4 - 2x^2 + 1} = \frac{x^2(x-1) - (x-1)}{(x^2-1)^2} = \frac{(x-1)(x^2-1)}{(x^2-1)(x^2-1)} =$$

$$= \frac{x-1}{x^2-1} = \frac{x-1}{(x+1)(x-1)} = \frac{1}{x+1};$$

$$2) \frac{n-m}{m^2-n^2} = \frac{-(m-n)}{(m+n)(m-n)} = \frac{-1}{m+n} = -\frac{1}{m+n}.$$

Правило. Чтобы сократить дробь съ многочленнымъ числителемъ или знаменателемъ, предварительно разлагаютъ многочлены на множители и затѣмъ сокращаютъ на общихъ множителей, если такіе окажутся.

79. Приведеніе дробей къ общему знаменателю. Умножая оба члена каждой дроби на выбранное подлежащимъ образомъ число или алгебраическое выраженіе, мы можемъ сдѣлать знаменателей всѣхъ данныхъ дробей одинаковыми. При этомъ могутъ представиться тѣ же случаи, какъ и для дробей арифметическихъ, а именно:

1-й случай, когда знаменатели данныхъ дробей, попарно, не имѣютъ общихъ множителей.

Въ этомъ случаѣ оба члена каждой дроби надо умножить на произведеніе знаменателей всѣхъ остальныхъ дробей.

Примѣры: 1) $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f} \dots \frac{adf}{bdf}, \frac{cbf}{dbf}, \frac{ebd}{fdb},$

$$2) \frac{x}{m^2}, \frac{y}{n^2}, \frac{z}{pq} \dots \frac{xn^2pq}{m^2n^2pq}, \frac{ym^2pq}{m^2n^2pq}, \frac{zm^2n^2}{m^2n^2pq};$$

$$3) \frac{a}{a+b}, \frac{b}{a-b} \dots \frac{a(a-b)}{a^2-b^2}, \frac{b(a+b)}{a^2-b^2}.$$

2-й случай, когда одинъ изъ знаменателей дѣлится на всѣхъ остальныхъ.

Этотъ знаменатель и будетъ общимъ. Дробь, имѣющую этого знаменателя, оставляютъ безъ перемѣны, а члены каждой изъ остальныхъ дробей умножаютъ на соотвѣтствующаго дополнительнаго множителя, т.-е. на такое алгебраическое выраженіе, которое получится отъ дѣленія общаго знаменателя на знаменателя этой дроби.

Примѣръ: $\frac{x}{a-b}, \frac{y}{a+b}, \frac{z}{a^2-b^2}.$

Знаменатель a^2-b^2 дѣлится на $a-b$ и на $a+b$. Дополнительный множитель для первой дроби есть $a+b$, для второй $a-b$; послѣ приведенія къ общему знаменателю дроби окажутся:

$$\frac{x(a+b)}{a^2-b^2}, \frac{y(a-b)}{a^2-b^2}, \frac{z}{a^2-b^2}.$$

3-й случай, когда знаменатели, всё или нѣкоторые, имѣютъ общихъ множителей.

Въ этомъ случаѣ составляютъ произведе-
ніе изъ всѣхъ различныхъ множителей,
на которые разлагаются знаменатели,
при чемъ cadaго множителя берутъ
съ наибольшимъ показателемъ, съ ка-
кимъ онъ входитъ въ составъ знамена-
телей. Найдя такое произведение слѣдуетъ затѣмъ вы-
писать для каждой дроби дополнительные множи-
тели (не достающихъ въ ея знаменателѣ для полученія
общаго знаменателя) и затѣмъ умножить оба члена каждой
дроби на соответствующихъ дополнительныхъ множителей.

Примѣръ 1-й. $\frac{ax}{15x^2y^3}, \frac{y^2}{12x^3z^2}, \frac{az}{18xy^2}$.

Общій знам. = $180x^3y^3z^2$. Дополнительные множители:
для 1-й: $12xz^2$, для 2-й: $15y^3$, для 3-й: $10x^2yz^2$.

Послѣ приведенія дроби будутъ слѣдующія:

$$\frac{12axz^3}{180x^3y^3z^2}, \frac{15y^5}{180x^3y^3z^2}, \frac{10ax^2yz^3}{180x^3y^3z^2}$$

Примѣръ 2-й. $\frac{1}{x^2+2x+1}, \frac{4}{x+2x^2+x^3}, \frac{5}{2x+2x^2}$.

Разлагаемъ знаменателей на множителей:

$x^2+2x+1=(x+1)^2$	доп. мн. $2x$
$x+2x^2+x^3=x(x+1)^2$	« « 2
$2x+2x^2=2x(x+1)$	« « $x+1$.
Общ. знам. = $2x(x+1)^2$	

Послѣ приведенія дроби будутъ слѣдующія:

$$\frac{2x}{2x(x+1)^2}, \frac{8}{2x(x+1)^2}, \frac{5(x+1)}{2x(x+1)^2}$$

Примѣръ 3-й. $\frac{2}{x^2-a^2}, \frac{1}{a-x}, \frac{3}{x+a}$.

Перемѣнимъ знаки въ знаменателѣ 2-й дроби на противо-
положные, а чтобы не измѣнилась величина дроби, из-
мѣнимъ знакъ и у ея числителя:

$$\frac{2}{x^2-a^2}, \frac{-1}{x-a}, \frac{3}{x+a}$$

Общ. зн. = x^2-a^2 ; доп. мн.: для 2-й дроби: $x+a$, для
3-й: $x-a$.

Послѣ приведенія дроби будутъ:

$$\frac{2}{x^2-a^2}, \frac{-x-a}{x^2-a^2}, \frac{3(x-a)}{x^2-a^2}$$

80. Сложеніе и вычитаніе дробей. По пра-
вилу дѣленія многочлена на одночленъ (§ 68) мы можемъ
написать:

$$\frac{a+b+c}{m} = \frac{a}{m} + \frac{b}{m} + \frac{c}{m}, \quad \frac{a-b}{m} = \frac{a}{m} - \frac{b}{m}$$

Читая эти равенства справа налѣво, можемъ вывести
слѣдующія правила:

1) чтобы сложить дроби съ одинаковыми знаменателями,
складываютъ ихъ числителей и подъ суммою подписываютъ
того же знаменателя;

2) чтобы вычесть дроби съ одинаковыми знаменателями,
изъ числителя уменьшаемаго вычитаютъ числителя вычи-
таемаго и подъ разностью подписываютъ общаго знамена-
теля.

Если данныя для сложения или вычитанія дроби имѣютъ
разныхъ знаменателей, то предварительно ихъ слѣдуетъ
привести къ одному знаменателю.

Примѣры.

(Надъ дробями надписаны дополнительные множители).

$$1) \frac{\overbrace{df}}{a} + \frac{\overbrace{bf}}{d} + \frac{\overbrace{bd}}{f} = \frac{adf+cbf+ebd}{bdf}, \quad 2) \frac{\overbrace{2b}}{3m^2} - \frac{\overbrace{5ae}}{4ab^2} = \frac{6bm^2-25acn^2}{20a^2b^2c}$$

$$3) \frac{x+1}{2x-2} + \frac{2x-3}{x+1} - \frac{x^2+3}{2x^2-2}$$

$2x-2=2(x-1)$	доп. мн. = $x+1$
$x+1 = x+1$	« « = $2(x-1)$
$2x^2-2=2(x+1)(x-1)$	« « = 1 .
Общ. знам. = $2(x-1)(x+1)$	

$$\begin{aligned} \text{Сумма} &= \frac{(x+1)(x+1) + (2x-3)2(x-1) - (x^2+3)}{2(x^2-1)} = \\ &= \frac{x^2+2x+1 + (4x^2-6x-4x+6) - x^2-3}{2(x^2-1)} = \\ &= \frac{4x^2-8x+4}{2(x^2-1)} = \frac{4(x-1)(x-1)}{2(x+1)(x-1)} = \frac{2(x-1)}{x+1} \end{aligned}$$

Замѣчаніе. Такъ какъ всякое цѣлое алгебраическое выраженіе можно представить въ видѣ дроби, у которой числителемъ служить это выраженіе, а знаменатель есть 1, то правила сложенія и вычитанія дробей примѣнимы и къ случаямъ, когда какое-либо данное выраженіе есть цѣлое. Напр.:

$$3a^2 - \frac{2x}{ab} = \frac{3a^2}{1} - \frac{2x}{ab} = \frac{3a^2 \cdot ab}{ab} - \frac{2x}{ab} = \frac{3a^3b - 2x}{ab}$$

§1. Умноженіе дробей. Чтобы умножить дробь на дробь, умножаютъ числителя на числителя и знаменателя на знаменателя и первое произведеніе дѣлятъ на второе.

Требуется доказать, что $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$.

Для доказательства положимъ, что

$$\frac{a}{b} = q \text{ и } \frac{c}{d} = q'$$

Откуда: $a = bq$ и $c = dq'$.

Перемножимъ лѣвыя части этихъ двухъ равенствъ между собою и правыя части между собою; такъ какъ при этомъ

равныя числа мы умножаемъ на равныя, то и результаты должны быть равны; слѣд.,

$$ac = bqdq'$$

Въ правой части этого равенства, пользуясь сочетательнымъ свойствомъ произведенія (§ 35, 2°), соединимъ множителей въ такія группы:

$$ac = (bd)(qq')$$

Раздѣливъ обѣ части этого равенства на bd , найдемъ:

$$\frac{ac}{bd} = qq', \text{ т.-е. } \frac{ac}{bd} = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}$$

Замѣчаніе. Правило умноженія дробей распространяется и на цѣлыя выраженія; напр.:

$$\frac{a}{b} \cdot c = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{1} = \frac{ac}{b}; \quad a \cdot \frac{b}{c} = \frac{a}{1} \cdot \frac{b}{c} = \frac{ab}{c}$$

§2. Дѣленіе дробей. Чтобы раздѣлить дробь на дробь, умножаютъ числителя первой дроби на знаменателя второй, а знаменателя первой дроби на числителя второй и первое произведеніе дѣлятъ на второе, т.-е.

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$$

Въ этомъ можно убѣдиться повѣркою: умноживъ предполагаемое частное на дѣлителя по правилу умноженія дробей, получимъ дѣлимое:

$$\frac{ad}{bc} \cdot \frac{c}{d} = \frac{adc}{bcd} = \frac{a}{b}$$

Такъ какъ $\frac{ad}{bc} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$, то можно высказать другое правило: чтобы раздѣлить дробь на дробь, достаточно первую дробь умножить на обратную второй.

Замѣчаніе. Правило дѣленія дроби на дробь заключается въ себѣ также и правило дѣленія дроби на цѣлое и цѣлаго на дробь:

$$\frac{a}{b} : c = \frac{a}{b} : \frac{c}{1} = \frac{a}{bc}; \quad a : \frac{b}{c} = \frac{a}{1} : \frac{b}{c} = \frac{ac}{b}.$$

Упражненія.

Къ § 76.

Привести члены слѣдующихъ дробей къ цѣлому виду:

268. $\frac{5/7x}{y}$; $\frac{0,3ab}{m}$; 269. $\frac{a^2}{1^3/b}$; $\frac{m}{2,36n}$; 270. $\frac{3/4ab}{5/6x^2}$; 271. $\frac{3^{1/2}a^3}{2^3/b}$;

272. $\frac{3x-1/4}{a-b}$; 273. $\frac{5a^2+1/2a-1/4}{a-1}$; 274. $\frac{3a-7/3}{1-\frac{a}{6}}$;

275. $\frac{ax+b+\frac{c}{x}}{ax+1}$; 276. $\frac{1+\frac{a}{x}-\frac{b}{x^2}}{1-\frac{1}{x}}$.

Къ § 77.

Перемѣнить знаки у числителя и знаменателя дробей:

277. $\frac{1-x}{-x}$; 278. $\frac{-3a^2}{a-b}$; 279. $\frac{1-a}{2-b}$; 280. $\frac{-a^2-b^2+2ab}{b-a}$.

Не измѣняя величины дробей, поставитъ знакъ — передъ дробью:

281. $\frac{-3a}{6}$; $\frac{5x^2}{-3}$; 282. $\frac{1-a}{6}$; $\frac{a}{2-x}$; 283. $\frac{m^2-n^2}{n-m}$.

Къ § 78.

Сократить дроби:

284. $\frac{12ab}{8ax}$; 285. $\frac{3a^2bc}{12ab^2}$; 286. $\frac{48a^3x^2y^4}{45a^2x^2y}$; 287. $\frac{120a^4bx^3y^4z}{160a^4bxy^3}$;

288. $\frac{27a^m x^2 y}{36a^{m+2} x}$; 289. $\frac{15a^{m-1} b}{75a^m c}$; 290. $\frac{ax+x^2}{3bx-cx^2}$; 291. $\frac{14x^2-7ax}{10bx-5ab}$;

292. $\frac{5a^2+5ax}{a^2-x^2}$; 293. $\frac{n^3-2n^2}{n^2-4n+4}$; 294. $\frac{3x^4y^3+9a^2x^2y^3}{4x^5y^2+12a^2x^3y^2}$;

295. $\frac{x^5-ax^4-a^4x+a^5}{x^4-ax^3-a^2x^2+a^3x}$.

Къ § 79.

Привести къ общему знаменателю слѣдующія дроби:

I. 296. $\frac{2}{a}, \frac{3}{b}, \frac{1}{2c}$; 297. $\frac{7x}{4a^2}, \frac{2a}{3b^2}, \frac{4b^2}{5x}$; 298. $\frac{5xy}{3a^2bc}, \frac{3ab^2}{4mx^2y}$;

299. $2a, \frac{a^2}{x}$ (указаніе: представить $2a$ дробью $\frac{2a}{1}$);

300. $\frac{3}{8ab}, 3x, \frac{a}{5x^3}$ (указаніе: представить $3x$ дробью $\frac{3x}{1}$);

301. $\frac{1}{a+b}, \frac{1}{a-b}$; 302. $\frac{a}{1-x}, \frac{b}{1+x}, \frac{c}{1+2x}$.

II. 303. $\frac{x}{4ab}, \frac{y}{8a^3b^2}$; 304. $\frac{a}{16mx^3y^2}, \frac{a+b}{2xy}, \frac{a-b}{4my^2}$;

305. $\frac{1}{m+1}, \frac{2}{m^2-1}, \frac{3}{m-1}$; 306. $\frac{3a}{x-1}, \frac{2a}{x^2-2x+1}$;

307. $\frac{1}{a^2+4a+4}, \frac{a-2}{a+2}$; 308. $\frac{1}{x-1}, \frac{2}{2x-1}, \frac{1}{(x-1)(2x-1)}$;

309. $\frac{1}{b}, \frac{a}{a-b}, \frac{2a}{a^2b-b^3}$; 310. $\frac{a^3}{(a+b)^3}, \frac{ab}{(a+b)^2}, \frac{b}{a+b}$;

III. 311. $\frac{x}{28a^3b^2}, \frac{y}{21a^2b}$; 312. $\frac{m}{25a^3x^2y}, \frac{n}{15axy^2}, \frac{p}{60x^3y}$;

313. $\frac{1}{50ax^3}, \frac{2}{15ax^2y}, \frac{y}{75a^2x}, \frac{3x}{10ay}$; 314. $\frac{a-b}{a^2}, \frac{2a}{a-b}, \frac{1}{a^2-b^2}$;

315. $\frac{1}{6(a+b)^2}, \frac{2}{8(a-b)}, \frac{y}{12(a^2-b^2)}, \frac{3x}{3(ac-bc)}$.

Къ § 80.

316. $\frac{1}{a} + \frac{1}{2b} + \frac{1}{3c}$; 317. $\frac{2}{x^2} + \frac{5}{3x}$; 318. $\frac{a}{xy} + \frac{b}{xz} - \frac{c}{yz}$; 319. $x + \frac{a}{b}$;

320. $\frac{13x-5a}{4} + \frac{7x-2a}{6} - \frac{x}{17}$; 321. $\frac{1}{x+y} + \frac{2y}{x^2-y^2}$;

322. $\frac{a}{a+z} + \frac{z}{a-z}$; 323. $\frac{1+3x}{1-3x} - \frac{1-3x}{1+3x}$; 324. $\frac{8-x}{6} + x + \frac{5}{3} - \frac{x+6}{2} + \frac{x}{3}$;

325. $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1-a} + \frac{2}{1+a^2}$; 326. $\frac{1}{x(x+1)} + \frac{2}{x(x+1)(x+2)} + \frac{1}{x(x+2)}$;

327. $\frac{3x^2-x+12}{x^2-9} - \frac{x+2}{x+3} + \frac{x+3}{x-3}$; 327a. $\frac{8}{a-2b} + \frac{5}{a^2-4b^2} + \frac{x+6}{2b+a}$;

327b. $\frac{1}{x-1} + \frac{2x+5}{x^2-2x+1} + \frac{2+3x-5x^2}{x^3-3x^2+3x-1}$;

$$327c. \frac{2a}{(a^2+1)^2-a^2} + \frac{1}{a^2-a+1} - \frac{1}{a^2+a+1}.$$

Къ §§ 81 и 82.

$$328. \frac{4x^2y^2}{15p^4q^9} \cdot 45p^2q^2. \quad 329. \left(-\frac{3x}{5a}\right) \cdot \frac{10ab}{7x^3}. \quad 330. \frac{1-a}{5x^3} \cdot \frac{x^2}{1-a^2}.$$

$$331. (x+y)\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right). \quad 332. \frac{x+1}{x-1} \cdot \frac{x+2}{x^2-1} \cdot \frac{x-1}{(x+2)^2}. \quad 333. \frac{2a}{2b-c} \cdot \left(\frac{b+c}{4} - \frac{c}{2}\right)$$

$$334. \left(a + \frac{ab}{a+b}\right) \left(b - \frac{ab}{a+b}\right). \quad 335. \frac{3a^2b^5c^4 \cdot 4a^4b^3c^2}{4x^2y^2z^4 \cdot 3x^4y^3z^2}. \quad 336. \frac{12a^3b^2}{5mp} : 4ab^2.$$

$$337. 81a^3b^2 : \frac{27ab^2}{5x^2y}. \quad 338. \frac{a^2+b^2}{a^2-b^2} \cdot \frac{5a^2+5b^2}{a+b}. \quad 339. \left(x + \frac{xy}{x-y}\right) \left(x - \frac{xy}{x+y}\right).$$

Упростить слѣдующія выраженія:

$$340. \frac{1 - \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}}{1 + \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}}. \quad 341. \frac{\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b+c} : \frac{1}{b} \cdot \frac{1}{a+c}}{\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b+c} : \frac{1}{b} + \frac{1}{a+c}}. \quad 342. \frac{a - \frac{a-b}{1+ab}}{1 + \frac{a(a-b)}{1+ab}}$$

$$343. \left(\frac{a-b}{a+b} + \frac{a+b}{a-b}\right) : \left(\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2} + \frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}\right).$$

Уравненія первой степени.

Общія начала рѣшенія уравненій.

83. Равенство, тождество, уравненіе. Два алгебраическія выраженія, соединенныя между собою знаком $=$, составляютъ равенство. Выраженія эти называются частями равенства: то, что стоитъ лѣво отъ знака $=$, составляетъ лѣвую часть, а то, что стоитъ направо отъ этого знака, составляетъ правую часть равенства. Напр., въ равенствѣ: $a + 2a = 3a$ выраженіе $a + 2a$ есть лѣвая часть, а $3a$ —правая часть.

Равенства раздѣляются на тождества и уравненія. Тождества подраздѣляются на числовыя и буквенныя.

Числовое тождество есть равенство, въ которое входятъ только числа, выраженные цифрами; таковы, напр., равенства: $(2+1)^2 = (5-2)^2$; $3=3$.

Буквенное тождество есть равенство, у котораго обѣ части суть тождественныя алгебраическія выраженія (§ 3), т.-е. такія выраженія, которыя при всевозможныхъ значеніяхъ буквъ, входящихъ въ нихъ, имѣютъ одинаковыя численные величины; таковы, напр., равенства:

$$(a+b)m = am + bm; (a+1)^2 = a^2 + 2a + 1, a = a.$$

Всякое буквенное тождество, послѣ подстановки на мѣсто буквъ какихъ-нибудь чиселъ, обращается въ числовое тождество.

Уравненіемъ называется равенство, у котораго части имѣютъ одинаковую численную величину не при всякихъ значеніяхъ буквъ, входящихъ въ нихъ, а только при нѣкоторыхъ. Напр., равенство:

$$3x+5=2x+7$$

есть уравненіе, потому что части его $3x+5$ и $2x+7$ равны не при всякомъ значеніи буквы x , а только при $x=2$; точно такъ же равенство:

$$2x+y=10x-y$$

есть уравненіе, потому что части его имѣютъ одинаковую численную величину не при всякихъ значеніяхъ буквъ x и y (напр., при $x=2, y=3$ оно невозможно, тогда какъ при $x=2, y=8$ оно вѣрно).

Такія буквы въ уравненіи, которымъ нельзя приписывать всевозможныхъ численныхъ значеній, называются неизвѣстными уравненія; онѣ берутся обыкновенно изъ послѣднихъ буквъ алфавита: $x, y, z...$

Уравненія могутъ быть съ однимъ неизвѣстнымъ, съ двумя, тремя и болѣе неизвѣстными. Такъ, $3x+5=2x+7$ есть уравненіе съ 1 неизвѣстнымъ, а $2x+y=10x-y$ есть уравненіе съ 2 неизвѣстными.

Числа, которыя, подставленныя въ уравненіе вмѣсто его неизвѣстныхъ, обращаютъ это уравненіе въ тождество, называются корнями уравненія или его рѣшеніями; о такихъ числахъ принято говорить, что они удовлетворяютъ уравненію. Напр., 2 есть корень уравненія $3x+5=2x+7$, потому что при $x=2$ это уравненіе обращается въ тождество $3 \cdot 2+5=2 \cdot 2+7$. Уравненіе $2x+y=10x-y$ имѣетъ корни $x=2$, $y=8$ и многіе другіе. Иногда уравненіе съ однимъ неизвѣстнымъ имѣетъ два корня и болѣе; напр., уравненіе $x^2+2=3x$ удовлетворяется при $x=2$ и $x=1$.

Рѣшить уравненіе значитъ найти всѣ его корни.

84. Многія задачи можно рѣшать помощью уравненій. Возьмемъ для примѣра такую задачу:

Старшему брату 15 лѣтъ, а младшему 9. Сколько лѣтъ тому назадъ первый былъ втрое старше второго?

Назовемъ неизвѣстное число лѣтъ буквою x . Предположимъ, что x найдено, и мы желаемъ повѣрить, удовлетворяетъ ли найденное число требованіямъ задачи. Тогда рассуждаемъ такъ: x лѣтъ тому назадъ старшему брату было не 15 лѣтъ, какъ теперь, а $15-x$; младшему брату тогда было не 9 лѣтъ, какъ теперь, а $9-x$. Условіе задачи требуетъ, чтобы $15-x$ было втрое болѣе $9-x$; значитъ, если $9-x$ умножимъ на 3, то мы должны получить число, равное $15-x$; поэтому для x можно взять только такое число, которое удовлетворяетъ уравненію:

$$(9-x)3=15-x.$$

Если сумѣемъ рѣшить это уравненіе, то задача будетъ рѣшена. Мы скорѣе укажемъ общій способъ рѣшенія подобныхъ уравненій. Теперь же замѣтимъ, что полученное нами уравненіе можно рѣшить такими простыми соображеніями. Такъ какъ произведеніе $(9-x)3$ при всякомъ значеніи x равно разности $27-3x$, то это уравненіе можно написать такъ:

$$27-3x=15-x.$$

Въ этомъ видѣ лѣвая и правая части уравненія представляютъ собою разности. Сравнивая ихъ между собою, замѣчаемъ, что уменьшаемое въ лѣвой части (т.-е. 27) болѣе уменьшаемаго въ правой части (т.-е. 15) на 12; тогда, чтобы разности были равны, необходимо и достаточно, чтобы и вычитаемое въ лѣвой части (т.-е. $3x$) было болѣе вычитаемого въ правой части (т.-е. x) тоже на 12; но $3x$ болѣе x на $2x$; слѣд., $2x=12$, откуда $x=6$.

Значитъ, 6 лѣтъ тому назадъ старшій братъ былъ втрое старше младшаго.

Только практика научаетъ, какъ, исходя изъ вопроса и условій задачи, составить одно или нѣсколько уравненій; алгебра имѣетъ цѣлью указать способы рѣшенія уже составленныхъ уравненій. Въ этомъ состоитъ другое назначеніе этой науки, еще болѣе важное, чѣмъ преобразованіе алгебраическихъ выраженій (см. § 4).

Рѣшеніе уравненій основано на нѣкоторыхъ свойствахъ равенствъ вообще и уравненій въ частности; эти свойства мы теперь и рассмотримъ.

85. Нѣкоторыя свойства равенствъ. Всякое равенство, рассматриваемое въ алгебрѣ, мы можемъ сокращенно выразить такъ: $a=b$, если буквою a обозначимъ численную величину лѣвой части равенства и буквою b численную величину правой его части. Замѣтивъ это, мы

можемъ главнѣйшія свойства равенствъ выразить слѣдующими очевидными истинами (нѣкоторыми изъ нихъ мы уже пользовались раньше):

1°. Если $a=b$, то и $b=a$; т.-е. части равенства можно переставлять.

2°. Если $a=b$ и $c=b$, то $a=c$; т.-е. если два числа равны порознь одному и тому же третьему числу, то они равны и между собою.

3°. Если $a=b$ и $m=n$, то

$$a+m=b+n, a-m=b-n, am=bn;$$

т.-е. если къ равнымъ числамъ придадимъ равныя числа, то и получимъ равныя числа; если отъ равныхъ (чиселъ) отнимемъ равныя (числа), то и получимъ равныя (числа); если равныя умножимъ на равныя, то и получимъ равныя.

4°. Если $a=b$ и $m=n$, то $\frac{a}{m} = \frac{b}{n}$, если только числа m и n не нули (дѣленіе на нуль невозможно, § 37); т.-е. если равныя числа раздѣлимъ на равныя числа, отличныя отъ нуля, то и получимъ равныя числа.

86. Равносильныя уравненія. Уравненія называются равносильными, если они имѣютъ одни и тѣ же корни. Напр., уравненія:

$$x^2+2=3x \text{ и } x^2-3x+2=0$$

равносильны, потому что у нихъ одни и тѣ же корни (именно $x=2$ и $x=1$).

Относительно равносильности уравненій мы докажемъ 2 теоремы, которыя можно назвать основными для рѣшенія уравненій; при этомъ для простоты мы будемъ предполагать, что рѣчь идетъ объ уравненіи съ однимъ неизвѣстнымъ.

87. Теорема 1. Если къ обѣимъ частямъ уравненія прибавимъ, или отъ нихъ отнимемъ, одно и то же число, то получимъ новое уравненіе, равносильное первому.

Возьмемъ, напр., уравненіе: $2x+5=3x$ и приложимъ къ обѣимъ его частямъ какое-нибудь одно и то же число, напр., 10; тогда получимъ новое уравненіе: $2x+5+10=3x+10$. Требуется доказать, что два уравненія:

$$2x+5=3x \text{ и } 2x+5+10=3x+10$$

имѣютъ одни и тѣ же корни. И дѣйствительно, при всѣхъ тѣхъ значеніяхъ x , при которыхъ выраженіе $2x+5$ дѣлается равнымъ $3x$, будутъ также равны и суммы $2x+5+10$ и $3x+10$, (если къ равнымъ придадимъ равныя, то и получимъ равныя). Обратное, при всѣхъ тѣхъ значеніяхъ x , при которыхъ суммы $2x+5+10$ и $3x+10$ дѣлаются равными, будутъ также равны и выраженія $2x+5$ и $3x$ (если отъ равныхъ отнимемъ равныя, то и получимъ равныя). Отсюда слѣдуетъ, что оба уравненія имѣютъ одни и тѣ же корни, т.-е. они равносильны.

Замѣчаніе. Прибавляемое или отнимаемое число можетъ быть дано въ видѣ какого-нибудь буквеннаго выраженія, при чемъ это выраженіе можетъ содержать въ себѣ и неизвѣстныя уравненія. Напр., къ обѣимъ частямъ уравн. $x^2+1=3x-1$ можно прибавить выраженіе $1-3x$, такъ какъ при всякомъ численномъ значеніи x это выраженіе представляетъ собою нѣкоторое опредѣленное число, а отъ прибавленія къ обѣимъ частямъ уравненія одного и того же числа, какъ мы видѣли, получается уравненіе равносильное съ даннымъ.

88. Слѣдствія. I. Любой членъ уравненія можно перенести изъ одной его части въ другую, перемѣнивъ передъ такимъ членомъ знакъ на противоположный.

Напримѣръ, если къ обѣимъ частямъ уравненія $8+x^2=7x-2$ прибавимъ по 2, то получимъ:

$$\begin{array}{r} 8+x^2=7x-2 \\ +2 \quad +2 \\ \hline 8+x^2+2=7x \end{array}$$

Оказывается, что членъ -2 изъ правой части перешелъ въ лѣвую съ противоположнымъ знакомъ $+$.

Если вычтемъ изъ обѣихъ частей послѣдняго уравненія по x^2 , то получимъ:

$$\begin{array}{r} 8+x^2+2=7x \\ -x^2 \quad -x^2 \\ \hline 8+2=7x-x^2 \end{array}$$

Оказывается, что членъ $+x^2$ перешелъ изъ лѣвой части въ правую съ противоположнымъ знакомъ.

Можно всѣ члены уравненія перенести въ одну его часть, напр., въ лѣвую; въ такомъ случаѣ въ другой части останется 0. Такъ, перенеся въ ур. $2x^2=6+4x$ всѣ члены въ лѣвую часть, получимъ: $2x^2-4x-6=0$.

II. Если два одинаковые члена съ одинаковыми знаками стоятъ въ разныхъ частяхъ уравненія, то такіе члены можно отбросить. Напр:

$$6x+3=x^2+3, \quad 7x^2-x=7-x.$$

Отнявъ отъ обѣихъ частей перваго уравненія по 3 и приложивъ къ обѣимъ частямъ втораго уравн. по x , получимъ.

$$6x=x^2, \quad 7x^2=7.$$

89. Теорема 2. Если обѣ части уравненія умножимъ или раздѣлимъ на одно и то же число, не равное нулю, то получимъ новое уравненіе, равносильное первому.

Возьмемъ, напр., уравненіе: $2x+5=3x$ и умножимъ обѣ его части на какое-нибудь число, не равное 0, напр., на 10; требуется доказать, что уравненія:

$$2x+5=3x \quad \text{и} \quad (2x+5)10=3x \cdot 10$$

имѣютъ одни и тѣ же корни.

Дѣйствительно, при всѣхъ тѣхъ численныхъ значеніяхъ неизвѣстнаго, при которыхъ выраженіе $2x+5$ дѣлается равнымъ $3x$, также равны произведенія $(2x+5) \cdot 10$ и $3x \cdot 10$ (если равныя умножимъ на равныя, то и получимъ равныя).

Обратно, при всѣхъ тѣхъ значеніяхъ x , при которыхъ произведеніе $(2x+5) \cdot 10$ дѣлается равнымъ произведенію $3x \cdot 10$, также равны и выраженія $2x+5$ и $3x$ (если равныя числа раздѣлимъ на равныя числа, отличныя отъ нуля, то и получимъ равныя числа). Значитъ, оба уравненія имѣютъ одни и тѣ же корни, т.е. они равносильны.

Замѣчаніе. Почему число, на которое умножаемъ, не должно быть 0. Если обѣ части уравненія $2x+5=3x$ умножимъ на 0, то получимъ $(2x+5) \cdot 0=3x \cdot 0$. Это равенство есть тождество, потому что, какія бы числа мы ни подставляли на мѣсто x , всегда получимъ $0=0$; данное же уравненіе обращается въ тождество только при $x=5$; значитъ, отъ умноженія на 0 не получается равносильнаго уравненія.

90. Слѣдствія. I. Если всѣ члены уравненія имѣютъ общаго множителя, не равнаго нулю, то уравненіе можно на него сократить. Напр.:

$$60x-160=340-40x.$$

Раздѣливъ всѣ члены на 20, получимъ уравненіе болѣе простое:

$$3x-8=17-2x.$$

II. Передъ всѣми членами уравненія можно перемѣнить знаки на противоположныя, такъ какъ это равносильно умноженію обѣихъ частей уравненія на -1 . Напр., умноживъ обѣ части уравненія:

$$-7x+2=-8-x^2$$

на -1 , мы получимъ равносильное уравненіе:

$$7x-2=8+x^2$$

съ противоположными знаками.

Замѣтимъ, что того же самаго мы можемъ достигнуть, если перенесемъ всѣ члены уравненія изъ лѣвой части въ правую, а изъ правой въ лѣвую (§ 88,1), и затѣмъ помѣняемъ мѣстами

эти части. Такъ, сдѣлавъ такое перенесеніе въ уравненіи:
 $-7x+2=-8-x^2$, получимъ: $8+x^2=7x-2$ и затѣмъ:

$$7x-2=8+x^2.$$

III. Уравненіе можно освободить отъ знаменателей.
 Напр.:

$$\frac{7x-3}{6} - \frac{x-5}{4} = 7,1666\dots$$

Обративъ число 7,166... въ обыкновенную дробь, получимъ $\frac{43}{6}$; теперь приведемъ всѣ члены къ общему знаменателю:

$$\frac{14x-6}{12} - \frac{3x-15}{12} = \frac{86}{12} \text{ или } \frac{14x-6-(3x-15)}{12} = \frac{86}{12}.$$

Отбросивъ общаго знаменателя, мы тѣмъ самымъ умножимъ обѣ части уравненія на одно и то же, не равное нулю, число 12; отъ этого получимъ уравненіе, равносильное данному и не содержащее дробныхъ членовъ:

$$14x-6-(3x-15)=86 \text{ или } 14x-6-3x+15=86.$$

91. Можно ли обѣ части уравненія умножить или раздѣлить на алгебраическое выраженіе, содержащее неизвѣстное. Положимъ, что обѣ части уравненія: $2x=8$ мы умножили на выраженіе $x-3$, содержащее неизвѣстное x . Тогда будемъ имѣть 2 уравненія:

$$2x=8 \text{ (1) и } 2x(x-3)=8(x-3) \text{ (2)}$$

Посмотримъ, будутъ ли они равносильны. Уравненіе (1) имѣетъ только одинъ корень: $x=4$. Этотъ корень принадлежитъ и уравненію (2), такъ какъ онъ обращаетъ его въ тождество:

$$2 \cdot 4(4-3)=8(4-3), \text{ т.-е. } 8 \cdot 1=8 \cdot 1.$$

Но уравненіе (2) имѣетъ еще свой особый корень: $x=3$. Дѣйствительно, при этомъ значеніи x множитель $x-3$ обращается въ нуль, и уравненіе (2) даетъ:

$$6 \cdot 0=8 \cdot 0, \text{ т.-е. } 0=0.$$

Значитъ, уравненіе (1) имѣетъ одинъ корень ($x=4$), тогда какъ уравненіе (2) имѣетъ 2 корня ($x=4$ и $x=3$); изъ этихъ корней послѣдній есть посторонній для даннаго уравненія (1). Такимъ образомъ, уравненія (1) и (2) не равносильны.

Вообще, отъ умноженія или дѣленія обѣихъ частей даннаго уравненія на одно и то же алгебраическое выраженіе, содержащее неизвѣстныя, получается уравненіе, не равносильное данному, такъ какъ этимъ умноженіемъ или дѣленіемъ мы можемъ ввести новыя рѣшенія, или, наоборотъ, лишитъ уравненіе нѣкоторыхъ рѣшеній.

Замѣчаніе. Чтобы освободить уравненіе отъ знаменателей, нужно, какъ мы говорили (§ 90, III), привести всѣ члены уравненія къ общему знаменателю и затѣмъ его отбросить. Теперь мы должны добавить, что такое отбрасываніе общаго знаменателя (равносильное умноженію на него обѣихъ частей уравненія) возможно безъ всякихъ оговорокъ лишь въ томъ случаѣ, когда отбрасываемый знаменатель не содержитъ въ себѣ неизвѣстныхъ. Если же, какъ это часто бываетъ, неизвѣстныя входятъ и въ знаменатели дробныхъ членовъ уравненія, то, приведя всѣ члены къ общему знаменателю и отбросивъ его, мы должны еще изслѣдовать, не вводимъ ли мы тѣмъ самымъ постороннихъ рѣшеній. Ниже приведены примѣры (§ 93, примѣры 2-й и 3-й), на которыхъ уясняется, какъ слѣдуетъ поступать въ такихъ случаяхъ.

Уравнение первой степени съ однимъ неизвѣстнымъ.

92. Поздраздѣленіе уравненій. По числу неизвѣстныхъ уравненія раздѣляются на уравненія съ однимъ неизвѣстнымъ, съ двумя неизвѣстными, съ тремя и болѣе неизвѣстными. Кромѣ того, уравненія раздѣляются по степенямъ неизвѣстныхъ: уравненія первой степени, уравненія второй степени и т. д.

Чтобы судить о степени даннаго уравненія, въ немъ нужно предварительно сдѣлать слѣдующія преобразованія: раскрыть скобки, уничтожить знаменатели, перенести всѣ неизвѣстные члены въ одну часть уравненія и сдѣлать приведеніе подобныхъ членовъ. Когда всѣ эти преобразованія выполнены (на самомъ дѣлѣ или только въ умѣ), то:

степенью уравненія съ однимъ неизвѣстнымъ наз. наибольшій изъ показателей при неизвѣстномъ;

степенью уравненія съ нѣсколькими неизвѣстными наз. сумма показателей при неизвѣстныхъ въ томъ членѣ уравненія, въ которомъ эта сумма наибольшая.

Такимъ образомъ, уравн. $5x^2y - 3xy + 8y = 0$ есть уравненіе третьей степени съ 2 неизвѣстными, уравн. $3x - 5x^2 = 4$ есть уравненіе второй степени съ однимъ неизвѣстнымъ.

93. Рѣшеніе уравненія первой степени съ однимъ неизвѣстнымъ. Пусть требуется рѣшить уравненіе:

$$\frac{2(x-5)}{3} = \frac{3(2-x)}{2} - x.$$

Чтобы найти число x , выполняемъ слѣдующія преобразованія:

1) раскрываемъ скобки: $\frac{2x-10}{3} = \frac{6-3x}{2} - x;$

2) освобождаемъ уравн. отъ знам.: $4x-20=18-9x-6x;$

3) переносимъ неизвѣстные члены въ одну часть, а извѣстные въ другую: $4x+9x+6x=18+20;$

4) дѣлаемъ приведеніе подобныхъ членовъ: $19x=38;$

5) дѣлимъ обѣ части уравненія на коэффициентъ при неизвѣстномъ:

$$\frac{19x}{19} = \frac{38}{19} \text{ или } x=2.$$

Когда корень уравненія найденъ, полезно повѣрить правильность рѣшенія; для этого подставляютъ въ данное (не преобразованное) уравненіе вмѣсто x найденное число; если послѣ подстановки получится тождество, то уравненіе рѣшено правильно. Такъ, въ нашемъ примѣрѣ, подставивъ на мѣсто x найденное число 2, получимъ:

$$\frac{2(2-5)}{3} = \frac{3(2-2)}{2} - 2, \text{ т.-е. } -2 = -2.$$

Значитъ, уравненіе рѣшено правильно.

Для упражненія рѣшимъ еще нѣсколько примѣровъ, представляющихъ нѣкоторыя особенности.

Примѣръ 1. Знаменатели не содержатъ неизвѣстнаго.

$$\frac{8x-4}{3} - 4 = \frac{5x-3}{6} + x = \frac{7-x-3}{3} - \frac{8}{9}.$$

Для рѣшенія этого уравненія сначала приведемъ члены каждой дроби къ цѣлому виду (см. § 76):

$$\frac{8x-12}{27} - \frac{5x-3}{6} + x = \frac{14-x+3}{6} - \frac{8}{9}.$$

Найдя общаго знаменателя 54, надписываемъ надъ каждымъ членомъ уравненія дополнительнаго множителя:

$$\frac{2}{27} \frac{8x-12}{27} - \frac{9}{6} \frac{5x-3}{6} + x = \frac{54}{6} \frac{17-x}{6} - \frac{6}{9} \frac{8}{9}.$$

Затѣмъ приводимъ къ общему знаменателю всѣ члены уравненія, отбрасываемъ его и поступаемъ далѣе, какъ обыкновенно:

$$16x - 24 - 45x + 27 + 54x = 153 - 9x - 48$$

$$16x - 45x + 54x + 9x = 153 - 48 + 24 - 27; \quad 34x = 102; \quad x = 3.$$

Повѣрка: $\frac{8-4}{9} - 2 + 3 = \frac{7}{3} - \frac{8}{9}$, т.-е. $\frac{13}{9} = \frac{13}{9}$.

Примѣръ 2. Знаменатели содержатъ неизвѣстное, при чемъ отбрасываніе общаго знаменателя не вводитъ посторонняго корня.

$$\frac{2x+1}{2x-1} + \frac{8}{1-4x^2} = \frac{2x-1}{2x+1}$$

Чтобы удобнѣе привести всѣ члены этого уравненія къ общему знаменателю, перемѣнимъ въ знаменателѣ второй дроби знаки на обратные, а чтобы отъ этого не измѣнилась величина дроби, перемѣнимъ знакъ передъ дробью (§ 77):

$$\frac{2x+1}{2x-1} - \frac{8}{4x^2-1} = \frac{2x-1}{2x+1}$$

Такъ какъ $4x^2-1=(2x+1)(2x-1)$, то это и есть общій знаменатель; дополнительные множители будутъ: для первой дроби $2x+1$, для третьей $2x-1$;

$$(2x+1)^2 - 8 = (2x-1)^2; \quad 4x^2 + 4x + 1 - 8 = 4x^2 - 4x + 1; \\ 8x = 8; \quad x = 1.$$

Такъ какъ для освобожденія уравненія отъ знаменателей намъ пришлось откинуть общаго знаменателя $4x^2-1$, т.-е., другими словами, пришлось обѣ части уравненія умножить на выраженіе $4x^2-1$, содержащее неизвѣстное, то слѣдуетъ убѣдиться, не будетъ ли найденный корень постороннимъ, т.-е. не обращаетъ ли онъ въ 0 выраженіе $4x^2-1$, на которое намъ пришлось умножить обѣ части даннаго уравненія. Подставивъ 1 на мѣсто x въ выраженіе $4x^2-1$,

мы получаемъ 3, а не 0. Значитъ, найденный корень не есть посторонній. И дѣйствительно, данное уравненіе при $x=1$ обращается въ тождество:

$$\frac{3}{1} + \frac{8}{-3} = \frac{1}{3}; \quad 3 - 2^2/3 = \frac{1}{3}; \quad \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

Примѣръ 3. Знаменатели содержатъ неизвѣстное, при чемъ отбрасываніе общаго знаменателя вводитъ посторонній корень.

$$3 + \frac{1}{x-2} = \frac{4x-7}{x-2}$$

Освободивъ уравненіе отъ знаменателей, получимъ:

$$3x - 6 + 1 = 4x - 7; \quad 3x - 4x = -7 + 6 - 1; \quad -x = -2.$$

Умноживъ обѣ части уравненія на -1 , найдемъ: $x=2$.

Такъ какъ для освобожденія уравненія отъ знаменателей, намъ пришлось умножить обѣ части его на выраженіе $x-2$, содержащее неизвѣстное, то слѣдуетъ рѣшить, не будетъ ли найденный корень постороннимъ. Поставивъ 2 на мѣсто x въ выраженіе $x-2$, получимъ 0. Изъ этого заключаемъ, что корень $x=2$ можетъ быть постороннимъ. Чтобы рѣшить это окончательно, надо сдѣлать подстановку:

$$3 + \frac{1}{0} = \frac{1}{0}.$$

Въ такомъ видѣ равенство ничего не выражаетъ, такъ какъ дѣленіе на 0 невозможно. Значитъ, рѣшеніе $x=2$ является постороннимъ для даннаго уравненія, которое совсѣмъ не имѣетъ корней.

Примѣръ 4. Уравненіе, приводящееся къ тождеству.

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} - 25 = \frac{5}{6}(x-30).$$

По освобожденіи отъ знаменателей, получимъ:

$$3x + 2x - 150 = 5(x-30),$$

или $5x - 150 = 5x - 150,$

или $5x - 5x = 150 - 150, \text{ т.-е. } 0 = 0.$

Это равенство есть тождество, т.е. оно вѣрно при всякомъ значеніи x . Значитъ, уравненіе имѣетъ произвольные корни.

Примѣръ 5. Уравненіе, приводящееся къ невозможному равенству.

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5 \cdot \left(\frac{x}{4} - \frac{x}{12} \right) + 7.$$

По раскрытіи скобокъ и освобожденіи отъ знаменателей, находимъ:

$$6x + 4x = 15x - 5x + 84$$

или

$$10x = 10x + 84$$

или

$$10x - 10x = 84, \text{ т.е. } 0 = 84.$$

Такъ какъ это равенство невозможно, то уравненіе не имѣетъ ни одного корня.

Упражненія.

Рѣшить слѣдующія уравненія:

344. $8x - 5 = 13 - 7x$; 345. $29 + 2x = 3(x - 7)$;

346. $13\frac{3}{4} - x/2 = 2x - 8\frac{3}{4}$. 347. $3,25x - (5,007 + x) = 0,2 - 0,34x$;

348. $3(x+2) - 2(x-4) = 21$. 349. $\frac{2(x-1)}{3} + \frac{x}{2} - 1 = \frac{5(x-4)}{6} + 3$;

350. $\frac{7,53x}{18} - 100 = \frac{2x}{5} + 3,86 - \frac{x}{6}$. 351. $\frac{x-2}{3} - \frac{12-x}{2} = \frac{5x-36}{4} - 1$;

352. $5x - \{8x - 3[16 - 6x - (4 - 5x)]\} = 6$.

353. $\frac{x(3x+1)}{2} - \frac{x(2x+1)}{3} + \frac{x(x+1)}{12} = x^2 + \frac{2}{15} - \frac{x(x+5)}{12}$;

354. $ax + b = cx + d$. 355. $\frac{ab}{x} - \frac{1}{x} = bc + d$; 356. $\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} = \frac{12}{x^2-1}$.

357. $\frac{x-m}{m-n} - \frac{x-m}{m+n} = \frac{2mx}{m^2-n^2}$; 358. $\frac{x}{a} + \frac{a}{a+b} + \frac{2ab}{a^2-b^2} = \frac{x}{a-b} + 1$.

359. $\frac{3x}{4} - \frac{2(x-2)}{5} = \frac{7x+16}{20}$ (приводится къ тождеству $0=0$).

360. $\left. \begin{array}{l} 1^{\circ} \frac{x}{2} - 4 + \frac{x}{3} = 7 + \frac{5x}{6} \\ 2^{\circ} \frac{5x+1}{6} + \frac{x+3}{4} = x+1 + \frac{x-3}{12} \end{array} \right\} \text{ (приводятся къ невозможному равенству).}$

361. Определить, какія изъ нижеслѣдующихъ равенствъ суть тождества и какія уравненія; рѣшить уравненія:

1^o. $8x+3=(x+2)^2-x^2+4x-1$; 2^o. $\frac{3x-1}{8}=4$;

3^o. $(x+1)^2+(x-1)^2=2(x^2+1)$; 4^o. $(2x+1)^2+(x-1)^2=5(x^2+1)$;

362. Сумма двухъ чиселъ равна 2588, а разность ихъ 148; найти эти числа.

363. Раздѣлить 1800 на двѣ части такія, чтобы меньшая составляла $\frac{2}{7}$ большей.

364. Если къ числителю и знаменателю дроби прибавить по 8, то получится дробь, равная $\frac{3}{4}$. Какова эта дробь, если числитель меньше знаменателя на 5 единицъ?

365. Капиталь, отданный въ ростъ по $4\frac{1}{2}\%$, черезъ годъ обратился въ 13167 руб. Какъ великъ этотъ капиталъ?

366. Продавъ товаръ за 294 руб. 30 коп., купецъ получилъ 9% прибыли. Сколько ему самому стоитъ товаръ?

367. Если къ капиталу, приносящему 4%, присоединить весь доходъ, который съ него получается за 5 лѣтъ, то составитъ сумма 8208 руб. Какъ великъ этотъ капиталъ?

368. Я задумалъ число, затѣмъ умножилъ его на 7, прибавилъ къ произведенію 3, раздѣлилъ полученный результатъ на 2 и отъ частнаго отнялъ 4; тогда у меня осталось 15. Какое число я задумалъ?

369. Летитъ стадо гусей, а навстрѣчу ему еще гусь. Гусь спрашиваетъ: «Сколько васъ всѣхъ?» Ему отвѣчаютъ: «если бы насъ было столько, да еще столько, да еще полстолько, да еще четверть столько, да ты съ нами, гусь, тогда насъ было бы ровно 100 гусей». Сколько въ стадѣ гусей?

370. Два поѣзда выходятъ одновременно навстрѣчу другъ другу: одинъ изъ города A , другой изъ города B . Первый поѣздъ проходитъ каждый часъ 53 версты, второй 35; разстояніе между городами A и B равно 140 верстамъ. На какомъ разстояніи отъ города A поѣзда встрѣтятся?

371. Изъ города A отбылъ полкъ солдатъ къ городу B , отстоящему отъ A на 345 верстъ; черезъ три дня послѣ его отправленія къ городу A направился изъ B другой полкъ, навстрѣчу первому. Первый полкъ ежедневно проходитъ по 35 верстъ, второй — по 45 верстъ. Черезъ сколько дней по отправленіи перваго полка они встрѣтятся?

372. Купецъ, имѣя вино двухъ сортовъ: по 72 коп. и по 40 коп. за бутылку, желаетъ составить смѣсь въ 50 бутылокъ, цѣною

по 60 коп. за бутылку. Сколько онъ долженъ взять вина того и другого сорта?

373. Бочка съ виномъ имѣетъ три крана; если открыть только одинъ первый кранъ, то вся бочка опорожнится въ 2 часа; если открыть только одинъ второй кранъ, бочка опорожнится въ 3 часа; черезъ одинъ третій кранъ все вино вытекаетъ въ 4 часа. Во сколько времени опорожнится вся бочка, если открыть три крана одновременно?

374. Фабрикантъ долженъ приготовить кусокъ полотна; одинъ рабочій могъ бы его приготовить въ 6 дней, другой рабочій приготовилъ бы его въ 8 дней и третій въ 10 дней. Они проработали вмѣстѣ въ теченіе 2 дней, послѣ чего осталось еще приготовить 26 аршинъ полотна. Сколько аршинъ было въ кускѣ?

375. Бассейнъ наполняется тремя фонтанами, которые, дѣйствуя отдѣльно, могли бы наполнить бассейнъ: одинъ въ $1\frac{1}{3}$ часа, другой въ $3\frac{1}{3}$ часа и третій въ 5 часовъ. Во сколько времени наполнится бассейнъ, если дѣйствуютъ всѣ три фонтана одновременно?

376. Нѣкто условился платить своему слугѣ въ годъ 240 руб. жалованья и сверхъ того долженъ дать ему ливрею; но слуга прослужилъ только 5 мѣсяцевъ и при расчетѣ получилъ отъ хозяина 37 руб. и ливрею. Во сколько рублей цѣнилась ливрея?

377. Подрядчикъ нанялъ рабочаго съ условіемъ платить ему за каждый рабочій день по $1\frac{1}{2}$ руб. и удерживать съ него по 60 коп. за каждый день прогула. По прошествіи 50 дней, рабочій при расчетѣ получилъ только 49 руб. 80 коп. Сколько дней изъ этихъ 50-ти рабочій прогулялъ?

378. Крестьянинъ отправился въ городъ продавать яйца; сначала онъ продалъ половину всего числа яицъ и еще 4 яйца; потомъ продалъ половину того, что осталось, и еще 2 яйца; затѣмъ продалъ половину того, что осталось послѣ второй продажи, и сверхъ того еще 6 яицъ; послѣ третьей продажи у него осталось 2 яйца не проданными. Сколько онъ принесъ яицъ для продажи?

379. Игрокъ сыгралъ три игры; въ первой онъ проигралъ половину того, что имѣлъ; во второй проигралъ $\frac{2}{3}$ того, что у него осталось послѣ первой игры; въ третьей игрѣ онъ выигралъ въ 4 раза болѣе, чѣмъ у него оставалось послѣ двухъ первыхъ игръ. По окончаніи третьей игры, оказалось, что въ результатѣ игрокъ проигралъ за всю игру 15 рублей. Сколько рублей имѣлъ онъ въ началѣ игры?

380. Найти двухзначное число по слѣдующимъ условіямъ: сумма его цифръ равна 8; если цифры числа переставить и изъ полученнаго послѣ этой перестановки числа вычесть прежнее, то въ остаткѣ окажется 36.

381. Сумма цифръ двухзначнаго числа равна 15. Если взять $\frac{1}{4}$ этого числа и приложить къ ней 45, то получится число, написанное тѣми же цифрами, но въ обратномъ порядкѣ. Найти это число.

382. Найти трехзначное число, зная, что число десятковъ въ немъ въ 3 раза болѣе числа сотенъ, что число единицъ менѣе числа десятковъ на 1 и что, написавъ цифры его въ обратномъ порядкѣ, мы получимъ число, превосходящее искомое на 297.

383. Пьеронъ, царь Сиракузскій, заказалъ мастеру приготовить ему корону изъ 10 фунтовъ золота. Когда корона была готова, Пьеронъ заподозрилъ мастера въ обманѣ, предполагая, что онъ скрылъ часть золота, замѣнивъ его серебромъ. Окончательно рѣшить этотъ вопросъ онъ поручилъ Архимеду. Архимедъ, послѣ нѣкоторыхъ опытовъ, не только убѣдился въ обманѣ мастера, но и опредѣлилъ, сколько въ коронѣ осталось чистаго золота и сколько было подбавлено серебра. При этомъ онъ основывался на слѣдующихъ опытныхъ данныхъ: чистое золото, погруженное въ воду, дѣлается въ немъ легче на 0,052 своего вѣса, чистое серебро теряетъ въ водѣ 0,099 своего вѣса, а корона, вѣсившая въ воздухѣ 10 фунтовъ, въ водѣ вѣсила только $9\frac{3}{8}$ фунта. Какъ рѣшить задачу, предложенную Архимеду?

384. Имѣются два сосуда: одинъ наполненъ виномъ, другой водой; объемъ перваго 5 ведеръ, объемъ втораго 3 ведра. Отливаютъ изъ перваго сосуда нѣкоторое количество вина и столько же отливаютъ воды изъ втораго сосуда. Отлитое вино переливаютъ въ сосудъ съ водою, а отлитую воду—въ сосудъ съ виномъ. Послѣ этого въ обоихъ сосудахъ получилась смѣсь одинаковаго достоинства. Сколько ведеръ было отлито изъ cadaго сосуда?

Примѣры на отрицательное рѣшеніе.

385. Отцу 40 лѣтъ, а сыну 10 лѣтъ; черезъ сколько лѣтъ отецъ будетъ въ 7 разъ старше сына?

Рѣшеніе. Обозначимъ искомое число лѣтъ черезъ x . Черезъ x лѣтъ отцу будетъ $40+x$, а сыну $10+x$ лѣтъ. По условію:
 $40+x=7(10+x)$; откуда $x=-5$.

Отецъ будетъ въ 7 разъ старше сына черезъ — 5 лѣтъ, т.-е. отецъ *былъ* въ 7 разъ старше сына 5 лѣтъ тому назадъ. Дѣйствительно, 5 лѣтъ тому назадъ отцу было 35, а сыну 5 лѣтъ, а 35 въ 7 разъ больше 5.

386. Два рабочих готовят полотно, при чем один изготавливает ежедневно 5 арш., а другой 8 арш. В настоящее время первый рабочий уже сдѣлалъ n аршинъ, а второй на 12 арш. больше. Черезъ сколько дней число аршинъ, изготовленныхъ первымъ рабочимъ, будетъ равно числу аршинъ, изготовленныхъ вторымъ?

Что означаетъ здѣсь отрицательный отвѣтъ?

387. Въ двухъ кошелькахъ было 100 руб. Вынувъ изъ одного $\frac{1}{2}$, а изъ другого $\frac{1}{3}$ денегъ, находившихся въ нихъ, замѣтили, что въ обоихъ кошелькахъ осталось 70 рублей. Сколько денегъ было въ каждомъ кошелькѣ?

Рѣшеніе. Положимъ, что въ первомъ кошелькѣ денегъ было x руб.; тогда въ другомъ ихъ было $100-x$. Когда изъ первого вынули $\frac{1}{2}$ его денегъ, то въ немъ осталось $\frac{1}{2}x$; когда изъ второго вынули $\frac{1}{3}$ его денегъ, то въ немъ осталось $\frac{2}{3}(100-x)$; по условію задачи:

$$\frac{3}{2}x + \frac{2}{3}(100-x) = 70$$

$$3x + 400 - 4x = 420; \text{ откуда: } x = -20.$$

Такъ какъ величина, о которой идетъ рѣчь въ вопросѣ задачи, не можетъ быть понимаема въ двухъ противоположныхъ смыслахъ, то отрицательное рѣшеніе означаетъ здѣсь невозможность задачи.

388. Чтобы поступить въ клубъ, требуется внести временно 20 руб. и затѣмъ ежегодно по 10 руб. Два брата сдѣлались членами этого клуба и за все время уплатили 35 руб. Сколько лѣтъ пробыли они членами клуба?

Что означаетъ здѣсь отрицательный отвѣтъ?

Система двухъ уравненій съ двумя неизвѣстными.

94. Одно уравненіе съ двумя неизвѣстными. Такое уравненіе имѣетъ безчисленное множество корней. Для примѣра возьмемъ уравненіе: $3x-5y=2$. Если вмѣсто одного неизвѣстнаго, напр. y , будемъ подставлять произвольныя числа, напр., такія: 0, 1, 2, 3..., то послѣ всякой подстановки будемъ получать уравненіе съ однимъ неизвѣстнымъ x ; рѣшивъ это

уравненіе, найдемъ для x число, соответствующее взятой величинѣ y . Если, напр., $y=0$, то получимъ: $3x=2$, откуда $x=\frac{2}{3}$; если $y=1$, то $3x-5=2$, откуда $x=\frac{7}{3}$ и т. д.

Уравненіе, имѣющее безчисленное множество корней, называется **неопредѣленнымъ**.

95. Система уравненій. Нѣсколько уравненій съ нѣсколькими неизвѣстными: x, y, z, \dots , составляютъ систему уравненій, если извѣстно, что каждая изъ буквъ x, y, z, \dots означаетъ одно и то же число для всѣхъ уравненій. Если, напр., два уравненія:

$$2x-5=3y-2 \text{ и } 8x-y=2y+21$$

разсматриваются при томъ условіи, что неизвѣстныя x и y должны имѣть одинаковыя численныя значенія для обоихъ уравненій, то такія уравненія образуютъ систему.

Рѣшить систему уравненій значитъ найти всѣ числа, которыя, подставленные въ данныя уравненія на мѣсто неизвѣстныхъ, обращаютъ уравненія въ тождества. Совокупность этихъ чиселъ называется **рѣшеніемъ** системы.

Для рѣшенія системы двухъ уравненій съ двумя неизвѣстными существуетъ нѣсколько способовъ. Всѣ они имѣютъ цѣлью привести два уравненія съ двумя неизвѣстными къ одному уравненію съ однимъ неизвѣстнымъ или, какъ говорятъ, **исключить одно неизвѣстное**. Разсмотримъ два способа.

Замѣчаніе. Прежде, чѣмъ примѣнять тотъ или другой изъ указываемыхъ способовъ, уравненія надо предварительно упростить, т.-е., по освобожденіи ихъ отъ скобокъ и знаменателей дробей (если таковыя имѣются), перенести всѣ члены, содержащіе неизвѣстныя, въ лѣвую часть уравненія, а остальные члены—въ правую и сдѣлать приведеніе подобныхъ членовъ.

96. Способъ подстановки. Пусть имѣемъ систему:

$$\begin{cases} 8x-5y=-16 \\ 10x+3y=17 \end{cases}$$

и желаемъ исключить x . Для этого разсуждаемъ такъ: изъ перваго уравненія опредѣлимъ x въ зависимости отъ другаго неизвѣстнаго y (для чего, конечно, надо членъ $-5y$ перенести направо и затѣмъ раздѣлить обѣ части уравненія на 8):

$$x = \frac{5y-16}{8}.$$

Такъ какъ второе уравненіе должно удовлетворяться тѣми же значеніями неизвѣстныхъ, какъ и первое, то мы можемъ подставить въ него вмѣсто x найденное для него выраженіе, отчего получимъ уравненіе съ однимъ неизвѣстнымъ y :

$$10 \cdot \frac{5y-16}{8} + 3y = 17.$$

Рѣшимъ это уравненіе:

$$\frac{5(5y-16)}{4} + 3y = 17; \quad 25y - 80 + 12y = 68; \quad 37y = 148; \quad y = 4;$$

тогда:
$$x = \frac{5y-16}{8} = \frac{5 \cdot 4 - 16}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

Мы могли бы опредѣлить изъ одного уравненія y въ зависимости отъ x и полученное для y выраженіе подставить въ другое уравненіе.

Правило. Чтобы рѣшить 2 уравненія съ 2 неизвѣстными способомъ подстановки, опредѣляютъ изъ какого-либо уравненія одно неизвѣстное въ зависимости отъ другаго и полученное выраженіе вставляютъ въ другое уравненіе; отъ этого получается одно уравненіе съ однимъ неизвѣстнымъ; рѣшивъ его, опредѣляютъ это неизвѣстное; подставивъ найденное число въ формулу, выведенную

раньше для перваго неизвѣстнаго, опредѣляютъ и это неизвѣстное.

Замѣчаніе. Этотъ способъ особенно удобенъ тогда, когда коэффициентъ при исключаемомъ неизвѣстномъ равенъ 1.

97. Способъ сложенія или вычитанія. Предположимъ сначала, что въ данной системѣ уравненій коэффициенты при какомъ-нибудь одномъ и томъ же неизвѣстномъ, напр., при y , будутъ одинаковы. При этомъ могутъ представиться два случая: или знаки передъ такими коэффициентами разные, или они одинаковы. Пусть, напр., данныя системы будутъ такія:

$$\begin{array}{l} \text{1-я система} \\ \left\{ \begin{array}{l} 7x-2y=27 \\ 5x+2y=33 \end{array} \right. \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{2-я система} \\ \left\{ \begin{array}{l} 5x+8y=31 \\ 3x+8y=25 \end{array} \right. \end{array}$$

Сложимъ почленно уравненія первой системы и вычтемъ почленно уравненія второй системы:

$$\begin{array}{l} 7x-2y=27 \\ 5x+2y=33 \\ \hline 12x \quad = 60 \end{array} \quad \begin{array}{l} 5x+8y=31 \\ -3x+8y=-25 \\ \hline 2x \quad = 6 \end{array}$$

Такимъ образомъ, одно неизвѣстное исключилось. Изъ полученныхъ уравненій находимъ:

$$x = \frac{60}{12} = 5 \quad \left| \quad x = \frac{6}{2} = 3$$

Вставивъ въ одно изъ данныхъ уравненій вмѣсто x найденное для него число, найдемъ y :

$$\begin{array}{l} 7 \cdot 5 - 2y = 27 \\ y = 4 \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} 5 \cdot 3 + 8y = 31 \\ y = 2 \end{array}$$

Возьмемъ теперь систему двухъ уравненій, въ которыхъ коэффициенты при одномъ и томъ же неизвѣстномъ не одинаковы, напр., такую:

$$\begin{cases} 7x+6y=29 \\ -5x+8y=10 \end{cases}$$

Пусть желаемъ исключить y . Для этого преобразуемъ уравненія такъ, чтобы передъ y коэффициенты оказались одинаковы. Чтобы достигнуть этого, достаточно всѣ члены перваго уравненія умножить на коэффициентъ при y во второмъ уравненіи, т. е. на 8, а всѣ члены втораго уравненія умножить на коэффициентъ при y въ первомъ уравненіи, т. е. на 6:

$$\begin{array}{r} 7x+6y=29 \text{ (на 8)} \quad 56x+48y=232 \\ -5x+8y=10 \text{ (на 6)} \quad -30x+48y=60 \end{array}$$

Такимъ образомъ, этотъ случай всегда можно привести къ первому. Послѣ этого остается только сложить или вычесть преобразованныя уравненія. Въ нашемъ примѣрѣ знаки передъ y въ обоихъ уравненіяхъ одинаковы, а потому для исключенія y надо уравненія почленно вычесть:

$$\begin{array}{r} 56x+48y=232 \\ -30x+48y=60 \\ \hline 86x \quad \quad = 172; \text{ откуда } x=2 \end{array}$$

Другое неизвѣстное мы можемъ найти или посредствомъ подстановки въ одно изъ данныхъ уравненій вмѣсто x найденнаго для него числа, или тѣмъ же путемъ, какимъ нашли x .

Замѣчаніе. Чтобы коэффициенты передъ y оказались не только равными, но и наименьшими, слѣдуетъ найти наименьшее кратное коэффициентовъ y , т. е. 6-и и 8-ми (это будетъ 24), раздѣлить его на каждый изъ этихъ коэффициентовъ ($24 : 6 = 4$; $24 : 8 = 3$) и на полученные частныя умножить соответственно всѣ члены данныхъ уравненій:

$$\begin{array}{r} 7x+6y=29 \text{ (на 4)} \quad 28x+24y=116 \\ -5x+8y=10 \text{ (на 3)} \quad -15x+24y=30 \end{array}$$

Вычтя почленно уравненія, получимъ: $43x=86$, $x=2$.

Правило. Чтобы изъ двухъ уравненій исключить одно неизвѣстное по способу сложения или вычитанія, надо уравнять въ обоихъ уравненіяхъ коэффициенты при исключаемомъ неизвѣстномъ, а потомъ сложить оба уравненія, если знаки передъ этимъ неизвѣстнымъ разные, или изъ одного уравненія вычесть почленно другое, если знаки передъ исключаемымъ неизвѣстнымъ одинаковы.

Упражненія.

389. $\begin{cases} 3x+2y=118 \\ x+5y=191. \end{cases}$ 390. $\begin{cases} 7x+\frac{5}{2}y=410\frac{1}{2} \\ 93x-14y+448=0. \end{cases}$
 391. $\begin{cases} 5\frac{3}{4}y-11x=4y+117\frac{1}{8} \\ 8x+175=2y. \end{cases}$ 392. $\begin{cases} 7y=2x-3 \\ 19x-60y=621\frac{1}{4}. \end{cases}$
 393. $\begin{cases} (x+5)(y+7)=(x+1)(y-9)+112 \\ 2x+10=3y+1. \end{cases}$ 394. $\begin{cases} 39x+2y=80 \\ 115x-4y=226. \end{cases}$
 395. $\begin{cases} \frac{x+2y}{5} - \frac{y-2x}{3} = 1 \\ \frac{y+2x}{4} + \frac{x+y}{3} = 2. \end{cases}$ 396. $\begin{cases} \frac{x+1}{y-1} + \frac{y-1}{x+1} = \frac{x}{y-1} + \frac{y}{x+1} \\ \frac{x}{y} + \frac{y}{x-\frac{4}{3}} = \frac{x-1}{y} + \frac{y+\frac{4}{3}}{x-\frac{4}{3}}. \end{cases}$
 397. $\begin{cases} 2(x+y)+4=5(x-y)+19 \\ x-12+13y=3(2x+y)-22. \end{cases}$

398. *A* говоритъ *B*: дай мнѣ 100 рублей и тогда я буду имѣть столько же, сколько будетъ у тебя; *B* отвѣчаетъ: дай ты мнѣ 100 рублей, и тогда у меня будетъ вдвое больше, чѣмъ у тебя. Сколько денегъ у *A* и *B*?

399. Куплено 8 фунтовъ одного товару и 19 фунтовъ другаго и за все заплачено 16 р. 45 к.; въ другой же разъ по тѣмъ же цѣнамъ куплено 20 фунтовъ перваго товару и 16 фунтовъ втораго и заплачено 23 р. 80 к. Узнать цѣну фунта каждаяго товару.

400. Найти такую дробь, что если отнять 1 отъ ея числителя, то получится дробь, равная $\frac{1}{5}$, а если отнять 1 отъ ея знаменателя, то величина дроби сдѣлается равной $\frac{1}{4}$.

401. Отецъ и сынъ работаютъ вмѣстѣ. За 12 дней работы отца и 9 дней работы сына имъ было уплачено 78 руб.; въ другой разъ за 10 дней работы отца и 11 дней работы сына они получили 72 руб. Сколько получалъ каждый изъ нихъ въ день?

402. Нѣкто отдалъ одну часть своего капитала по 5%, а остальную часть по 3% и получилъ въ годъ дохода 5168 руб.; если бы онъ отдалъ по 3% ту часть капитала, которую отдалъ по 5%, и наоборотъ, то получилъ бы въ годъ дохода на 648 руб. меньше. Какой былъ капиталъ?

403. Бассейнъ въ 210 ведеръ наполняется двумя фонтанами. Изъ опыта нашли, что если открыть одинъ фонтанъ на 4 часа, а другой на 5 часовъ, то они оба вольютъ 90 ведеръ воды; если же первый фонтанъ открыть на 7 часовъ, а другой на $3\frac{1}{2}$ часа, то въ бассейнъ вольется 126 ведеръ. Сколько ведеръ вливаетъ каждый фонтанъ въ часъ и во сколько времени бассейнъ наполнится, если оба фонтана дѣйствуютъ одновременно?

404. У меня въ каждой рукѣ по нѣскольку монеть; если я изъ правой руки въ лѣвую переложу 1 монету, то въ обѣихъ рукахъ будетъ поровну; если же изъ лѣвой руки въ правую переложить 2 монеты, то въ правой рукѣ будетъ въ 2 раза болѣе монеть, чѣмъ въ лѣвой. Сколько монеть въ каждой рукѣ?

405. Капиталъ помѣщенъ на проценты. Если къ капиталу прибавить 1000 руб. и увеличить число процентовъ на 1, то доходъ увеличился бы на 80 руб. Если же еще увеличить капиталъ на 500 руб. и число процентовъ еще увеличить на 1, то доходъ сравнительно съ первоначальнымъ возросъ бы на 160 руб. Какой капиталъ и по сколько процентовъ былъ онъ отданъ?

Система трехъ и болѣе уравненій со многими неизвѣстными.

98. Предварительное замѣчаніе. Одно или два уравненія съ тремя неизвѣстными допускаютъ вообще безчисленное множество корней, потому что въ первомъ случаѣ двумъ неизвѣстнымъ, а въ второмъ—одному неизвѣстному можно придавать произвольныя значенія, число которыхъ, очевидно, бесконечно велико.

Система трехъ уравненій съ тремя неизвѣстными вообще имѣетъ лишь одно рѣшеніе для каждаго неизвѣстнаго и рѣшается тѣми же способами, какіе указали выше для системы двухъ уравненій.

Покажемъ примѣненіе этихъ способовъ на слѣдующемъ примѣрѣ (мы предполагаемъ, что уравненія предварительно упрощены):

$$\begin{cases} 3x-2y+5z=7 \\ 7x+4y-8z=3 \\ 5x-3y-4z=-12. \end{cases}$$

99. Способъ подстановки. Изъ одного уравненія, напр., изъ перваго, опредѣлимъ какое-нибудь неизвѣстное напр., x , въ зависимости отъ другихъ неизвѣстныхъ:

$$x = \frac{7+2y-5z}{3}.$$

Подставимъ это выраженіе въ остальные уравненія:

$$\begin{aligned} 7 \cdot \frac{7+2y-5z}{3} + 4y - 8z &= 3, \\ 5 \cdot \frac{7+2y-5z}{3} - 3y - 4z &= -12. \end{aligned}$$

Мы приходимъ такимъ образомъ къ двумъ уравненіямъ съ двумя неизвѣстными. Рѣшивъ ихъ по какому-нибудь изъ способовъ, указанныхъ прежде, найдемъ: $y=3$, $z=2$; подставивъ эти числа въ формулу для x , выведенную раньше, найдемъ и это неизвѣстное:

$$x = \frac{7+2 \cdot 3-5 \cdot 2}{3} = 1.$$

100. Способъ сложенія или вычитанія. Взявъ 1-е уравненіе со 2-мъ, исключимъ изъ нихъ какое-нибудь неизвѣстное способомъ сложенія или вычитанія; отъ этого получимъ одно уравненіе съ 2 неизвѣстными. Взявъ потомъ 1-е уравненіе съ 3-мъ (или 2-е съ 3-мъ), тѣмъ же способомъ исключимъ изъ нихъ то же неизвѣстное; отъ этого

получимъ еще одно уравненіе съ 2 неизвѣстными. Пусть, напр., желаемъ исключить z :

$$\begin{array}{l} 1) \ 3x - 2y + 5z = 7 \text{ (на 8)} \quad 24x - 16y + 40z = 56 \\ 2) \ 7x + 4y - 8z = 3 \text{ (на 5)} \quad 35x + 20y - 40z = 15 \\ \hline \\ \\ 1) \ 3x - 2y + 5z = 7 \text{ (на 4)} \quad 12x - 8y + 20z = 28 \\ 3) \ 5x - 3y - 4z = -12 \text{ (на 5)} \quad 25x - 15y - 20z = -60 \\ \hline \\ \end{array}$$

Рѣшивъ полученныя два уравненія, найдемъ: $x=1$, $y=3$. Вставивъ эти числа въ одно изъ данныхъ уравненій, напр., въ первое, получимъ:

$$3 \cdot 1 - 2 \cdot 3 + 5z = 7; \quad 5z = 10; \quad z = 2.$$

Замѣчаніе. Для исключенія одного неизвѣстнаго мы брали въ этомъ примѣрѣ 1-е уравненіе со 2-мъ, потомъ 1-е съ 3-мъ; но нѣтъ надобности держаться такого порядка. Можно взять 1-е ур. съ 2-мъ, потомъ 2-е съ 3-мъ; или: 1-е съ 3-мъ, потомъ 2-е съ 3-мъ,—однимъ словомъ: надо взять какое-нибудь изъ трехъ уравненій съ каждымъ изъ остальныхъ.

101. Примѣненіе этихъ способовъ къ большому числу уравненій. Тѣми же способами мы можемъ рѣшить систему 4-хъ ур. съ 4 неизвѣстными, 5-ти ур. съ 5-ю неизвѣстными, вообще n уравненій съ n неизвѣстными. Положимъ для примѣра, что дано рѣшить систему 5-ти ур. съ 5-ю неизвѣстными. Тогда поступаютъ такъ:

Способъ подстановки. Изъ одного уравненія опредѣляютъ какое-нибудь неизвѣстное въ зависимости отъ другихъ неизвѣстныхъ; полученное выраженіе вставляютъ вмѣсто исключаемаго неизвѣстнаго въ остальные уравненія; отъ этого получаютъ 4 уравненія съ 4 неизвѣстными. Съ этою системою поступаютъ точно такъ же. Продолжаютъ исключеніе неизвѣстныхъ до тѣхъ поръ, пока

не получится одно уравненіе съ однимъ неизвѣстнымъ. Рѣшивъ его, находятъ значеніе этого неизвѣстнаго. Вставивъ это значеніе въ формулу, выведенную для того неизвѣстнаго, которое исключали въ послѣдній разъ, получаютъ значеніе другого неизвѣстнаго. Вставивъ эти два значенія въ формулу, выведенную для того неизвѣстнаго, которое исключали въ предпоследній разъ, находятъ значеніе третьяго неизвѣстнаго. Продолжаютъ такъ до тѣхъ поръ, пока не будутъ получены значенія всѣхъ неизвѣстныхъ.

Способъ сложенія или вычитанія. Берутъ два уравненія, напр., первое и второе, исключаютъ изъ нихъ одно неизвѣстное способомъ сложенія или вычитанія (конечно, уравнивъ предварительно коэффиціенты передъ исключаемымъ неизвѣстнымъ). Отъ этого получаютъ одно уравненіе съ 4 неизвѣстными. Потомъ берутъ одно изъ взятыхъ прежде уравненій, напр., второе, вмѣстѣ съ какимъ-нибудь изъ остальныхъ, напр., съ третьимъ, и тѣмъ же способомъ исключаютъ изъ нихъ то же неизвѣстное; отъ этого получаютъ другое уравненіе съ 4 неизвѣстными. Затѣмъ берутъ одно изъ ранѣе взятыхъ уравненій, напр., третье, вмѣстѣ съ однимъ изъ остальныхъ, напр., съ четвертымъ, и исключаютъ изъ нихъ то же самое неизвѣстное; отъ этого получаютъ третье уравненіе съ 4 неизвѣстными. Перебравъ такимъ образомъ всѣ 5 уравненій, получаютъ 4 ур. съ 4 неизвѣстными. Съ этою системою можно поступать точно такъ же, какъ и съ первой.

Упражненія.

$$406. \begin{cases} 3x - y + z = 17 \\ 5x + 3y - 2z = 10 \\ 7x + 4y - 5z = 3 \end{cases} \quad 407. \begin{cases} 2x + 5y - 3z + 40 = 0 \\ 5x - 6y + 2z = 45 \\ 5z = 195 + 7x + y \end{cases}$$

$$408. \begin{cases} 18x - 7y - 5z = 11 \\ 2\frac{2}{5}y - \frac{2}{3}x + z = 58 \\ 2\frac{1}{2}z + 2y + \frac{1}{4}x = 80 \end{cases}$$

$$409. \begin{cases} \frac{x}{10} + \frac{5y}{24} + \frac{4z}{25} = 10 \\ \frac{3x}{10} + \frac{7y}{24} + \frac{13}{25} = 23 \\ \frac{3x}{5} + \frac{y}{2} + \frac{8z}{25} = 26 \end{cases}$$

$$410. \begin{cases} 3x + 5y = 161 \\ 7x + 2z = 209 \\ 2y + z = 89 \end{cases}$$

Замѣчаніе. Когда не всё неизвѣстныя входятъ въ каждое уравненіе, то система уравненій рѣшается быстрее, чѣмъ обыкновенно. Напримѣръ, въ предложенной задачѣ достаточно изъ перваго и втораго уравненія исключить x и полученное отъ этого уравненіе (съ y и z) взять вмѣстѣ съ третьимъ. Тогда будемъ имѣть систему двухъ уравненій съ 2 неизвѣстными.

$$411. \begin{cases} 4x - 3z + u = 10 \\ 5y + z - 4u = 1 \\ 3y + u = 17 \\ x + 2y + 3u = 25 \end{cases}$$

$$412. \begin{cases} 4x - 3z = 10 \\ 2y - 5u = 5 \\ z + 3x = 19 \\ 3x + y = 13 \\ 2y - 3u = 11 \end{cases}$$

$$413. \begin{cases} 2x + y - 2z + t = 13 \\ 2y - z + 2t - x = 25 \\ 3z + 2t - x + 2y = 37 \\ 4t - 2x + 3y - 2z = 43 \end{cases}$$

$$414. \begin{cases} x + y = 10 \\ x + z = 19 \\ y + z = 23 \end{cases}$$

Замѣчаніе. Иногда систему уравненій можно рѣшить проще, чѣмъ обыкновеннымъ путемъ, посредствомъ нѣкоторыхъ искусственныхъ приѣмовъ. Такъ, предложенная система просто рѣшается такъ: сложивъ всё три уравненія и раздѣливъ результатъ на 2, найдемъ сумму трехъ неизвѣстныхъ. Вычитая изъ этой суммы послѣдовательно первое, второе и третье уравненія, найдемъ значенія для z , y и x .

$$415. \begin{cases} x + y + z = 29\frac{1}{4} \\ x + y - z = 18\frac{1}{4} \\ x - y + z = 13\frac{3}{4} \end{cases} \quad (\text{Искусственный приѣмъ рѣшенія}).$$

$$416. \begin{cases} \frac{3}{x} + \frac{2}{y} - \frac{4}{z} = -13 \\ \frac{6}{x} - \frac{3}{y} + \frac{1}{z} = 5\frac{1}{2} \\ \frac{5}{x} + \frac{7}{y} - \frac{2}{z} = 3\frac{1}{2} \end{cases}$$

Замѣчаніе. Обозначимъ для краткости дробь $\frac{1}{x}$ черезъ a , $\frac{1}{y}$ черезъ b и $\frac{1}{z}$ черезъ c . Такъ какъ: $\frac{3}{x} = 1/x \cdot 3$, $\frac{2}{y} = 1/y \cdot 2$ и т. п., то данныя уравненія можно переписать такъ:

$$\begin{cases} 3a + 2b - 4c = -13 \\ 6a - 3b - c = 5\frac{1}{2} \\ -5a + 7b - 2c = 3\frac{1}{2} \end{cases}$$

Рѣшивъ эту систему со вспомогательными неизвѣстными a , b и c , найдемъ: $a=2$, $b=1/2$ и $c=5$; значить: $1/x=2$, $1/y=1/2$ и $1/z=5$; откуда найдемъ: $x=1/2$, $y=2$ и $z=1/5$.

$$417. \begin{cases} \frac{2}{x} - \frac{5}{3y} + \frac{1}{z} = \frac{5}{6} \\ \frac{1}{4x} + \frac{1}{y} + \frac{2}{z} = 2\frac{7}{12} \\ \frac{5}{6x} - \frac{1}{y} + \frac{4}{z} = 3\frac{7}{9} \end{cases}$$

(См. замѣчаніе къ предыдущей задачѣ).

$$418. \begin{cases} \frac{1}{x+y} + \frac{1}{x+z} = 6,6 \\ \frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} = 0 \\ \frac{1}{x+z} + \frac{1}{y+z} = -5,4 \end{cases}$$

Указаніе. За вспомогательныя неизвѣстныя надо принять: $\frac{1}{x+y}=a$, $\frac{1}{x+z}=b$, $\frac{1}{y+z}=c$.

Послѣ этого придется два раза рѣшать системы такого рода, какъ въ задачѣ № 414.

419. У одного человѣка спросили о возрастѣ его самого, его отца и дѣда. Онъ отвѣчалъ: мой возрастъ вмѣстѣ съ годами отца составляетъ 56 лѣтъ; года отца, сложенные съ годами дѣда, составляютъ 100 лѣтъ; мои года вмѣстѣ съ годами дѣда даютъ въ суммѣ 80 лѣтъ. Определить возрастъ каждаго.

420. Три лица A , B и C имѣютъ вмѣстѣ 1820 руб. B даетъ 200 руб. A и тогда у A оказалось на 160 руб. больше, чѣмъ у B ; если же C дастъ B 70 руб., то тогда у B и C будетъ поровну. Сколько денегъ каждый имѣлъ?

421. Три лица A , B и C покупаютъ кофе, сахаръ и чай. A платитъ 14 руб. за 8 фунтовъ кофе, 10 ф. сахару и 3 ф. чаю; A платитъ 16 руб. за 4 ф. кофе, 15 ф. сахару и 5 ф. чаю; C за-

платить 33 руб. за 12 ф. кофе, 20 ф. сахару и 10 ф. чаю. Определить цену фунта кофе, сахару и чаю.

422. Найти число из трех цифр по следующим условиям: 1) сумма числа сотен и числа единиц равна удвоенному числу десятков, 2) частное от деления искомого числа на сумму его цифр равно 48, и 3) если вычтем из искомого числа 198, то получим число, написанное теми же цифрами, но в обратном порядке.

423. Три каменщика *A*, *B* и *C* строят стѣну. *A* и *B* могли бы окончить ее въ 12 дней, *B* и *C*—въ 20 дней, *A* и *C*—въ 15 дней. Во сколько дней каждый каменщик окончил бы работу, работая отдѣльно от другихъ, и во сколько дней окончить трое, работая совместно?

424. Имѣютъ три куска сплава изъ золота, серебра и мѣди; эти куски содержатъ:

1-й кусокъ—	2	части зол.,	3	части сер.	и	4	части мѣди.
2-й кусокъ—	3	»	»	4	»	5	»
3-й кусокъ—	4	»	»	3	»	5	»

Сколько фунтовъ надо взять отъ каждого куска, чтобы получить сплавъ, содержащій 5 ф. золота, 6 ф. серебра и 8 ф. мѣди?

Объясненіе. Пусть отъ перваго куска надо взять x фунтовъ отъ втораго y , отъ третьяго z . Такъ какъ въ первомъ кускѣ на $2+3+4$ части сплава приходится золота 2 части, серебра 3 части и мѣди 4 части, то, значить, въ немъ содержится $\frac{2}{9}$ золота, $\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$ серебра и $\frac{4}{9}$ мѣди. Подобно этому найдемъ, что во второмъ кускѣ содержится $\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$ золота, $\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$ серебра и $\frac{5}{12}$ мѣди; въ третьемъ кускѣ содержится золота $\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$, серебра $\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$ и мѣди $\frac{5}{12}$. Слѣдовательно, въ x фунтахъ, взятыхъ отъ перваго куска, золота будетъ $\frac{2}{9}x$, серебра $\frac{1}{3}x$ и мѣди $\frac{4}{9}x$; въ y фунтахъ втораго и въ z фунтахъ третьяго кусковъ количества этихъ металловъ выразятся такъ: $\frac{1}{3}y$, $\frac{1}{3}y$, $\frac{5}{12}y$; $\frac{1}{3}z$, $\frac{1}{4}z$, $\frac{5}{12}z$. По условіямъ задачи должно быть:

$$\frac{2}{9}x + \frac{1}{4}y + \frac{1}{3}z = 5$$

$$\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}y + \frac{1}{4}z = 6$$

$$\frac{4}{9}x + \frac{5}{12}y + \frac{5}{12}z = 8$$

Вмѣсто одного изъ этихъ уравненій можно взять новое уравненіе:

$$x + y + z = 19.$$

425. Имѣютъ три куска сплава изъ золота, серебра и мѣди; эти куски содержатъ:

1-й кусокъ—	на 50	частей зол.	60	частей сер.	и	80	частей мѣди
2-й кусокъ—	» 30	»	» 50	»	» 70	»	»
3-й кусокъ—	» 35	»	» 65	»	» 90	»	»

По сколько фунтовъ надо взять отъ каждого куска, чтобы образовать четвертый сплавъ, содержащій 79 фунтовъ золота, 118 ф. серебра и 162 ф. мѣди?

426. Три игрока *A*, *B* и *C* условливаются, что проигравшій платить остальнымъ двумъ столько, сколько они имѣютъ. Первую партію проигралъ *A*, вторую *B* и третью *C*; послѣ третьей игры оказывается у каждого игрока одна и та же сумма денегъ a руб. Сколько имѣлъ каждый до игры?

Уравненія неопредѣленные и несовмѣстныя.

103. Система, въ которой число уравненій равно числу неизвѣстныхъ. Мы видѣли, что всѣ способы рѣшенія системы уравненій первой степени, когда число уравненій равно числу неизвѣстныхъ, приводятъ къ рѣшенію одного уравненія первой степени съ однимъ неизвѣстнымъ. Но такое уравненіе, какъ мы видѣли на примѣрахъ (§ 93), имѣетъ или одно рѣшеніе, или безчисленное множество рѣшеній (примѣръ 4-й указаннаго параграфа), или ни одного рѣшенія (примѣръ 5-й того же параграфа). Поэтому и система уравненій первой степени, когда число уравненій равно числу неизвѣстныхъ, допускаетъ или одно рѣшеніе, или безчисленное множество рѣшеній (неопредѣленная система), или не имѣетъ ни одного рѣшенія (невозможная система). Примѣры системъ, допускающихъ единственное рѣшеніе, мы уже имѣли прежде; приведемъ теперь примѣры системъ неопредѣленной и невозможной.

Примѣръ 1.
$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 5 \\ 5x + 2y - 4z = -1 \\ 9x - 4y - 2z = 9. \end{cases}$$

Въ этой системѣ третье уравненіе есть слѣдствіе двухъ первыхъ. Въ самомъ дѣлѣ, если члены перваго уравненія умножимъ на 2, потомъ сложимъ его со вторымъ уравненіемъ, то получимъ третье уравненіе; слѣд., если два первыхъ уравненія удовлетворяются какими-нибудь значеніями неизвѣстныхъ, то тѣми же значеніями удовлетворяется и третье уравненіе. Но первые два уравненія, содержа три неизвѣстныхъ, имѣютъ безчисленное множество рѣшеній; значить, система неопредѣленна.

Если станемъ рѣшать эти уравненія, то неопредѣленность обнаружится тѣмъ, что въ концѣ рѣшенія всѣ неизвѣстныя исключатся и получится равенство: $0=0$.

Примѣръ 2.
$$\begin{cases} 2x-3y=14. \\ 4x-6y=20. \end{cases}$$

Въ этой системѣ второе уравненіе противорѣчитъ первому: если разность $2x-3y$ должна равняться 14, то разность $4x-6y$, равная $2(2x-3y)$, должна равняться 14 · 2, т.-е. 28, а не 20, какъ требуетъ второе уравненіе. Значить, предложенная система невозможна. Если станемъ рѣшать эти уравненія, то невозможность обнаружится тѣмъ, что получимъ нелѣпное равенство. Такія уравненія наз. несовмѣстными.

104. Система, въ которой число уравненій меньше числа неизвѣстныхъ. Такая система или допускаетъ безчисленное множество рѣшеній, или не имѣетъ ни одного рѣшенія. Пусть, напр., намъ дана система 3 уравненій съ 5 неизвѣстными: x, y, z, t и v . Назначимъ для 2 неизвѣстныхъ, напр., для x и y , произвольныя числа и подставимъ ихъ въ данныя уравненія; тогда получимъ систему 3 уравненій съ тремя неизвѣстными z, t и v ; рѣшивъ эту систему (если она окажется возможною и опредѣленною), найдемъ значенія этихъ неизвѣстныхъ,

соотвѣтствующія числамъ, взятымъ для x и y . Назначивъ какія-нибудь другія числа для x и y , снова найдемъ соотвѣтствующія значенія для остальныхъ неизвѣстныхъ. Такимъ образомъ каждой парѣ произвольно выбранныхъ чиселъ для x и y найдемъ соотвѣтствующія значенія остальныхъ трехъ неизвѣстныхъ; значить, всѣхъ рѣшеній можетъ быть безчисленное множество.

Можетъ случиться, что уравненія системы окажутся несовмѣстными; тогда система не имѣетъ ни одного рѣшенія.

105. Система, въ которой число уравненій больше числа неизвѣстныхъ. Такая система можетъ имѣть рѣшеніе лишь при нѣкоторыхъ соотношеніяхъ между коэффициентами уравненій. Положимъ, напр., мы имѣемъ систему 7-и ур. съ 4 неизвѣстными. Взявъ изъ всѣхъ уравненій какія-нибудь 4 и рѣшивъ ихъ (если возможно), найдемъ значенія для всѣхъ 4 неизвѣстныхъ. Подставивъ эти значенія въ остальные 3 уравненія, получимъ 3 равенства, которыя могутъ оказаться невозможными. Въ этомъ случаѣ данныя уравненія несовмѣстны.

Примѣръ.

$$\begin{cases} 4x-2y=8 \\ 7x+4y=59 \\ 6x-3y=10 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Рѣшивъ два первыхъ уравненія, найдемъ: } x=5, y=6. \text{ Вставивъ эти значенія въ 3-е уравненіе, получимъ невозможное равенство: } 12=10; \text{ значить, данныя уравненія несовмѣстны.} \end{array}$$

Упражненія.

427. Указать, почему неопредѣленны слѣдующія двѣ системы уравненій и найти нѣсколько рѣшеній этихъ системъ:

$$\begin{cases} 7x-2y+8z=40 \\ x+10y-2z=15 \end{cases} \quad \begin{cases} 5x-y+z=0 \\ 3x+2y-z+7t=20 \end{cases}$$

428. Возможны или невозможны слѣдующія двѣ системы уравненій:

$$\begin{cases} 10x-3y=17 \\ 8x+y=17 \\ x-y=2 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x+7y=31 \\ 8x-5y=25 \\ x+4y=17 \end{cases}$$

429. Какая зависимость должна быть между числами a и b , чтобы была возможна слѣдующая система:

$$x-1=y-10, \quad 2x+y=69, \quad ax-y=b.$$

Обнаружить, что слѣдующія системы неопредѣленны или невозможны и объяснить почему:

$$\begin{array}{ll} 430. \begin{cases} \frac{5y-x}{4} - \frac{5x+y}{6} = 26 \\ \frac{x-y}{6} - \frac{x-y}{4} = 2 \end{cases} & 431. \begin{cases} \frac{5x-y}{4} - \frac{5x+y}{6} = 26 \\ \frac{x-y}{6} - \frac{x-y}{4} = 2 \end{cases} \\ 432. \begin{cases} 5x+3y-11z=13 \\ 4x-5y+4z=18 \\ 9x-2y-7z=25 \end{cases} & 433. \begin{cases} 2x-3y+4z=7 \\ 3x+2y-5z=8 \\ 5x-y-z=15 \end{cases} \end{array}$$

Степени и корни.

Возвышеніе въ степень одночленовъ.

106. Опредѣленія. Произведеніе n одинаковыхъ сомножителей, равныхъ a , наз. n -ою степенью числа a .

Такъ, произведеніе $2 \cdot 2 \cdot 2$, равное 8, есть 3-я степень двухъ; произведеніе $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$, равное $\frac{1}{32}$, есть 5-ая степень $\frac{1}{2}$.

Вторая степень наз. иначе к в а д р а т о м ъ, а третья— к у б о м ъ

Дѣйствіе, посредствомъ котораго находится n -ая степень числа a , наз. возвышеніемъ a въ n -ую степень.

n -ая степень числа a обозначается такъ: a^n . Изъ опредѣленія видно, что это выраженіе равносильно произведенію $a \cdot a \cdot a \dots a$ (n сомножителей).

Повторяющійся сомножитель (a) наз. о с н о в а н і е м ъ степени; число (n) одинаковыхъ сомножителей наз. п о к а з а т е л е м ъ степени.

По смыслу опредѣленія видно, что показатель степени есть число цѣлое, положительное, не равное 0. Впрочемъ, условно допускаютъ степень съ показателемъ 0 (§ 65), разумѣя при этомъ, что при всякомъ a выраженіе a^0 равно 1. Впослѣдствіи мы введемъ еще понятіе объ отрицательныхъ и дробныхъ показателяхъ.

107. Правило знаковъ. Мы видѣли (§ 34), что произведеніе оказывается положительнымъ въ томъ случаѣ, когда въ него входятъ четно число отрицательныхъ сомножителей, и отрицательнымъ, когда число такихъ сомножителей нечетное; поэтому:

отъ возвышенія отрицательнаго числа въ степень съ четнымъ показателемъ получается положительное число, а съ нечетнымъ показателемъ—отрицательное.

$$\text{Такъ: } (-a)^2 = (-a)(-a) = +a^2; \quad (-a)^3 = (-a)^2(-a) = \\ = (+a^2)(-a) = -a^3; \quad (-a)^4 = (-a)^3(-a) = (-a^3)(-a) = +a^4.$$

108. Теоремы. 1) Чтобы возвысить въ степень произведеніе, достаточно возвысить въ эту степень каждаго сомножителя отдѣльно.

Пусть, напр., требуется возвысить произведеніе abc въ квадратъ. Это значить, что требуется abc умножить на abc . Но чтобы умножить на произведеніе, достаточно умножить на перваго сомножителя, полученный результатъ умножить на втораго сомножителя и т. д. Поэтому:

$$(abc)^2 = (abc)(abc) = (abc)abc = abcabc.$$

Сомножителей произведенія мы можемъ соединить въ какія угодно группы. Соединимъ ихъ такъ:

$$(abc)^2 = (aa)(bb)(cc) = a^2b^2c^2.$$

Вообще, если n есть целое положительное число, то $(abc)^n = (abc)(abc)(abc)\dots = abcabcabc\dots = (aaa\dots)(bbb\dots)(ccc\dots) = a^n b^n c^n$.

2) Чтобы возвысить степень въ степень, достаточно перемножить показатели этихъ степеней.

Пусть, напр., требуется возвысить a^2 въ кубъ, т.-е. требуется найти произведение $a^2 \cdot a^2 \cdot a^2$. При умноженіи показатели одинаковыхъ буквъ складываются; поэтому:

$$(a^2)^3 = a^2 \cdot a^2 \cdot a^2 = a^{2+2+2} = a^{2 \cdot 3} = a^6.$$

Вообще: $(a^m)^n = a^m a^m a^m \dots = a^{m+m+m+\dots} = a^{mn}$.

3) Чтобы возвысить въ степень дробь, достаточно возвысить въ эту степень отдѣльно числителя и знаменателя.

Это слѣдуетъ изъ правила умноженія дробей (§ 81). Напримѣръ:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^3 = \frac{a \cdot a \cdot a}{b \cdot b \cdot b} = \frac{a \cdot a \cdot a}{b \cdot b \cdot b} = \frac{a^3}{b^3}.$$

$$\text{Вообще: } \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a \cdot a \cdot a}{b \cdot b \cdot b} \dots = \frac{aaa\dots}{bbb\dots} = \frac{a^n}{b^n}.$$

109. Примѣненія. 1) Пусть требуется возвысить одночленъ $3a^2b^3$ въ 4-ю степень. Примѣняя теорему 1-ю, а затѣмъ 2-ю, получимъ:

$$(3a^2b^3)^4 = 3^4(a^2)^4(b^3)^4 = 81a^8b^{12}.$$

Правило. Чтобы возвысить въ степень одночленъ, достаточно возвысить въ эту степень его коэффициентъ и показатели буквъ умножить на показателя степени.

2) Дробныя выраженія возвышаются въ степень по теоремѣ 3-й, т.-е. числитель и знаменатель возвышаются отдѣльно; напр.:

$$\left(\frac{-3a^nb^2}{4cd^{r-1}}\right)^3 = \frac{(-3a^nb^2)^3}{(4cd^{r-1})^3} = \frac{-27a^{3n}b^6}{64c^3d^{3r-3}} = -\frac{27a^{3n}b^6}{64c^3d^{3r-3}}.$$

Возвышеніе въ квадратъ многочленовъ.

110. Теорема. Квадратъ многочлена равенъ квадрату 1-го члена + удвоенное произведеніе 1-го члена на 2-й + квадратъ 2-го чл. + удвоенное произведеніе суммы первыхъ двухъ членовъ на 3-й + квадратъ 3-го чл. + удвоенное произведеніе суммы первыхъ трехъ членовъ на 4-й + квадратъ 4-го члена и т. д.

$$\text{т.-е. } (a+b+c+d+\dots)^2 = a^2 + 2ab + b^2 + 2(a+b)c + c^2 + 2(a+b+c)d + d^2 + \dots$$

Для доказательства возьмемъ сначала двучленъ $a+b$ и возвысимъ его въ квадратъ (§ 62, II):

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Теперь приложимъ къ двучлену $a+b$ третій членъ c и возвысимъ въ квадратъ сумму $a+b+c$ слѣдующимъ образомъ:

$$(a+b+c)^2 = [(a+b)+c]^2 = (a+b)^2 + 2(a+b)c + c^2 = a^2 + 2ab + b^2 + 2(a+b)c + c^2,$$

т.-е. примемъ сумму двухъ первыхъ членовъ за одночленъ, возвысимъ въ квадратъ по формулѣ квадрата суммы двухъ чиселъ (одно $a+b$, другое c) и въ полученномъ результатѣ раскроемъ первыя скобки, а вторыя оставимъ.

Приложивъ затѣмъ четвертый членъ d , получимъ, подобно предыдущему (взявъ сумму первыхъ трехъ членовъ за одночленъ):

$$(a+b+c+d)^2 = [(a+b+c)+d]^2 = (a+b+c)^2 + 2(a+b+c)d + d^2 = a^2 + 2ab + b^2 + 2(a+b)c + c^2 + 2(a+b+c)d + d^2.$$

Продолжая такимъ образомъ прикладывать по одному члену, убѣдимся, что доказываемая теорема примѣнима къ многочлену съ какимъ угодно числомъ членовъ.

111. Другое выражение для квадрата многочлена. Раскрывъ скобки въ правой части послѣдняго равенства и измѣнивъ порядокъ членовъ, получимъ:

$$(a+b+c+d)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 2ab + 2ac + 2ad + 2bc + 2bd + 2cd,$$

что можно выразить такъ: квадратъ многочлена равенъ суммѣ квадратовъ всѣхъ его членовъ, сложенной съ удвоенными произведеніями: перваго члена на второй, перваго члена на третій, перваго члена на четвертый и т. д.; затѣмъ второго члена на третій, второго члена на четвертый и т. д.; затѣмъ третьяго члена на четвертый и т. д.; короче сказать:

квадратъ многочлена равенъ суммѣ квадратовъ всѣхъ его членовъ и удвоенныхъ произведеній каждаго члена на всѣ послѣдующіе.

112. Замѣчаніе о знакахъ. Многочленъ $a+b+c\dots$ представляетъ собою алгебраическую сумму; значитъ, члены его могутъ быть числами отрицательными. Въ этомъ случаѣ полезно замѣтить, что въ окончательномъ результатѣ положительными членами окажутся: 1) квадраты всѣхъ членовъ и 2) тѣ удвоенные произведенія, которыя произошли отъ умноженія двухъ положительныхъ или двухъ отрицательныхъ членовъ. Напримѣръ:
 $(3x^2 - 2x + 1)^2 = 9x^4 + 4x^2 + 1 - 2(3x^2)(2x) + 2(3x^2) \cdot 1 - 2(2x) \cdot 1 = 9x^4 + 4x^2 + 1 - 12x^3 + 6x^2 - 4x = 9x^4 - 12x^3 + 10x^2 - 4x + 1.$

113. Возвышеніе въ квадратъ цѣлыхъ чиселъ. Пользуясь формулою для квадрата многочлена, можно возвышать въ квадратъ всякое цѣлое число иначе, чѣмъ обыкновеннымъ умноженіемъ. Пусть, напр., требуется возвысить въ квадратъ число 238. Разложимъ это число на составляющіе его разряды:

$$238 = 200 + 30 + 8 = 2 \text{ сотни} + 3 \text{ дес.} + 8 \text{ ед.}$$

Теперь примѣнимъ теорему о квадратѣ многочлена (въ первомъ ея выраженіи):

$$238^2 = (2 \text{ сотни} + 3 \text{ дес.} + 8 \text{ ед.})^2 = (2 \text{ сотни})^2 + 2(2 \text{ сотни})(3 \text{ дес.}) + (3 \text{ дес.})^2 + 2(2 \text{ сотни} + 3 \text{ дес.})(8 \text{ ед.}) + (8 \text{ ед.})^2.$$

Чтобы удобнѣе вычислить эту сумму, примемъ во вниманіе, что квадратъ сотенъ составляетъ десятки тысячъ (напримѣръ, 2 сотни въ квадратѣ образуютъ 4 десятка тысячъ, такъ какъ $200 \cdot 200 = 40000$), произведеніе сотенъ на десятки составляетъ тысячи (напр., 2 сотни \times 3 дес. = 6 тысячъ), квадратъ десятковъ составляетъ сотни (напр., $(3 \text{ дес.})^2 = 9 \text{ сотенъ}$) и т. п. Поэтому вычисленіе всего удобнѣе расположить такъ:

$$\begin{array}{r} 238^2 = 4 \dots \dots \text{ дес. тысячъ (квадратъ 2 сотенъ)} \\ \quad 12 \dots \dots \text{ тысячъ (удвоен. произв. 2 сот. на 3 дес.)} \\ \quad \quad 9 \dots \dots \text{ сотенъ (квадратъ 3 дес.)} \\ \quad \quad \quad 368 \dots \dots \text{ десятковъ (удвоен. пр. 2 сот. + 3 дес. на 8)} \\ \quad \quad \quad \quad 64 \dots \dots \text{ единицъ (квадратъ 8 ед.)} \\ \hline 56644 \end{array}$$

т. е. пишутъ сначала квадратъ первой цифры; подъ нею, отступивъ на одно мѣсто вправо, пишутъ удвоенное произведеніе первой цифры на вторую; подъ этимъ, снова отступивъ на одно мѣсто вправо, ставятъ квадратъ второй цифры; далѣе — удвоенное произведеніе числа, изображеннаго первыми двумя цифрами, на третью цифру, затѣмъ квадратъ третьей цифры и т. д. Конечно, можно было бы дополнить эти числа надлежащимъ количествомъ нулей, т. е. писать такъ:

$$\begin{array}{r} 238^2 = 40000 \\ \quad 12000 \\ \quad \quad 900 \\ \quad \quad \quad 3680 \\ \quad \quad \quad \quad 64 \\ \hline 56644 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{но въ этомъ нѣтъ надобности, если} \\ \text{только правильно подписывать чис-} \\ \text{ла другъ подъ другомъ, отступая} \\ \text{каждый разъ на одно мѣсто} \\ \text{вправо.} \end{array}$$

Примѣры:

1) $78^2 = 49$	2) $309^2 = 9$	3) $5742^2 = 25$
$\begin{array}{r} 112 \\ \cdot 64 \\ \hline 6084 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0 \\ \cdot 0 \\ \hline 540 \\ \cdot 181 \\ \hline 95481 \end{array}$	$\begin{array}{r} 70 \\ \cdot 49 \\ \hline 456 \\ \cdot 16 \\ \hline 2296 \\ \cdot 1114 \\ \hline 32970564 \end{array}$

Упражнения.

Къ § 107.

434. $(-1)^2; (-1)^3; (-1)^4; (-1)^{13}; (-1)^{18}$. 435. $(-2)^3; (-2)^4; (-2)^5$.
 436. $(-a)^3; (-a)^6; (-a)^8$. 437. $-(-1)^2; -(-1)^3; [-(-1)^3]^2$

Къ 108.

438. I. $(mn)^2; (2xy)^3; \left(\frac{1}{2}axy\right)^4$. 439. II. $(a^3)^2; (-a^4)^3; (-a^3)^4; (x^m)^n$.
 440. $- \{ - [-(-a)^2]^3 \}^4$. 441. III. $\left(\frac{2}{3}\right)^2; \left(\frac{1}{4}\right)^3; \left(\frac{a}{b}\right)^5; \left(-\frac{x}{y}\right)^4; (0,3)^4$.

Къ § 109.

442. $(2a^3b^3c)^2$. 443. $\left(\frac{2}{3}a^4x^2\right)^3$. 444. $(0,2ab^3x^4)^3$. 445. $(-0,1x^my)^4$.
 446. $\left(\frac{3ax^3}{5b^2y}\right)^2$. 447. $\left(\frac{4a^2mn^3}{3bx^4}\right)^3$. 448. $\left(-\frac{2(a+b)x^5}{7a^3by^2}\right)^2$.

Къ §§ 110, 111, 112.

449. $(2a^2 - \frac{1}{2}a + 1)^2$. 450. $(\frac{1}{2}x^2 - 4x - 3)^2$.
 451. $(-5a^3x + 3a^2x^2 - ax^3 + 3x^4)^2$. 452. $(0,3x^3 - 0,1x^2 - \frac{3}{4}x + 0,5)^2$.
 453. $(\frac{3}{8}a^3b - 2\frac{2}{3}a^2b^2 + 2ab^3 - 0,3b^4)^2$.

Къ § 113.

454. $25^2; 17^2; 39^2$. 455. $236^2; 981^2; 809^2$. 456. $5637^2; 3027^2$.

Извлечение корня изъ одночлена.

114. Опредѣленіе. Корнемъ n -й степени изъ числа a называется такое число, n -ая степень котораго равна a .

Такъ, корень второй степени изъ 49 есть 7, потому что $7^2=49$; корень третьей степени изъ 125 есть 5, потому что $5^3=125$.

Дѣйствіе, посредствомъ котораго отыскивается корень изъ даннаго числа, наз. и з в л е ч е н і е м ъ к о р н я ; это дѣйствіе обратно возвышенію въ степень.

Извлечение корня обозначается знакомъ $\sqrt{\quad}$ (знакъ р а д и к а л а); подъ горизонтальной чертой его пишутъ число, корень изъ котораго отыскивается, а надъ отвер-
 стиємъ угла—показателя корня; такъ $\sqrt[3]{27}$ означаетъ, что

изъ 27 извлекается корень третьей степени. Показателя корня второй степени принято опускать; напр., $\sqrt{16}$ замѣняетъ обозначеніе $\sqrt[2]{16}$.

Корень второй степени наз. иначе к в а д р а т н ы м ъ, а третьей степени—к у б и ч н ы м ъ. Число, стоящее подъ знакомъ радикала, называютъ п о д к о р е н н ы м ъ ч и с л о м ъ.

Изъ опредѣленія корня слѣдуетъ, что $(\sqrt{a})^2=a$, $(\sqrt[3]{a})^3=a$ и вообще $(\sqrt[n]{a})^n=a$.

115. Правило знаковъ. Изъ условій, приня-
 тыхъ въ алгебрѣ относительно умноженія отрицательныхъ чиселъ, слѣдуетъ:

1) Корень нечетной степени изъ положительнаго числа есть положительное число, а изъ отрицательнаго числа—отрицательное; напр., $\sqrt[3]{8}=2$ и $\sqrt[3]{-8}=-2$, потому что $2^3=8$ и $(-2)^3=-8$.

2) Корень четной степени изъ положительнаго числа имѣетъ два значенія съ одинаковой абсолютной величиной, но съ разными знаками. Такъ, $\sqrt{4}=+2$ и $\sqrt{4}=-2$, по-
 тому что $(+2)^2=4$ и $(-2)^2=4$; также, $\sqrt[4]{81}=+3$ и -3 , по-
 тому что $(+3)^4=81$ и $(-3)^4=81$. Двойственное значеніе корня обозначается постановкою двухъ знаковъ передъ абсолютной величиной корня: $\sqrt[4]{81}=\pm 3$.

3) Корень четной степени изъ отрицательнаго числа не можетъ равняться никакому ни положительному, ни отрицательному числу, потому что всякое положительное или отрицательное число, будучи возвышено въ четную степень,

дасть положительное, а не отрицательное число. Напримѣръ $\sqrt{-9}$ не можетъ равняться ни $+3$, ни -3 и никакому иному числу.

Корень четной степени изъ отрицательнаго числа называется мнимымъ числомъ; въ противоположность такимъ числамъ числа обыкновенныя, цѣлыя и дробныя, положительныя и отрицательныя, наз. вещественными (или действительными) числами.

Всякій корень изъ положительнаго числа, а также и корень нечетной степени изъ отрицательнаго числа, выражается вещественнымъ числомъ.

Въ нашемъ изложеніи знакомъ $\sqrt{\quad}$ мы будемъ обозначать большею частью только арифметическое значеніе корня, т.-е. положительное значеніе корня изъ положительнаго числа.

116. Теоремы. 1) Чтобы извлечь корень изъ произведенія, достаточно извлечь его изъ каждаго сомножителя отдѣльно.

Требуется доказать, что $\sqrt[n]{abc} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} \sqrt[n]{c}$.

Для доказательства возвысимъ правую часть этого предполагаемаго равенства въ n -ую степень (чтобы возвысить произведеніе въ степень, достаточно...):

$$\left(\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} \sqrt[n]{c}\right)^n = \left(\sqrt[n]{a}\right)^n \left(\sqrt[n]{b}\right)^n \left(\sqrt[n]{c}\right)^n.$$

Но: $\left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a$, $\left(\sqrt[n]{b}\right)^n = b$ и $\left(\sqrt[n]{c}\right)^n = c$;

Значить: $\left(\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} \sqrt[n]{c}\right)^n = abc$.

Если же n -ая степень произведенія $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} \sqrt[n]{c}$ равна abc , то оно представляетъ собою корень n -ой степени изъ abc .

Примѣръ. $\sqrt[3]{512} = \sqrt[3]{8 \cdot 64} = \sqrt[3]{8} \sqrt[3]{64} = 2 \cdot 4 = 8$.

2) Чтобы извлечь корень изъ степени, показатель которой дѣлится безъ остатка на показателя корня, достаточно раздѣлить показателя степени на показателя корня.

Такъ $\sqrt[3]{a^6} = a^2$, потому что $(a^2)^3 = a^6$; точно такъ же $\sqrt[4]{a^{12}} = a^3$.

3) Чтобы извлечь корень изъ дроби, достаточно извлечь его изъ числителя и знаменателя отдѣльно.

Требуется доказать, что $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$.

Для доказательства возвысимъ правую часть этого предполагаемаго равенства въ n -ую степень (чтобы возвысить дробь въ степень, достаточно...):

$$\left(\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}\right)^n = \frac{\left(\sqrt[n]{a}\right)^n}{\left(\sqrt[n]{b}\right)^n} = \frac{a}{b},$$

что доказываетъ вѣрность предполагавшагося равенства.

Примѣръ: $\sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{16}} = \frac{3}{4}$.

117. Примѣненія. 1) Пусть требуется извлечь корень 3-й степени изъ одночлена $8a^9b^6c^{12}$. Примѣняя теорему 1-ую, а затѣмъ 2-ую, получимъ:

$$\sqrt[3]{8a^9b^6c^{12}} = \sqrt[3]{8} \sqrt[3]{a^9} \sqrt[3]{b^6} \sqrt[3]{c^{12}} = 2a^3b^2c^4.$$

Правило. Чтобы извлечь корень изъ одночлена, достаточно извлечь его изъ коэффициента и раздѣлить показатели буквъ на показателя корня, если это дѣленіе возможно нацѣло.

2) Чтобы извлечь корень из дробнаго выраженія, достаточно примѣнить теорему 3-ю, т.-е. извлечь корень из числителя и знаменателя отдѣльно; напр.

$$\sqrt[3]{\frac{27a^6x^{3n}}{m^9n^3}} = \frac{\sqrt[3]{27a^6x^{3n}}}{\sqrt[3]{m^9n^3}} = \frac{3a^2x^n}{m^3n}$$

118 и 119. Нѣкоторые преобразованія радикала. Доказанныя выше теоремы (§ 116) позволяют дѣлать слѣдующія преобразованія радикала:

1) **Вынесеніе множителей за знакъ радикала.** Когда показатели всѣхъ или нѣкоторыхъ буквъ въ подкоренномъ выраженіи больше показателя корня, но не дѣлятся на него безъ остатка, тогда можно разложить подкоренное выраженіе на множителей и извлечь корень изъ тѣхъ множителей, изъ которыхъ это возможно. Напр.:

- 1) $\sqrt{a^3} = \sqrt{a^2a} = \sqrt{a^2}\sqrt{a} = a\sqrt{a}$.
- 2) $\sqrt[3]{a^4} = \sqrt[3]{a^3a} = \sqrt[3]{a^3}\sqrt[3]{a} = a\sqrt[3]{a}$.
- 3) $\sqrt[5]{x^{13}} = \sqrt[5]{x^{10}x^3} = \sqrt[5]{x^{10}}\sqrt[5]{x^3} = x^2\sqrt[5]{x^3}$.
- 4) $\sqrt{24a^4x^3} = \sqrt{4a^4x^2 \cdot 6x} = 2a^2x\sqrt{6x}$.

2) **Подведеніе множителей подъ знакъ радикала.** Иногда бываетъ полезно, наоборотъ, подвести подъ знакъ радикала множителя, стоящаго передъ нимъ; для этого надо возвысить его въ степень, показатель которой равенъ показателю радикала, и написать множителемъ подъ радикаломъ. Напр.:

- 1) $a^2\sqrt{a} = \sqrt{(a^2)^2a} = \sqrt{a^4a} = \sqrt{a^5}$.
- 2) $3x^2y\sqrt[3]{xy} = \sqrt[3]{(3x^2y)^3xy} = \sqrt[3]{27x^7y^4}$.

3) **Освобожденіе подкореннаго выраженія отъ знаменателей.** Покажемъ, какъ можно это выполнить на слѣдующихъ примѣрахъ:

1) $\sqrt{\frac{3}{2ax^3}}$. Сдѣлаемъ знаменателя квадратомъ. Для этого достаточно умножить его на 2, на a и на x , т.-е. на $2ax$. Чтобы дробь не измѣнила своей величины, умножимъ и числителя на $2ax$:

$$\sqrt{\frac{3}{2ax^3}} = \sqrt{\frac{6ax}{4a^2x^4}} = \frac{\sqrt{6ax}}{\sqrt{4a^2x^4}} = \frac{1}{2ax^2}\sqrt{6ax}$$

2) $\sqrt[3]{2a + \frac{1}{4x} - \frac{1}{x^2}}$. Сначала приведемъ всѣ члены многочлена къ общему знаменателю:

$$\sqrt[3]{2a + \frac{1}{4x} - \frac{1}{x^2}} = \sqrt[3]{\frac{8ax^2 + x - 20}{4x^2}}$$

Теперь сдѣлаемъ знаменателя кубомъ, умноживъ его (и числителя) на $2x$:

$$\sqrt[3]{\frac{(8ax^2 + x - 20)2x}{8x^3}} = \frac{\sqrt[3]{16ax^3 + 2x^2 - 40x}}{\sqrt[3]{8x^3}} = \frac{\sqrt[3]{16ax^3 + 2x^2 - 40x}}{2x} = \frac{1}{2x}\sqrt[3]{16ax^3 + 2x^2 - 40x}$$

Упражненія.

Къ § 115.

457. I. $\sqrt[3]{-27}$; $\sqrt[3]{+27}$; $\sqrt[3]{\frac{1}{8}}$; $\sqrt[3]{\frac{1}{-8}}$; $\sqrt[3]{0,001}$; $\sqrt[3]{-0,001}$.
458. II. $\sqrt{9}$; $\sqrt{\frac{1}{4}}$; $\sqrt{0,01}$; $\sqrt{25}$; $\sqrt{100}$; $\sqrt[4]{16}$; $\sqrt[4]{\frac{1}{16}}$; $\sqrt[4]{81}$.
459. III. $\sqrt{-4}$; $\sqrt{-25}$; $\sqrt{-a^2}$; $\sqrt[4]{-16}$.

Къ § 116.

- I. 460. $\sqrt{4,9}$. 461. $\sqrt{\frac{1}{4} \cdot 0,01 \cdot 25}$. 462. $\sqrt{4ab}$. 463. $\sqrt{9a^2x^2y}$.
464. $\sqrt[3]{-27a^3bc}$. 465. $\sqrt[4]{\frac{1}{16}ax}$. 466. $\sqrt[5]{abcd}$.

II. 467. $\sqrt{a^4}$; $\sqrt{2^4}$; $\sqrt{x^6}$; $\sqrt{(a+b^8)}$. 468. $\sqrt[3]{2^6}$; $\sqrt[3]{-a^6}$; $\sqrt[3]{x^{12}}$; $\sqrt[3]{(m+n)^9}$.
 469. $\sqrt[3]{a^{3m}}$; $\sqrt[5]{x^{10}}$; 470. $\sqrt[5]{x^{25m}}$; $\sqrt[3]{a^{3m}}$.
 III. 471. $\sqrt{\frac{9}{25}}$. 472. $\sqrt{-\frac{9}{25}}$. 473. $\sqrt{\frac{a^2}{b^4}}$. 474. $\sqrt{\frac{a+b}{m-n}}$.
 475. $\sqrt[3]{\frac{8}{125}}$. 476. $\sqrt[3]{-0,027}$. 477. $\sqrt[3]{\frac{a^6}{b^3}}$. 478. $\sqrt[3]{\frac{x}{y^3}}$. 479. $\sqrt{\frac{x}{y}}$.
 480. $\sqrt{\frac{a^{2n}}{b}}$. 481. $\sqrt[n]{\frac{a^{3n}}{b^{4n}}}$.

Къ § 117.

482. $\sqrt{25a^6b^2c^{12}}$. 483. $\sqrt{0,36x^4y^2z^{2m}}$. 484. $\sqrt[3]{\frac{1}{8}a^9(b+c)^9}$.
 485. $\sqrt[3]{-0,001x^{12}y^3}$. 486. $\sqrt[3]{125(a+b)^6(c+d)^3}$. 487. $\sqrt{\frac{9a^2b^4}{25x^6y^2}}$.
 488. $\sqrt{\frac{0,01a^4b^6c^2}{49m^{16}n^2p}}$. 489. $\sqrt[3]{\frac{27a^9b^6}{x^3y^{12}}}$. 490. $\sqrt{\frac{8(a+b)^6c^3}{x^{12}}}$.

Къ § 118.

491. $\sqrt{4a^3}$. 492. $\sqrt{8a^{12}b^9}$. 493. $\sqrt{50a^7b^3x^5}$. 494. $\sqrt[3]{16a^4}$.
 495. $\sqrt[3]{-81x^5y^2}$.
 496. $\sqrt{98(a+b)^3x}$. 497. $\sqrt[3]{(m-n)^5x^4y^7}$.
 498. $2\sqrt{2}$. 499. $3\sqrt{\frac{1}{3}}$. 500. $a\sqrt{a}$. 501. $2ab\sqrt{\frac{1}{2}}$. 502. $\frac{1}{2}\sqrt[3]{4a}$.
 503. $2a^2b\sqrt[3]{3ab^2}$. 504. $(a+b)\sqrt{a+b}$. 505. $2(x-y)^2\sqrt{\frac{1}{2}a^3(x-y)}$.

Извлечение квадратнаго корня изъ чиселъ.

Извлечение корня изъ наибольшаго цѣлаго квадрата, заключающагося въ данномъ цѣломъ числѣ.

120. Предварительныя замѣчанія. 1) Если станемъ возвышать въ квадратъ числа натурального ряда: 1, 2, 3, 4..., то получимъ безконечный рядъ возрастающихъ квадратовъ:

$$1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100...$$

Очевидно, что всякое цѣлое число, не находящееся въ этомъ ряду (напр., 40), не можетъ быть квадратомъ цѣлаго числа.

Пусть намъ дано какое-нибудь цѣлое число, напр., 4082, и требуется изъ него извлечь квадратный корень. Мы не знаемъ, находится ли это число въ рядѣ квадратовъ цѣлыхъ чиселъ, и потому заранѣе не знаемъ, можно ли изъ него извлечь цѣлый корень. Въ такихъ случаяхъ условимся, что извлечь квадратный корень изъ даннаго числа значить: извлечь этотъ корень или изъ самаго числа (если оно окажется квадратомъ цѣлаго числа), или же изъ наибольшаго квадрата цѣлаго числа, какой заключается въ данномъ числѣ.

2) Когда данное число болѣе 100, то квадратный корень изъ него болѣе (или равенъ) 10 и, слѣдов., состоитъ изъ двухъ или болѣе цифръ. Сколько бы цифръ въ немъ не было, условимся разсматривать его, какъ сумму только десятковъ и единицъ; если, напр., корень будетъ число 358, то мы будемъ его представлять такъ: 35 десятковъ + 8 ед.

121. Свойство числа десятковъ корня.

Пусть требуется извлечь кв. корень изъ какого-нибудь числа, большаго 100, напр., изъ числа 4082. Обозначимъ число десятковъ корня черезъ x (все равно, будетъ ли оно однозначное или многозначное), а число его единицъ черезъ y . Такъ какъ въ каждомъ десяткѣ содержится 10 ед., то искомый корень выразится $10x + y$. Квадратъ этой суммы долженъ быть наибольшимъ квадратомъ цѣлаго числа, заключающимся въ 4082; въ этомъ числѣ можетъ быть еще нѣкоторый избытокъ надъ наиб. квадратомъ, который назовемъ остаткомъ отъ извлечения корня; поэтому можно написать:

$$4082 = (10x + y)^2 + \text{ост.} = 100x^2 + 2xy10 + y^2 + \text{ост.}$$

Чтобы найти число x , возьмемъ изъ обѣихъ частей этого уравненія только однѣ сотни. Въ лѣвой части сотенъ заключается 40. Посмотримъ, сколько ихъ будетъ въ правой части. Въ первомъ членѣ ($100x^2$), очевидно, сотенъ, заключается x^2 ; въ суммѣ остальныхъ трехъ членовъ сотни могутъ быть, но могутъ и не быть (что зависитъ отъ величины чиселъ x и y и остатка отъ извлеченія); значитъ, мы можемъ только утверждать, что въ правой части уравненія всѣхъ сотенъ будетъ или x^2 , или больше x^2 . Такъ какъ число сотенъ въ лѣвой части уравненія должно равняться числу сотенъ въ правой, то

$$40 \geq x^2 \text{ и, слѣд., } x^2 \leq 40.$$

Изъ этого слѣдуетъ, что x^2 есть такой квадратъ цѣлаго числа, который содержится въ 40; но такихъ квадратовъ есть нѣсколько, а именно: 36, 25, 16 и т. д. Докажемъ, что за x^2 надо принять наибольшій изъ этихъ квадратовъ, т.-е. 36. Дѣйствительно, если бы мы взяли за x^2 , положимъ, 25, то искомый корень содержалъ бы въ себѣ 5 десятковъ съ нѣсколькими единицами; но число, состоящее изъ 5 десятковъ съ единицами (хотя бы этихъ единицъ было и 9), меньше 6 десятковъ ($59 < 60$); между тѣмъ квадратъ 6 десятковъ составляетъ только 36 сотенъ ($60^2 = 3600$), что меньше 4082, а такъ какъ мы ищемъ квадратный корень изъ наибольшаго квадрата цѣлаго числа, какой только заключается въ 4082, то не можемъ взять для корня 5 десятковъ съ единицами, когда и 6-и десятковъ оказывается немного. Если же за x^2 надо взять число 36, то $x = \sqrt{36} = 6$.

Такимъ образомъ, число десятковъ искомага корня равно квадратному корню изъ наибольшаго цѣлаго квадрата, заключающагося въ числѣ сотенъ даннаго числа.

Когда данное число, какъ взятое нами, менѣе 10000, тогда число сотенъ въ немъ менѣе 100; въ этомъ случаѣ десятки корня находятся по таблицѣ умноженія.

122. Свойство числа единицъ корня. Положимъ, что мы нашли десятки корня; тогда мы можемъ вычислить квадратъ десятковъ, т.-е. членъ $100x^2$; для нашего примѣра $x=6$ и $100x^2$ составитъ 3600. Вычтемъ это число изъ 4082:

$$\begin{array}{r} 4082 \\ -3600 \\ \hline 482 \end{array}$$

Для этого достаточно изъ 40 сотенъ вычесть 36 сотенъ и къ остатку снести цифры 82. Получившееся число 482 назовемъ первымъ

остаткомъ. Въ немъ заключаются: удвоенное произведение десятковъ корня на его единицы, квадратъ единицъ и остатокъ отъ извлеченія, если онъ есть, т.-е.

$$482 = 2xy10 + y^2 + \text{ост.}$$

Чтобы найти y , возьмемъ изъ обѣихъ частей этого уравненія только одни десятки. Въ лѣвой части ихъ 48, а въ правой $2xy$ или больше (если въ суммѣ $y^2 + \text{ост.}$ окажутся десятки); поэтому:

$$48 \geq 2xy; \text{ слѣд., } 2xy \leq 48; \text{ поэтому } y \leq \frac{48}{2x}.$$

Такимъ образомъ, число единицъ корня или равно цѣлому частному отъ дѣленія числа десятковъ перваго остатка на удвоенное число десятковъ корня, или меньше этого частного.

Пользуясь этимъ свойствомъ, мы можемъ найти единицы корня, если его десятки уже найдены. Такъ, въ нашемъ примѣрѣ, подставивъ на мѣсто x найденное прежде число 6, найдемъ, что $y \leq 4$. Отсюда слѣдуетъ, что y равенъ или 4, или 3, или 2, или 1, или 0. Здѣсь мы не можемъ утверждать заранее, что y равняется наибольшему изъ этихъ чиселъ; это иногда бываетъ, а иногда и нѣтъ. Чтобы узнать окончательно, какому изъ этихъ чиселъ равняется y , станемъ испытывать эти цифры, начиная съ болѣе, т.-е. съ 4. Для этого вычислимъ сумму $2xy10 + y^2$ и сравнимъ

полученное число съ 482; если эта сумма дастъ число, ббльшее 482, то испытуемая цифра не годится; тогда под-
вергнемъ испытанію слбдующую меньшую цифру.

Вычислить сумму $2xy10+y^2$ всего проще можно такъ:
 $2xy10+y^2=(2x10+y)y=(2.6.10+4)4=(120+4)4=124.4=496$,
т.-е. чтобы получить сразу сумму удвоеннаго произведенія
десятковъ на единицы и квадрата единицъ, слбдуетъ къ
удвоенному числу десятковъ (къ 12) приписать справа
цифру единицъ (4) и на эту же цифру умножить получив-
шееся число.

Такъ какъ $496 > 482$, то цифра 4 не годится; надо испытать
цифру 3 подобнымъ же способомъ: $123 \cdot 3 = 369$. Такъ какъ
 $369 < 482$, то цифра 3 годится. Искомый корень есть 63.

Вычтя 369 изъ 482, получимъ окончательный остатокъ
отъ извлеченія корня: $482 - 369 = 113$, такъ что можемъ
написать:

$$4082 = 63^2 + 113.$$

123. Извлеченіе квадратнаго корня, состоя-
щаго изъ одной или изъ двухъ цифръ. Если
данное число меньше 100, то квадратный корень изъ него
выражается одною цифрою и тогда его легко найти по та-
блицѣ умноженія.

Если же данное число, напр. 4082, болѣе 100, но менѣе
10000, то корень изъ него болѣе (или равенъ) 10 и менѣе 100;
слбдовательно, онъ выражается двумя цифрами. Согласно
сказанному въ предыдущихъ параграфахъ цифры эти всего
удобнѣе находить такимъ образомъ:

$$\sqrt{40'82} = 63$$

$$\begin{array}{r} 36 \\ 123 \overline{)48'2} \\ \underline{336} \\ 113 \end{array}$$

Отдѣливъ въ подкоренномъ числѣ сотни,
извлекаютъ квадратный корень изъ наи-
большаго цблага квадрата, заключающа-
гося въ числѣ ихъ; найденное число (6)

пишутъ въ корнѣ на мѣстѣ десятковъ. Вычитаютъ
квадратъ десятковъ корня (36) изъ сотенъ даннаго числа
и къ остатку отъ сотенъ сносятъ двѣ остальные
цифры. Налѣво отъ остатка проводятъ вертикальную
черту, за которою пишутъ удвоенное число десятковъ
корня (12). Отдѣливъ въ остаткѣ десятки, дѣлятъ число
ихъ на удвоенное число десятковъ корня, т. е. на число,
поставленное раньше налѣво отъ вертикальной черты.
Цѣлое число, получившееся отъ этого дѣленія, подвергаютъ
испытанію. Для этого приписываютъ его справа къ удвоен-
ному числу десятковъ (за вертикальной чертой) и на него же
умножаютъ получившееся отъ этого число (124 умн. на 4).
Если произведеніе окажется больше остатка, то испытуемая
цифра не годится; тогда подвергаютъ испытанію слбдующую
меньшую цифру (123 умн. на 3). Получивъ произведеніе,
не ббльшее остатка, подписываютъ его подъ остаткомъ
и вычитаютъ, а испытуемую цифру пишутъ къ корнѣ на
мѣстѣ единицъ.

124. Извлеченіе квадратнаго корня, со-
стоящаго изъ трехъ или болѣе цифръ. Пусть
требуется извлечь квадратный корень изъ числа, ббль-
шаго 10000, напр., изъ 35782. Квадратный корень изъ
такого числа болѣе (или равенъ) 100 и потому состоитъ
изъ 3 или болѣе цифръ. Изъ сколькихъ бы цифръ онъ ни
состоялъ, будемъ его разсматривать, какъ состоящій только
изъ двухъ частей: изъ десятковъ и изъ единицъ и восполь-
зуемся доказанными выше свойствами числа десятковъ
корня и числа его единицъ. Число десятковъ корня, какъ
мы видѣли (§ 121), равно квадратному корню изъ наи-
большаго цблага квадрата, заключающагося въ числѣ
сотенъ, т.-е. въ 357; значитъ, прежде всего надо извлечь
квадратный корень изъ этого числа. Такъ какъ число 357

имѣть только три цифры, то этотъ корень найдется по предыдущему:

$$\begin{array}{r} \sqrt{3'57} = 18 \\ 1 \\ 28 \overline{)25'7} \\ 8 \overline{)22\ 4} \\ \underline{\quad\quad} \\ 3\ 3 \end{array}$$

Значитъ, въ искомомъ корнѣ изъ 35782 заключается 18 десятковъ. Чтобы найти его единицы, надо, согласно доказанному прежде (§ 122), предварительно изъ 35782 вычесть квадратъ 18 десятковъ, для чего достаточно изъ 357 вычесть квадратъ 18 и къ остатку снести цифры 82. Остатокъ отъ вычитанія квадрата 18 изъ 357 у насъ уже есть: это 33. Значитъ, для полученія остатка отъ вычитанія квадрата 18 десятковъ изъ 35782, достаточно къ 33 приписать справа цифры 82. Дѣйствіе мы можемъ продолжать тамъ же, гдѣ находили $\sqrt{357}$:

$$\begin{array}{r} \sqrt{3'57'82} = 189 \\ 1 \\ 28 \overline{)25'7} \\ 8 \overline{)22\ 4} \\ 369 \overline{)338'2} \\ 9 \overline{)332\ 1} \\ \underline{\quad\quad} \\ 6\ 1 \end{array}$$

Отдѣливъ десятки въ остаткѣ 3382, дѣлимъ, согласно доказанному, число ихъ (338) на удвоенное число десятковъ корня (на 36); цифру (9), полученную отъ дѣленія, подвергаемъ испытанію, для чего ее приписываемъ справа къ удвоенному числу десятковъ корня (къ 36) и на нее умножаемъ получившееся число (369 на 9). Такъ какъ произведеніе оказалось меньше второго остатка, то цифра 9 годится; ее пишемъ въ корнѣ на мѣстѣ единицъ.

Вообще, чтобы извлечь квадр. корень изъ какого угодно числа, надо сначала извлечь корень изъ числа его сотенъ; если это число болѣе 100, то придется искать корень изъ числа сотенъ этихъ сотенъ, т.-е. изъ десятковъ тысячъ даннаго числа; если и это число болѣе 100, придется извлекать корень изъ числа сотенъ десятковъ тысячъ, т.-е. изъ миллионовъ даннаго числа и т. д.

Правило. Чтобы извлечь квадратный корень изъ даннаго цѣлаго числа, разбиваютъ его, отъ правой руки къ

лѣвой, на грани по 2 цифры въ каждой, кромѣ послѣдней, въ которой можетъ быть и одна цифра. Чтобы найти первую цифру корня, извлекаютъ квадратный корень изъ первой грани. Чтобы найти вторую цифру, изъ первой грани вычитаютъ квадратъ первой цифры корня, къ остатку сносятъ вторую грань и число десятковъ получившагося числа дѣлятъ на удвоенную первую цифру корня; полученное цѣлое число подвергаютъ испытанію. Слѣдующія цифры корня находятся по тому же приему.

Если послѣ снесенія грани число десятковъ получившагося числа окажется меньше дѣлителя, т.-е. меньше удвоенной найденной части корня, то въ корнѣ ставятъ 0, сносятъ слѣдующую грань и продолжаютъ дѣйствіе дальше.

Вотъ примѣры извлеченія квадр. корня изъ чиселъ, состоящихъ изъ многихъ граней:

$$\sqrt{3'50'34'87'59} = 18717 \quad \sqrt{9'51'10'56} = 3084 \quad \sqrt{8'72'00'00} = 2952$$

1	9	4
28 $\overline{)25'0}$	608 $\overline{)511'0}$	49 $\overline{)47'2}$
8 $\overline{)22\ 4}$	8 $\overline{)486\ 4}$	9 $\overline{)44\ 1}$
367 $\overline{)263'4}$	6164 $\overline{)2465'6}$	585 $\overline{)310'0}$
7 $\overline{)256\ 9}$	4 $\overline{)2465\ 6}$	5 $\overline{)292\ 5}$
3741 $\overline{)658'7}$	0	5902 $\overline{)1750'0}$
1 $\overline{)374\ 1}$		1180 $\overline{)4}$
37427 $\overline{)28465'9}$		569 $\overline{)6}$
7 $\overline{)26198\ 9}$		
2267 $\overline{)0}$		

125. Число цифръ въ корнѣ. Изъ рассмотрѣнія процесса нахождения корня слѣдуетъ, что въ квадратномъ корнѣ столько цифръ, сколько въ подкоренномъ числѣ заключается граней по 2 цифры каждая, кромѣ одной, которая можетъ имѣть и 2, и 1 цифру.

Извлечение приближенныхъ квадратныхъ корней.

126. Теорема 1. Если цѣлое число N не есть квадратъ другого цѣлаго числа, то оно не можетъ быть и квадратомъ дроби.

Предположимъ противное: пусть какая-нибудь несократимая дробь $\frac{a}{b}$, будучи возвышена въ квадратъ, даетъ число N , т.-е.

$$N = \left(\frac{a}{b}\right)^2 \text{ откуда: } N = \frac{a^2}{b^2}.$$

Последнее равенство возможно только тогда, когда a^2 дѣлится на b^2 ; но этого не можетъ быть, такъ какъ числа a и b не имѣютъ общихъ множителей. Слѣд., число N не можетъ быть квадратомъ дроби.

Теорема 2. Если числитель или знаменатель несократимой арифметической дроби $\frac{a}{b}$ не представляетъ собою квадратовъ цѣлыхъ чиселъ, то такая дробь не можетъ быть ни квадратомъ цѣлаго, ни квадратомъ дробнаго числа.

Дробь не можетъ быть квадратомъ цѣлаго числа, потому что цѣлое число въ квадратѣ даетъ тоже цѣлое число, а не дробное. Предположимъ, что $\frac{a}{b}$ есть квадратъ другой дроби, которая, по сокращеніи, пусть будетъ $\frac{p}{q}$. Тогда

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 = \frac{a}{b}, \text{ т.-е. } \frac{p^2}{q^2} = \frac{a}{b}.$$

Но двѣ несократимыя дроби могутъ равняться другъ другу только тогда, когда ихъ числители равны между собою и знаменатели равны между собою. Поэтому изъ написаннаго выше равенства выводимъ:

$$p^2 = a \text{ и } q^2 = b.$$

Но этого быть не можетъ, такъ какъ по условію a или b не суть квадраты. Значитъ, нельзя допустить, чтобы данная дробь была квадратомъ другой дроби.

Числа, изъ которыхъ квадратный корень можетъ быть выраженъ цѣлымъ или дробнымъ числомъ, наз. точными квадратами. Изъ остальныхъ чиселъ можно извлекать только приближенные квадратные корни.

127. Определенія. 1) Приближеннымъ квадратнымъ корнемъ изъ даннаго числа съ точностью до 1 наз. каждое изъ двухъ такихъ цѣлыхъ чиселъ, которыя различаются одно отъ другого на 1 и между квадратами которыхъ заключается данное число; меньшее изъ этихъ чиселъ наз. приближеннымъ корнемъ съ недостаткомъ, а большее—приближеннымъ корнемъ съ избыткомъ.

Напр., приближенный квадратный корень изъ $56\frac{1}{2}$ съ точностью до 1 есть каждое изъ чиселъ 7 и 8, потому что эти цѣлыя числа различаются на 1, и между квадратами ихъ заключается $56\frac{1}{2}$, такъ какъ $7^2 = 49$, а $8^2 = 64$ и, слѣд.:
 $7^2 < 56\frac{1}{2} < 8^2$.

2) Приближеннымъ квадратнымъ корнемъ изъ даннаго числа съ точностью до $\frac{1}{n}$ наз. каждая изъ двухъ такихъ дробей съ знаменателемъ n , которыя различаются одна отъ другой на $\frac{1}{n}$ и между квадратами которыхъ заключается данное число; меньшая изъ этихъ дробей наз. приближеннымъ корнемъ съ недостаткомъ, а большая—приближеннымъ корнемъ съ избыткомъ.

Напр., приближенный квадратный корень изъ 27,5 съ точностью до $\frac{1}{10}$ есть каждая изъ дробей 5,2 и 5,3, потому что эти дроби, имѣя знаменателя 10, различаются на $\frac{1}{10}$, и между квадратами ихъ заключается число 27,5, такъ какъ $5,2^2 = 27,04$ и $5,3^2 = 28,09$ и, слѣд.:

$$5,2^2 < 27,5 < 5,3^2.$$

128. Правило 1. Чтобы извлечь изъ даннаго числа приближенный квадратный корень съ недостаткомъ съ

точностью до 1, извлекают квадратный корень из наибольшего цѣлаго квадрата, заключающагося въ цѣлой части даннаго числа.

Пусть, напр., требуется найти прил. квадратный корень съ точностью до 1 изъ $150^{3/7}$. Для этого извлечем квадр. корень изъ наиб. цѣлаго квадрата, заключающагося въ 150; это будетъ 12. Значитъ, $12^2 < 150 < 13^2$. Разъяснимъ, что это двойное неравенство не нарушится, если къ числу 150 прибавимъ дробь $3/7$. Дѣйствительно, если $12^2 < 150$, то и подавно $12^2 < 150^{3/7}$. Съ другой стороны, такъ какъ 150 и 13^2 числа цѣлыя и $150 < 13^2$, то значитъ, къ 150-ти надо добавить нѣкоторое цѣлое число (по меньшей мѣрѣ единицу), чтобы получить 13^2 ; слѣд., если прибавимъ къ 150 дробь $3/7$, которая меньше 1, то число $150^{3/7}$ останется все-таки меньшимъ, чѣмъ 13^2 . Итакъ, $12^2 < 150^{3/7} < 13^2$. Отсюда слѣдуетъ, что каждое изъ чиселъ 12 и 13 есть приближенный квадратн. корень изъ $150^{3/7}$ съ точностью до 1, при чемъ 12 есть приближенный корень съ недостаткомъ, а 13—прил. корень съ избыткомъ.

Примѣры.

1) $\sqrt{5}=2$ или 3; 2) $\sqrt{5,375}=2$ или 3;

3) $\sqrt{\frac{487}{13}}=\sqrt{37\frac{6}{13}}=6$ или 7; 4) $\sqrt{\frac{5}{6}}=0$ или 1.

129. Правило 2. Чтобы извлечь изъ даннаго числа приближенный квадратный корень съ недостаткомъ съ точностью до $1/n$, умножаютъ данное число на n^2 , изъ полученнаго произведенія извлекаютъ квадратный корень съ недостаткомъ съ точностью до 1 и дѣлятъ его на n .

Пусть, напр., требуется найти приближенный квадратный корень изъ 5 съ точностью $1/10$. Это значитъ, что требуется найти двѣ такія дроби съ знаменателемъ 10, которыя разнятся другъ отъ друга на $1/10$ и между квадратами

которыхъ заключастся 5. Пусть искомыя дроби будутъ $x/10$ и $x+1/10$. Тогда, согласно опредѣленію:

$$\left(\frac{x}{10}\right)^2 < 5 < \left(\frac{x+1}{10}\right)^2; \text{ или } \frac{x^2}{10^2} < 5 < \frac{(x+1)^2}{10^2}.$$

Умноживъ всё члены этого двойного неравенства на 10^2 , мы не измѣнимъ его смысла, т.е. меньшее останется меньшимъ; поэтому:

$$x^2 < 5 \cdot 10^2 < (x+1)^2.$$

Такимъ образомъ, мы видимъ, что произведеніе $5 \cdot 10^2$ заключается между квадратами двухъ цѣлыхъ чиселъ: x и $x+1$, отличающихся другъ отъ друга на 1. Значитъ, x и $x+1$ суть приближенные квадратные корни съ точностью до 1 изъ произведенія $5 \cdot 10^2$. Найдя эти корни (22 и 23) такъ, какъ было показано раньше, получимъ числителей дробей $x/10$ и $x+1/10$, а раздѣливъ ихъ на 10, найдемъ и самыя дроби (2,2 и 2,3). Дробь $x/10$ будетъ приближеннымъ корнемъ съ недостаткомъ, а дробь $x+1/10$ —съ избыткомъ.

Примѣры: 1) Найти $\sqrt{72}$ съ точностью до $1/7$.

$$72 \cdot 7^2 = 72 \cdot 49 = 3528$$

$$\sqrt{3528} = 59 \text{ (до 1); } \sqrt{72} = \frac{59}{7} \text{ (до } \frac{1}{7}\text{)}.$$

2) Найти $\sqrt{2}$ до сотыхъ долей:

$$2 \cdot 100^2 = 20000; \sqrt{20000} = 141 \text{ (до 1); } \sqrt{2} = 1,41 \text{ (до } \frac{1}{100}\text{)}.$$

3) Найти $\sqrt[3]{7}$ съ приближеніемъ до $1/1000$:

$$\frac{3}{7} \cdot 1000^2 = \frac{3000000}{7} = 428571\frac{3}{7}; \sqrt[3]{428571} = 654; \sqrt[3]{\frac{3}{7}} = 0,654.$$

4) Найти $\sqrt{0,3}$ до $1/100$:

$$0,3 \cdot 100^2 = 3000; \sqrt{3000} = 54; \sqrt{0,3} = 0,54 \text{ (до } \frac{1}{100}\text{)}.$$

5) Найти $\sqrt{0,38472}$ до $1/10$:

$$0,38472 \cdot 10^2 = 38,472; \sqrt{38} = 6; \sqrt{0,38472} = 0,6.$$

6) Найти $\sqrt{465}$ съ какимъ-нибудь десятичнымъ приближеніемъ:

$$\sqrt{465} = 21,56$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 41 \overline{) 65} \\ \underline{141} \\ 425 \overline{) 2400} \\ \underline{52125} \\ 4306 \overline{) 27500} \\ \underline{625836} \\ 1664 \end{array}$$

Сначала извлекаемъ корень съ точностью до 1; получаемъ 21. Чтобы пайти цифру десятыхъ (иначе сказать, чтобы пайти приближ. корень до $\frac{1}{10}$), надо было бы умножить 465 на 10^2 , т.-е. приписать къ 465 два нуля. Очевидно, это все равно, что приписать къ остатку два нуля. Найдя цифру десятыхъ, можемъ снова приписать къ остатку 2 нуля и искать цифру сотыхъ и т. д.

Извлечение квадратныхъ корней изъ дробей.

130. Точный квадратный корень изъ несократимой дроби можно извлечь лишь въ томъ случаѣ, когда оба члена дроби суть точные квадраты (§ 126, теор. 2). Въ этомъ случаѣ достаточно извлечь корень изъ числителя и знаменателя отдѣльно; напр.:

$$\sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{16}} = \frac{3}{4}$$

Приближенные квадратные корни изъ дробей находятся обыкновенно такъ, какъ указано въ предыдущемъ параграфѣ (см. примѣры 3, 4, 5). Впрочемъ, можно поступать и иначе. Объяснимъ это на слѣдующихъ двухъ примѣрахъ:

1) Найти приближенное значеніе $\sqrt{\frac{5}{24}}$.

Сдѣлаемъ знаменателя точнымъ квадратомъ. Для этого достаточно было бы умножить, оба члена дроби на зна-

менателя; но въ этомъ примѣрѣ можно поступить проще. Разложимъ знаменателя на простыхъ множителей: $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$. Изъ этого разложенія видно, что, если 24 умножить на 2 и еще на 3, то тогда въ произведеніи каждый простой множитель будетъ повторяться ч е т н о е число разъ, и, слѣд., знаменатель сдѣлается квадратомъ:

$$\sqrt{\frac{5}{24}} = \sqrt{\frac{5}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3}} = \sqrt{\frac{5 \cdot 2 \cdot 3}{2^4 \cdot 3^2}} = \frac{\sqrt{30}}{2^2 \cdot 3} = \frac{\sqrt{30}}{12}$$

Остается вычислить $\sqrt{30}$ съ какою-нибудь точностью и результатъ раздѣлить на 12. При этомъ надо имѣть въ виду, что отъ дѣленія на 12 уменьшится и дробь $\frac{1}{n}$, показывающая степень точности. Такъ, если пайдемъ $\sqrt{30}$ съ точностью до $\frac{1}{10}$ и результатъ раздѣлимъ на 12, то получимъ приближенный корень изъ дроби $\frac{5}{24}$ съ точностью до $\frac{1}{120}$ (а именно $\frac{5^4}{120}$ и $\frac{5^5}{120}$).

2) Найти приближенное значеніе $\sqrt{0,378}$.

$$\sqrt{0,378} = \sqrt{\frac{378}{1000}} = \sqrt{\frac{3780}{10000}} = \frac{\sqrt{3780}}{100} = \frac{61}{100} \text{ и } \frac{62}{100} \left(\text{до } \frac{1}{100} \right)$$

Упражненія.

Къ §§ 123 и 124.

506. $\sqrt{4225}$. 507. $\sqrt{289}$. 508. $\sqrt{61009}$. 509. $\sqrt{582169}$;
510. $\sqrt{956484}$. 511. $\sqrt{57198969}$. 512. $\sqrt{68492176}$.
513. $\sqrt{285970396644}$. 514. $\sqrt{48303584206084}$.

Къ §§ 128 и 129.

515. $\sqrt{13}$ до 1; 516. $\sqrt{13}$ до 0,1; 517. $\sqrt{13}$ до 0,001.
518. $\sqrt{37,26}$ до 1; 519. $\sqrt{234^5/6}$ до 1; 520. $\sqrt{101}$ до $\frac{1}{100}$.
521. $\sqrt{0,8}$ до $\frac{1}{100}$. 522. $\sqrt[8]{9}$ до $\frac{1}{1000}$. 523. $\sqrt[3]{\frac{1}{4}}$ до $\frac{1}{100}$.
524. $\sqrt{0,2567803}$ до $\frac{1}{10}$, затѣмъ до $\frac{1}{100}$. 525. $\sqrt{\frac{237}{14}}$ до $\frac{1}{100}$.
526. $\sqrt{356}$ сначала до 1, затѣмъ до $\frac{1}{10}$, далѣе до $\frac{1}{100}$ и т. д.

Къ § 130.

Сдѣлать знаменателя дроби точнымъ квадратомъ и затѣмъ извлечь квадратный корень.

$$527. \sqrt{\frac{3}{5}}; \sqrt{\frac{7}{11}}; 528. \sqrt{\frac{5}{12}}; \sqrt{\frac{7}{250}}$$

$$529. \sqrt{0,3}; \sqrt{5,7}; 530. \sqrt{2,133}; 531. \sqrt{0,00264}.$$

Квадратное уравненіе.

131. Общій видъ квадратнаго уравненія.

Предположимъ, что въ данномъ уравненіи мы сдѣлали слѣдующія преобразованія: раскрыли скобки, если онѣ есть, уничтожили знаменателей, если въ уравненіи есть дробные члены, перенесли въ лѣвую часть члены, содержащіе неизвѣстное, въ лѣвую часть уравненія и, наконецъ, сдѣлали приведеніе подобныхъ членовъ. Если послѣ этого въ лѣвой части уравненія окажется членъ, содержащій неизвѣстное въ квадратъ, и не будетъ членовъ, содержащихъ неизвѣстное въ болѣе высокой степени, то уравненіе наз. **к в а д р а т н ы м ъ** (или **в т о р о й** **с т е п е н и**).

Въ квадратномъ уравненіи (а также и въ уравненіяхъ болѣе высокихъ степеней) обыкновенно переносятъ всѣ члены уравненія въ одну лѣвую часть, такъ что правая часть уравненія дѣлается равной нулю; тогда квадратное уравненіе получаетъ слѣдующій видъ:

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

гдѣ a , b и c данныя положительныя или отрицательныя числа (b и c могутъ быть нулями); числа эти называются **к о э ф ф и ц и е н т а м и** квадратнаго уравненія; изъ нихъ число c наз. также **с в о б о д н ы м ъ** **ч л е н о м ъ**.

Замѣчанія. Коэффициентъ a мы всегда можемъ сдѣлать **п о л о ж и т е л ь н ы м ъ**, перемѣнивъ въ случаѣ надобности передъ всѣми членами уравненія знаки на противоположныя.

Примѣръ.
$$\frac{6}{x} + \frac{x}{6} = \frac{5(x+1)}{4}$$

Раскрываемъ скобки:
$$\frac{6}{x} + \frac{x}{6} = \frac{5x+5}{4}.$$

Уничтожаемъ знаменателей: $72 + 2x^2 = 15x^2 + 15x.$

Переносимъ всѣ члены въ лѣвую часть:

$$72 + 2x^2 - 15x^2 - 15x = 0.$$

Дѣлаемъ приведеніе: $-13x^2 - 15x + 72 = 0.$

Перемѣняемъ знаки: $13x^2 + 15x - 72 = 0.$

Коэффициенты a , b и c общаго вида квадратнаго уравненія приняли здѣсь частныя значенія: $a=13$, $b=15$ и $c=-72$.

132. Болѣе простой видъ квадратнаго уравненія. Квадратному уравненію часто придаютъ болѣе простой видъ, раздѣливъ всѣ его члены на коэффициентъ при x^2 . Такъ, уравненіе $3x^2 - 15x + 2 = 0$, по раздѣленіи всѣхъ его членовъ на 3, приметъ видъ: $x^2 - 5x + \frac{2}{3} = 0$.

Вообще, раздѣливъ всѣ члены уравненія $ax^2 + bx + c = 0$ на a , и обозначивъ $\frac{b}{a}$ черезъ p , а $\frac{c}{a}$ черезъ q , получимъ:

$$x^2 + px + q = 0.$$

133. Неполныя квадратныя уравненія. Квадратное уравненіе наз. **н е п о л н ы м ъ**, когда въ немъ нѣтъ члена, содержащаго x въ первой степени, или нѣтъ свободнаго члена, или нѣтъ ни того, ни другого. Неполныя квадратныя уравненія могутъ быть только трехъ слѣдующихъ видовъ:

$$1) ax^2 + c = 0, \quad 2) ax^2 + bx = 0 \quad \text{и} \quad 3) ax^2 = 0.$$

Разсмотримъ рѣшеніе каждаго изъ нихъ.

I. Изъ уравненія $ax^2+c=0$ находимъ:

$$ax^2=-c \text{ и } x^2=-\frac{c}{a}.$$

Послѣднее уравненіе требуетъ, чтобы квадратъ неизвѣстнаго равнялся числу $-c/a$; значить, неизвѣстное должно равняться квадратному корню изъ этого числа. Это возможно только тогда, когда численная величина выраженія $-c/a$ положительна, для чего необходимо, чтобы буквы c и a означали числа съ противоположными знаками (если, напр., $c=-8$ и $a=+2$, то $-\frac{c}{a}=-\frac{-8}{+2}=+4$). Условимся

обозначать знакомъ $\sqrt{\quad}$ только ариѳметическое значеніе квадратнаго корня и примемъ во вниманіе, что корень квадратный изъ положительнаго числа имѣетъ два значенія; тогда уравненіе $x^2=-\frac{c}{a}$ равносильно такому:

$$x=\pm\sqrt{-\frac{c}{a}}.$$

Обозначая одно значеніе корня черезъ x_1 , а другое черезъ x_2 , мы можемъ послѣднее уравненіе выразить такъ:

$$x_1=\sqrt{-\frac{c}{a}}, \quad x_2=-\sqrt{-\frac{c}{a}}.$$

Если же выраженіе $-c/a$ представляетъ собою отрицательное число (что будетъ тогда, когда числа c и a имѣютъ одинаковые знаки), то уравненіе $ax^2+c=0$ не можетъ быть удовлетворено никакимъ вещественнымъ числомъ; въ этомъ случаѣ говорятъ, что уравненіе имѣетъ два мнимыхъ корня.

Примѣръ 1. Рѣшить уравненіе $3x^2-27=0$.

$$3x^2=27; x^2=9; x=\pm\sqrt{9}=\pm 3; x_1=+3, x_2=-3.$$

Примѣръ 2. Рѣшить уравненіе $x^2+25=0$.

$$x^2=-25; x=\pm\sqrt{-25}; \text{ корни мнимые.}$$

II. Чтобы рѣшить уравненіе $ax^2+bx=0$, выпишемъ въ лѣвой его части букву x за скобки, т.-е. представимъ уравненіе такъ: $x(ax+b)=0$. Въ этомъ видѣ лѣвая часть уравненія есть произведеніе двухъ сомножителей: x и $ax+b$. Но произведеніе можетъ равняться нулю только тогда, когда какой-нибудь изъ сомножителей равенъ нулю; слѣд., разсматриваемое уравненіе удовлетворяется, если положимъ, что $x=0$, или что $ax+b=0$, т.-е. что $x=-b/a$. Значить, уравненіе $ax^2+bx=0$ имѣетъ два вещественные корня: $x_1=0$ и $x_2=-b/a$.

Примѣръ 3. $2x^2-7x=0; x(2x-7)=0; x_1=0, x_2=7/2$.

III. Наконецъ квадратное уравненіе $ax^2=0$ имѣетъ, очевидно, только одно рѣшеніе: $x=0$.

134. Рѣшеніе уравненія $x^2+px+q=0$. Перенеся свободный членъ въ правую часть, получимъ: $x^2+px=-q$. Двучленъ x^2+px можно разсматривать, какъ выраженіе $x^2+2 \cdot \frac{p}{2} \cdot x$, т.-е. какъ сумму квадрата x съ удвоеннымъ произведеніемъ x на $\frac{p}{2}$. Отсюда заключаемъ, что если къ этому двучлену придадимъ число $(\frac{p}{2})^2$, то получимъ трехчленъ, представляющій собою квадратъ суммы $x+\frac{p}{2}$. Замѣтивъ это, приложимъ къ обѣимъ частямъ уравненія по $(\frac{p}{2})^2$:

$$x^2+px+\left(\frac{p}{2}\right)^2=-q+\left(\frac{p}{2}\right)^2, \text{ или } \left(x+\frac{p}{2}\right)^2=\left(\frac{p}{2}\right)^2-q.$$

Послѣднее уравненіе требуетъ, чтобы квадратъ числа $x+\frac{p}{2}$ равнялся числу $\left(\frac{p}{2}\right)^2-q$; это значить, что первое число должно быть корнемъ квадратнымъ изъ второго. Обозначая по прежнему знакомъ $\sqrt{\quad}$ только ариѳметическое значеніе кв. корня, получимъ;

$$x+\frac{p}{2}=\pm\sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2-q}$$

$$\text{и слѣд.: } x=-\frac{p}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2-q}.$$

Замѣтимъ, что выраженіе $-\frac{p}{2}$ представляетъ половину коэффициента при неизвѣстномъ въ первой степени, взятую съ противоположнымъ знакомъ; поэтому выведенную для неизвѣстнаго формулу мы можемъ высказать такъ:

Неизвѣстное квадратнаго уравненія, у котораго коэффициентъ при x^2 есть 1, равно половинѣ коэффициента при неизвѣстномъ въ 1-й степени съ противоположнымъ знакомъ, плюсъ, минусъ корень квадратный изъ квадрата этой половины безъ свободнаго члена.

Замѣчаніе. Если p есть число отрицательное, то выраженіе $-\frac{p}{2}$ должно быть числомъ положительнымъ; точно такъ же если q число отрицательное, то $-q$ число положительное.

Примѣры. 1) $x^2 - 7x + 10 = 0$; здѣсь $p = -7$, $q = +10$; поэтому $x = \frac{7}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{7}{2}\right)^2 - 10} = \frac{7}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{7 \pm 3}{2}$.

Слѣдовательно: $x_1 = \frac{7}{2} + \frac{3}{2} = 5$, $x_2 = \frac{7}{2} - \frac{3}{2} = 2$.

Повѣрка: $5^2 - 7 \cdot 5 + 10 = 0$; $2^2 - 7 \cdot 2 + 10 = 0$.

2) $x^2 - x - 6 = 0$; здѣсь $p = -1$, $q = -6$; поэтому

$$x = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + 6} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{1 \pm 5}{2};$$

$$x_1 = \frac{1}{2} + \frac{5}{2} = 3; \quad x_2 = \frac{1}{2} - \frac{5}{2} = -2;$$

Повѣрка: $3^2 - 3 - 6 = 0$; $(-2)^2 - (-2) - 6 = 0$.

3) $x^2 - 2x + 5 = 0$; $x = 1 \pm \sqrt{1 - 5} = 1 \pm \sqrt{-4}$. Корни мнимые.

4) $x^2 - 18x + 81 = 0$; $x = 9 \pm \sqrt{81 - 81} = 9$. Уравненіе имѣетъ только одинъ корень.

135. Когда корни бываютъ вещественные и когда мнимые. Выведенная нами формула распадается на двѣ:

$$x_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \text{ и } x_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}.$$

или: $x_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q} \text{ и } x_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}.$

Разсматривая эти формулы, замѣчаемъ:

1) Если двучленъ $\frac{p^2}{4} - q$ даетъ число положительное, то оба корня вещественны и различны;

2) Если двучленъ $\frac{p^2}{4} - q$ даетъ число отрицательное, то оба корня мнимые (другими словами, уравненіе не имѣетъ корней);

3) если двучленъ $\frac{p^2}{4} - q$ равенъ нулю, то и $\sqrt{\frac{p^2}{4} - q} = 0$; въ этомъ случаѣ уравненіе имѣетъ одно рѣшеніе, такъ какъ $x_1 = x_2 = -\frac{p}{2}$.

136. Рѣшеніе кв. уравненія $ax^2 + bx + c = 0$.

Раздѣливъ всѣ члены этого уравненія на a , получимъ:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0.$$

Примѣнимъ къ этому уравненію формулу, выведенную раньше для уравненія $x^2 + px + q = 0$, и упростимъ ее:

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}} = -\frac{b}{2a} \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

$$= -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

т.-е. неизвѣстное квадратнаго уравненія равно дроби, у которой числитель есть коэффициентъ при неизвѣстномъ въ первой степени съ противоположнымъ знакомъ, плюсъ, минусъ корень квадратный изъ квадрата того же коэффициента безъ учетвереннаго произведенія коэффициента при неизвѣстномъ во второй степени на свободный членъ, а знаменатель есть удвоенный коэффициентъ при неизвѣстномъ во второй степени.

Замѣчанія. 1) Выведенная формула представляетъ собою общее рѣшеніе квадратнаго уравненія, потому что изъ нея можно получить какъ рѣшеніе уравненія $x^2+px+q=0$ (полагая $a=1$), такъ и рѣшеніе неполныхъ квадратныхъ уравненій (полагая $b=0$ или $c=0$).

2) Если c число отрицательное (при a положительномъ), то оба корня вещественны е. Дѣйствительно, если c отрицательное число, то, при a положительномъ, произведеніе $4ac$ число отрицательное и, слѣд., выраженіе $-4ac$ число положительное; съ другой стороны, каковъ бы ни былъ знакъ коэффициента b , квадратъ b^2 всегда даетъ положительное число; слѣд., въ этомъ случаѣ подкоренное выраженіе b^2-4ac представляетъ собою число положительное и потому корни будутъ вещественны.

3) Если c число положительное (при a положительномъ), то корни могутъ быть или оба вещественны е (когда $b^2 \geq 4ac$), или оба мнимы е (когда $b^2 < 4ac$). Въ послѣднемъ случаѣ задача, изъ условій которой выведено уравненіе, должна быть признана невозможною.

4) Вещественны е корни могутъ быть неравны е и равны е (послѣднее, когда $b^2-4ac=0$), оба положительны е, оба отрицательны е, или одинъ положительный, а другой отрицательный.

137. Число корней квадратнаго уравненія. Разсматривая рѣшенія квадратныхъ уравненій, видимъ, что эти уравненія иногда имѣютъ два корня, иногда одинъ, иногда ни одного. Однако согласились приписывать квадратнымъ уравненіямъ во всѣхъ случаяхъ два корня, разумѣя при этомъ, что корни могутъ быть иногда равны ми, иногда мнимы ми. Причина такого соглашенія состоитъ въ томъ, что формулы, выражающія мнимы е корни уравненія, обладаютъ тѣми же свойствами, какія принадлежатъ вещественнымъ корнямъ; стоитъ только, совершая дѣйствія надъ мнимы ми числами, руководиться правилами, выведенны ми для вещественныхъ чиселъ, принимая при томъ, что $(\sqrt{-a})^2 = -a$. Точно такъ же, когда уравненіе имѣетъ одинъ корень, мы можемъ, разсматривая этотъ корень, какъ два одинаковы хъ, приписать имъ тѣ же свойства, какія принадлежатъ разнымъ корнямъ уравненія. Простѣйшія изъ этихъ свойствъ выражаются въ слѣдующей теоремѣ.

138. Теорема. Сумма корней квадратнаго уравненія, у котораго коэффициентъ при неизвѣстномъ во второй степени есть 1, равна коэффициенту при неизвѣстномъ въ первой степени съ противоположнымъ знакомъ; произведеніе корней этого уравненія равно свободному члену.

Док. Пусть x_1 и x_2 будутъ корни уравненія $x^2+px+q=0$; тогда:

$$x_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}; \quad x_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q};$$

$$x_1 + x_2 = \left(-\frac{p}{2} + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}\right) + \left(-\frac{p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}\right) = -p;$$

$$x_1 x_2 = \left(-\frac{p}{2} + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}\right) \cdot \left(-\frac{p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}\right).$$

Это произведение можно найти сокращенным путем, основываясь на тождествѣ: $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$.

$$x_1x_2 = \left(-\frac{p}{2}\right)^2 - \left(\sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}\right)^2 = \frac{p^2}{4} - \left(\frac{p^2}{4} - q\right) = q.$$

Замѣчаніе. Для уравненія вида $ax^2+bx+c=0$, или, что то же, для уравненія $x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}=0$, будемъ имѣть:

$$x_1+x_2 = -\frac{b}{a}; \quad x_1x_2 = \frac{c}{a}.$$

Слѣдствіе. По даннымъ корнямъ можно составить квадратное уравненіе. Пусть требуется составить уравненіе, котораго корни были бы 2 и -3 . Такъ какъ сумма этихъ корней равна -1 , а произведеніе ихъ равно -6 , то $p=1$, $q=-6$. Значитъ, искомое уравненіе будетъ:

$$x^2+x-6=0.$$

Подобно этому найдемъ, что -2 и -2 будутъ корнями уравненія $x^2+4x+4=0$, 3 и 0 будутъ корни уравненія $x^2-3x=0$, и т. д.

Упражненія.

Къ § 133.

532. $3x^2-147=0$. 533. $\frac{1}{3}x^2-3=0$. 534. $x^2+25=0$.
 535. $\frac{3(x^2-11)}{5} - \frac{2(x^2-60)}{7} = 36$. 536. $\frac{4}{x-3} - \frac{4}{x+3} = \frac{1}{3}$.
 537. $2x^2-7x=0$. 538. $\frac{3}{7}x^2+x=0$. 539. $0,2x^2-\frac{3}{4}x=0$.
 540. $7x^2=0$. 541. $\frac{3}{5}x^2=0$. 542. $0,7x^2=0$.

Къ §§ 134 и 135.

543. $x^2-5x+6=0$. 544. $x^2+10x+5=2x^2-6x+53$.
 545. $x^2+6x=27$. 546. $x^2-5^3/x=18$. 547. $x^2-8x=14$.
 548. $9^3/5x-21^{15}/16=x^2$. 549. $x+\frac{1}{x-3}=5$. 550. $\frac{x}{7}+\frac{21}{x+5}=6\frac{5}{7}$.

Къ § 136.

551. $(2x-3)^2=8x$. 552. $5x^2-37x+14=0$. 553. $9x^2+12x+4=0$.
 554. $9\frac{1}{3}x^2-90\frac{1}{3}x+195=0$. 555. $\frac{3(x-1)}{x+1} - \frac{2(x+1)}{x-1} = 5$.
 556. $\frac{x}{x+60} = \frac{7}{3x-5}$. 557. $\frac{31}{6x} - \frac{16}{117-2x} = 1$.

Къ § 138.

Чему равны сумма и произведеніе корней въ слѣдующихъ уравненіяхъ:

558. $x^2-8x-9=0$. 559. $x^2+x-1=0$. 560. $x^2-x+2=0$.

561. $3x^2-5x+6=0$. 562. $\frac{1}{2}x^2-2x-1=0$.

Составить квадратное уравненіе по слѣдующимъ корнямъ:

563. 2 и 3; 2 и -3 ; -2 и 3; -2 и -3 .
 564. $2\frac{1}{2}$ и $3\frac{1}{2}$; $2\frac{1}{2}$ и $-3\frac{1}{2}$; $-2\frac{1}{2}$ и $-3\frac{1}{2}$.
 565. 2 и -2 . 566. 3 и 3. 567. -3 и -3 .
 568. 10 и 0; -10 и 0.
 569. $3+\sqrt{5}$ и $3-\sqrt{5}$; 570. $2+\sqrt{-3}$ и $2-\sqrt{-3}$.
 571. a и b . 572. a и $-b$. 573. $-a$ и $-b$.

574. Найти 2 числа, которыхъ произведеніе $=750$, а частное $=3\frac{1}{3}$.

575. Найти 2 числа, изъ которыхъ одно больше другого на 8, а произведеніе ихъ $=240$.

576. Найти число, квадратъ котораго превосходитъ само число на 306.

577. Я купилъ платки, заплативъ за нихъ 60 руб. Если бы платковъ было куплено 3-мя болѣе за ту же сумму, то каждый платокъ стоилъ бы на 1 руб. дешевле. Сколько куплено платковъ?

578. Назначено для раздачи бѣднымъ 864 руб.; но 6 изъ нихъ оказались не нуждающимися въ помощи; вслѣдствіе этого каждый изъ остальныхъ получилъ на 2 руб. больше, чѣмъ предполагалось прежде. Сколькимъ бѣднымъ розданы были деньги?

579. Общество изъ 20 человекъ, мужчинъ и женщинъ, заплатило въ гостиницѣ 48 руб., изъ которыхъ половину уплатили мужчины, а другую половину женщины. Сколько было мужчинъ и сколько женщинъ, если извѣстно, что мужчина платилъ на 1 руб. болѣе, чѣмъ женщина?

580. Два купца продали матерію, одинъ на 3 аршина болѣе другого, и выручили вмѣстѣ за свой товаръ 35 руб. «Если бы я продавалъ твой товаръ по моей цѣнѣ», сказалъ тотъ изъ нихъ, у котораго было менѣе аршинъ, «то я выручилъ бы 24 руб.»— «А если бы я продавалъ твой товаръ по моей цѣнѣ», отвѣчалъ другой, «то выручилъ бы 12 руб. 50 коп.». Сколько аршинъ продалъ каждый?

581. Два курьера отправляются одновременно въ городъ, отстоящій на 90 верстъ отъ мѣста отправленія. Первый курьеръ въ каждый часъ проѣзжаетъ на 1 версту болѣе, чѣмъ второй, и прибываетъ къ мѣсту назначенія на 1 часъ раньше второго. Определить, по скольку верстъ каждый курьеръ проѣзжалъ въ часъ.

582. Купецъ купилъ товаръ и затѣмъ его продалъ за 24 руб., потерявъ при этомъ столько процентовъ, сколько рублей ему стоилъ товаръ. Сколько заплатилъ купецъ за товаръ?

583. За шляпу для себя и шляпку для жены мужъ заплатилъ 24 рубля. Если бы дамская шляпка была дешевле купленной во столько разъ, сколько рублей пришлось заплатить за мужскую шляпу, то и тогда она была бы дороже на 1 рубль мужской шляпы. Узнать цѣну каждой изъ этихъ двухъ вещей.

584. Число, выражающее пробу слитка серебра, равно числу золотниковъ его вѣса. Узнать этотъ вѣсъ, если лигатуры въ слиткѣ было 18 золотниковъ.

585. Одна молодая женщина сказала, что ей 21 годъ, при чемъ, по словамъ ея знакомой, она сбавила съ своего возраста ровно столько процентовъ, сколько ей лѣтъ въ дѣйствительности. Сколько же лѣтъ молодой женщинѣ по мнѣнію ея знакомой?

586. Поѣздъ долженъ былъ проѣхать разстояніе въ 600 верстъ въ теченіе установленнаго расписаніемъ времени, при чемъ онъ долженъ былъ двигаться равномерно съ определенною скоростью. Когда онъ прошелъ съ этою скоростью 12 часовъ, произошло нѣкоторое поврежденіе въ паровозѣ, для исправленія котораго поѣздъ простоялъ на мѣстѣ ровно четверть того времени, которое оставалось для окончанія всего пути. Двинувшись далѣе, машинистъ, съ цѣлью нагнать потерянное время, увеличилъ скорость движенія на 5 верстъ въ часъ. Тѣмъ не менѣе по прошествіи всего указаннаго въ расписаніи времени поѣздъ не дошелъ до конечнаго пункта на 30 верстъ. Въ теченіе какого числа часовъ поѣздъ долженъ былъ пройти по расписанію эти 600 верстъ и съ какой скоростью?

587. Для наполненія бассейна водой служатъ 2 крана *A* и *B*. Если открыты оба эти крана, то бассейнъ наполняется въ 2 часа 24 минуты; если же открыть только одинъ кранъ, то бассейнъ наполняется краномъ *A* быстрѣе на 2 часа, чѣмъ краномъ *B*. Определить время, въ теченіе котораго бассейнъ наполняется при дѣйствіи каждаго крана въ отдѣльности.

588. *A*, *B* и *C* выѣхали изъ города въ одинъ и тотъ же день, но въ разные часы, и пріѣхали къ знакомому въ деревню одновременно—въ 6 часовъ вечера. *A* пріѣхалъ на лошадахъ, *B*—на велосипедѣ и *C*—на автомобилѣ. *B* выѣхалъ изъ города на 1 часъ 40 мин. позже, чѣмъ *A*; *C* выѣхалъ въ 4 часа дня, при чемъ оказалось, что онъ каждый часъ проѣзжалъ столько верстъ, сколько верстъ въ часъ дѣлали *A* и *B* вмѣстѣ. Когда выѣхали изъ города *A* и *B*?

Отношеніе, пропорція и прогрессіи.

Отношеніе и пропорція.

139. Отношеніе. Отношеніемъ одного значенія величины къ другому значенію той же величины наз. отвлеченное число, на которое надо умножить второе значеніе, чтобы получить первое.

Такъ, отношеніе длины 15 арш. къ длинѣ 3 арш. есть число 5, потому что $15 \text{ арш.} = 3 \text{ арш.} \times 5$; отношеніе вѣса 1 фунтъ къ вѣсу 1 пудъ есть число $\frac{1}{40}$, потому что $1 \text{ ф.} = 1 \text{ п.} \times \frac{1}{40}$.

Можно разсматривать отношеніе и двухъ отвлеченныхъ чиселъ; такъ, отношеніе числа 25 къ числу 100 равно $\frac{1}{4}$, потому что $25 = 100 \cdot \frac{1}{4}$.

Отношеніе именованныхъ чиселъ можетъ быть замѣнено отношеніемъ отвлеченныхъ чиселъ; для этого достаточно вы-

разить именованныя числа въ одной и той же единицѣ и взять отношеніе получившихся отвлеченныхъ чиселъ. Напр., отношеніе 10 фунт. 16 лотовъ къ 3 лот. равно отношенію 336 лот. къ 3 лот., а это отношеніе равно отношенію отвлеченныхъ чиселъ 336 къ 3.

Въ послѣдующемъ изложеніи мы будемъ говорить только объ отношеніи отвлеченныхъ чиселъ.

Значенія величинъ, между которыми разсматривается отношеніе (или числа, которыми выражены эти значенія), называются ч л е н а м и отношенія, при чемъ первое значеніе есть п р е д ы д у щ и й ч л е н ь, а второе значеніе—п о с л ѣ д у ю щ и й ч л е н ь.

Изъ опредѣленія видно, что отношеніе можно разсматривать, какъ частное отъ дѣленія предыдущаго члена на послѣдующій. Поэтому отношеніе обозначается знакомъ дѣленія; такъ, отношеніе a къ b обозначается $a : b$ или $\frac{a}{b}$.

Зависимость между членами отношенія и самимъ отношеніемъ та же самая, какая существуетъ между дѣлимимъ, дѣлителемъ и частнымъ; такъ, обозначивъ отношеніе $a : b$ черезъ q , получимъ:

$$a = bq, \quad b = a : q.$$

Напр., изъ отношенія $40 : 8 = 5$ находимъ: $40 = 8 \cdot 5, 8 = 40 : 5$.

140. Пропорція. Равенство выражающее, что одно отношеніе равно другому отношенію, составляетъ пропорцію; таково, напр., равенство:

$$8 : 4 = 40 : 20 \quad \left(\text{или } \frac{8}{4} = \frac{40}{20} \right)$$

и вообще: $a : b = c : d$ (или $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$).

Члены a и d наз. крайними, b и c —средними, a и c —предыдущими, b и d —послѣдующими членами.

141. Теорема. Во всякой пропорціи произведеніе крайнихъ членовъ равно произведенію среднихъ. Для доказательства назовемъ буквою q каждое изъ отношеній пропорціи $a : b = c : d$; тогда $a = bq$ и $d = \frac{c}{q}$. Перемноживъ эти два равенства найдемъ:

$$ad = bq \cdot \frac{c}{q} = \frac{bqc}{q} = bc.$$

Напр., въ пропорціи $8 : 4 = 40 : 20$ произведеніе крайнихъ равно 160, и произведеніе среднихъ тоже равно 160.

Отсюда слѣдуетъ: крайній членъ пропорціи равенъ произведенію среднихъ, дѣленному на другой крайній; средний членъ пропорціи равенъ произведенію крайнихъ, дѣленному на другой средний.

142. Обратная теорема. Если произведеніе двухъ чиселъ (отличныхъ отъ нуля) равно произведенію двухъ другихъ чиселъ, то изъ этихъ четырехъ чиселъ можно составить пропорцію, беря сомножителей одного произведенія за крайніе, а сомножителей другого произведенія за средніе члены пропорціи.

Д о к. Пусть дано $mn = pq$, гдѣ m, n, p и q какія-нибудь числа, за исключеніемъ нуля. Раздѣлимъ обѣ части этого равенства на каждое изъ 4-хъ произведеній: mp, mq, np и nq (что можно сдѣлать, такъ какъ эти произведенія не равны нулю):

$$\frac{mn}{mp} = \frac{pq}{mp}, \quad \frac{mn}{mq} = \frac{pq}{mq}, \quad \frac{mn}{np} = \frac{pq}{np}, \quad \frac{mn}{nq} = \frac{pq}{nq}.$$

Сокративъ каждую дробь, получимъ тѣ пропорціи, о которыхъ говорится въ теоремѣ:

$$\frac{n}{p} = \frac{q}{m}, \quad \frac{n}{q} = \frac{p}{m}, \quad \frac{m}{p} = \frac{q}{n}, \quad \frac{m}{q} = \frac{p}{n}.$$

143. Перестановки членовъ. Въ каждой пропорціи можно переставлять члены: 1) средніе, 2) крайніе и

3) крайніе на мѣсто среднихъ и наоборотъ. Отъ такихъ перестановокъ, пропорція не нарушится, потому что не нарушится равенство между произведеніемъ крайнихъ и произведеніемъ среднихъ. Выполнивъ всё возможные перестановки, мы получимъ изъ одной пропорціи 8 пропорцій:

- 1) $a : b = c : d$ 5) $b : a = d : c$
 2) $a : c = b : d$ 6) $c : a = d : b$
 3) $d : b = c : a$ 7) $b : d = a : c$
 4) $d : c = b : a$ 8) $c : d = a : b$

Переставивъ въ первой пропорціи средніе члены, получаемъ вторую пропорцію; переставивъ въ каждой изъ этихъ двухъ пропорцій крайніе члены, получаемъ 3-ю и 4-ю пропорціи; наконецъ, переставивъ въ каждый изъ 4-хъ пропорцій крайніе на мѣсто среднихъ и наоборотъ, получаемъ еще 4 пропорціи.

144. Непрерывная пропорція. Среднее геометрическое. Пропорція наз. непрерывной, если у нея одинаковы или оба среднихъ, или оба крайнихъ члена. Такова, напр., пропорція:

$$36 : 12 = 12 : 4 \text{ или } 12 : 4 = 36 : 12.$$

Повторяющійся членъ непрерывной пропорціи наз. среднимъ геометрическимъ числомъ двухъ остальныхъ членовъ пропорціи. Изъ пропорціи $a : b = b : c$ находимъ:

$$b^2 = ac; \text{ откуда: } b = \sqrt{ac}.$$

т.е. среднее геометрическое двухъ чиселъ равно корню квадратному изъ произведенія ихъ. Такъ, среднее геометрическое чиселъ 32 и 8 равно $\sqrt{32 \cdot 8} = \sqrt{256} = 16$.

145. Среднее арифметическое. Среднимъ арифметическимъ нѣсколькихъ чиселъ наз. частное отъ дѣленія суммы всѣхъ этихъ чиселъ

на число ихъ. Такъ, среднее арифметическое четырехъ чиселъ: 10, 2, 8 и 12 равно:

$$\frac{10+2+8+12}{4} = \frac{32}{4} = 8.$$

146. Сложныя пропорціи. Такъ наз. пропорціи, которыя можно получить изъ двухъ или нѣсколькихъ данныхъ пропорцій посредствомъ почленного ихъ перемноженія или дѣленія. Пусть, напр., имѣемъ двѣ пропорціи:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ и } \frac{a'}{b'} = \frac{c'}{d'}.$$

Перемноживъ и раздѣливъ почленно эти два равенства, получимъ такія сложныя пропорціи:

$$1) \frac{aa'}{bb'} = \frac{cc'}{dd'} \text{ и } 2) \frac{ab'}{ba'} = \frac{cd'}{dc'}.$$

147. Производныя пропорціи. Такъ наз. пропорціи, которыя можно получить изъ одной данной пропорціи (а не изъ нѣсколькихъ, какъ получаются сложныя пропорціи) посредствомъ нѣкоторыхъ дѣйствій надъ ея членами.

Пусть имѣемъ пропорцію: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. Прибавимъ къ обѣимъ частямъ этого равенства, или отнимемъ отъ нихъ, по 1, отчего, конечно, равенство не нарушится:

$$\frac{a}{b} \pm 1 = \frac{c}{d} \pm 1.$$

Приведемъ 1 къ общему знаменателю съ дробью, къ которой она прикладывается:

$$\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d} \text{ или } \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}. \quad [1]$$

Получилась производная пропорція, которую можно прочесть такъ: сумма или разность членовъ перваго отношенія относится къ послѣдующему члену того же отноше-

нiя, какъ сумма или разность членовъ второго отношенiя относится къ послѣдующему члену этого отношенiя.

Раздѣлимъ равенство [1] на данное равенство $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$; тогда знаменатели b и d сократятся, и мы получимъ вторую производную пропорцію:

$$\frac{a+b}{a} = \frac{c+d}{c}, \quad [2]$$

т.-е. сумма или разность членовъ перваго отношенiя относится къ предыдущему члену того же отношенiя, какъ сумма или разность членовъ второго отношенiя относится къ предыдущему члену этого отношенiя.

Равенство [1] представляетъ собою двѣ пропорціи:

$$\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d} \text{ и } \frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}.$$

Раздѣливъ первую на вторую (при чемъ послѣдующiе члены сократятся), пайдемъ 3-ю производную пропорцію:

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}, \quad [3]$$

т.-е. сумма членовъ перваго отношенiя относится къ ихъ разности, какъ сумма членовъ второго отношенiя относится къ ихъ разности.

Переставивъ среднiе члены въ пропорціяхъ (1), (2) и (3), получимъ еще 3 пропорціи, которыя полезно замѣтить:

$$\frac{a+b}{c+d} = \frac{b}{d}, \quad \frac{a+b}{c+d} = \frac{a}{c}, \quad \frac{a+b}{c+d} = \frac{a-b}{c-d}.$$

148. Свойство ряда равныхъ отношенiй.

Пусть имѣемъ рядъ нѣсколькихъ равныхъ отношенiй:

$$\frac{a}{b} = \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} = \dots$$

Обозначимъ черезъ q величину каждаго изъ этихъ отношенiй; тогда $\frac{a}{b} = q$, $\frac{a_1}{b_1} = q$ и т. д. Такъ какъ предыдущій

членъ равенъ послѣдующему, умноженному на отношенiе, то:

$$a = bq, \quad a_1 = b_1q \text{ и т. д.}$$

Сложимъ эти равенства почленно:

$$a + a_1 + a_2 + \dots = bq + b_1q + b_2q + \dots = q(b + b_1 + b_2 + \dots)$$

Раздѣлимъ обѣ части этого равенства на $b + b_1 + b_2 + \dots$:

$$\frac{a + a_1 + a_2 + \dots}{b + b_1 + b_2 + \dots} = q = \frac{a}{b} = \frac{a_1}{b_1} = \dots$$

Такимъ образомъ, если нѣсколько отношенiй равны между собою, то сумма всѣхъ предыдущихъ членовъ относится къ суммѣ всѣхъ послѣдующихъ, какъ какой-нибудь изъ предыдущихъ относится къ своему послѣдующему.

149. Замѣчанiе. Производными пропорціями и свойствомъ равныхъ отношенiй иногда можно пользоваться для скорѣйшаго нахождения неизвѣстнаго числа x , входящаго въ пропорцію. Приведемъ примѣры:

Примѣръ 1. $\frac{3-x}{x} = \frac{40}{7}.$

Составимъ производную пропорцію: сумма членовъ перваго отношенiя относится къ послѣдующему члену того же отношенiя, какъ... Тогда получимъ:

$$\frac{3}{x} = \frac{47}{7}; \text{ откуда } x = \frac{21}{47}.$$

Примѣръ 2. $\frac{a-x}{x} = \frac{x}{b-x}.$

Составимъ новую пропорцію: сумма предыдущихъ относится къ суммѣ послѣдующихъ, какъ...:

$$\frac{a}{b} = \frac{a-x}{x}.$$

Теперь составимъ производную пропорцію: сумма членовъ перваго отношенiя относится къ послѣдующему, какъ...:

$$\frac{a+b}{b} = \frac{a}{x}; \text{ откуда: } x = \frac{ab}{a+b}.$$

Упражнения.

Найти неизвестные члены пропорцій:

589. $0,7 : x = 1/2 : 5$. 590. $a : b = x : d$. 591. $\frac{2(a-b)}{x} = \frac{2}{a+b}$.

592. $\frac{a+b}{1/3} = \frac{x}{a+b}$. 593. $\frac{15a^3b}{x} = \frac{5}{2ab^2}$.

Составить пропорціи изъ слѣдующихъ равенствъ:

594. $5 \cdot 6 = 15 \cdot 2$. 595. $7x = 3 \cdot 11$. 596. $ab = cd$. 597. $(a-1)x = (a+1)(b+1)$.

Сдѣлать всевозможныя перестановки членовъ въ пропорціяхъ:

598. $100 : 25 = 8 : 2$. 599. $m : n = p : q$.

Найти среднее геометрическое числовъ:

600. 9 и 4; 32 и 2; 25 и 4. 601. 40 и 3 (до $1/100$).

602. $24ab^3$ и $6a^3b$. 603. $50(a-1)^3$ и $2(a-1)$.

Изъ слѣдующихъ порпорцій составить перемноженіемъ сложныя пропорціи и сократить ихъ:

604. $\frac{a}{x} = \frac{b}{c}$ и $\frac{x}{a} = \frac{m}{n}$. 605. $\frac{5a^2}{3b} = \frac{8}{3}$ и $\frac{2b^3}{5a} = \frac{9}{16}$.

Изъ слѣдующихъ пропорцій составить дѣленіемъ сложныя пропорціи и сократить ихъ:

606. $\frac{18a}{b} = \frac{25x}{3}$ и $\frac{6a^3}{b^2} = \frac{5x}{18}$. 607. $\frac{8(a+x)}{3} = \frac{5(b+x)}{7}$ и $\frac{4(a+x)}{x} = \frac{10(b+x)}{11}$.

Составить производныя пропорціи съ цѣлью опредѣлить x изъ каждой изъ слѣдующихъ пропорцій:

608. $\frac{10+x}{x} = \frac{17}{12}$. 609. $\frac{a}{b} = \frac{c+x}{x}$. 610. $\frac{x}{8-x} = \frac{10}{3}$. 611. $\frac{a+x}{a-x} = \frac{m}{n}$.

Основываясь на свойствѣ равныхъ отношеній, опредѣлить x изъ пропорцій:

612. $\frac{x}{a} = \frac{a-x}{b}$. 613. $\frac{m}{a-x} = \frac{n}{x}$. 614. $\frac{10-x}{5} = \frac{x}{20}$.

Ариѳметическая прогрессія.

150. **Опредѣленіе.** Ариѳметической прогрессіей называется такой рядъ числовъ, въ которомъ каждое число, начиная со второго, равняется предшествующему, сложенному

съ однимъ и тѣмъ же постояннымъ для этого ряда числомъ, положительнымъ или отрицательнымъ. Такъ, два ряда:
 $\div 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20.$

$\div 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4,$

составляютъ ариѳметическія прогрессіи, потому что каждое число въ нихъ, начиная со второго, равно предшествующему, сложенному въ первомъ ряду съ числомъ 3, а во второмъ съ числомъ -2 .

Числа, составляющія прогрессіи, наз. ея ч л е н а м и. Положительное или отрицательное число, которое надо прибавить къ предшествующему члену, чтобы получить послѣдующій, наз. р а в н о с т ь ю п р о г р е с с и и.

Прогрессія наз. в о з р а с т а ю щ е ю, когда члены ея увеличиваются по мѣрѣ удаленія отъ начала ряда; она наз. у б ы в а ю щ е ю, когда члены ея уменьшаются по мѣрѣ удаленія отъ начала ряда; значить, разность первой прогрессіи—положительное число, второй—отрицательное.

Для обозначенія того, что данный рядъ представляетъ собою ариѳметическую прогрессію, ставятъ иногда въ началѣ ряда знакъ \div . Обыкновенно принято обозначать: первый членъ a , послѣдній l , разность d , число всѣхъ членовъ n и сумму ихъ s .

151. **Теорема.** Всякій членъ ариѳметической прогрессіи, начиная со второго, равенъ первому ея члену, сложенному съ произведеніемъ разности прогрессіи на число членовъ, предшествующихъ опредѣляемому.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть имѣемъ прогрессію:

$\div a, b, c, d, \dots, k, l,$

у которой разность d . Изъ опредѣленія прогрессіи слѣдуетъ:

2-й членъ b , имѣющій передъ собою 1 чл. $= a + b$

3-й » c , » » » 2 » $= b + d = a + 2d$

4-й » d , » » » 3 » $= c + d = a + 3d$

.....

Такимъ образомъ, 10-й членъ прогрессіи равенъ $a+9d$, вообще m -й членъ равенъ $a+d(m-1)$.

Слѣдствіе 1. Примѣняя доказанную теорему къ послѣднему члену прогрессіи (т.е. къ n -му), получимъ:

$$l = a + d(n-1),$$

т.е. послѣдній членъ арифметической прогрессіи равенъ первому ея члену, сложенному съ произведеніемъ разности прогрессіи на число всѣхъ членовъ, уменьшенное на 1.

Примѣръ 1. Опредѣлить 12-й членъ прогрессіи: 3, 7, 11...

Такъ какъ разность этой прогрессіи равна 4, то 12-й членъ ея будетъ: $3 + (4 \cdot 11) = 47$.

Примѣръ 2. Найти 10-й членъ прогрессіи: 40, 37, 34...

Такъ какъ разность этой прогрессіи равна -3 , то 10-й членъ ея будетъ: $40 + (-3) \cdot 9 = 40 - 27 = 13$.

Слѣдствіе 2. Арифметическую прогрессію, у которой первый членъ есть a , разность d , и число членовъ n можно изобразить такъ:

$$\div a, a+d, a+2d, a+3d, \dots, a+d(n-1).$$

152. Лемма. Сумма двухъ членовъ арифметической прогрессіи, равноотстоящихъ отъ концовъ ея, равна суммѣ крайнихъ членовъ.

Доказательство. Пусть имѣемъ прогрессію:

$$\div a, b, \dots, e, \dots, h, \dots, k, l$$

съ разностью d и положимъ, что e есть 10-й членъ отъ начала, а h есть 10-й членъ отъ конца прогрессіи. Тогда, по доказанному:

$$e = a + 9d. \quad [1]$$

Для опредѣленія члена h замѣтимъ, что если данную прогрессію напишемъ съ конца: $l, k, \dots, h, \dots, e, \dots, b, a$, то получимъ тоже прогрессію, у которой разность не d , а $-d$. Въ этой прогрессіи членъ h есть 10-й отъ начала, а потому

принявъ во вниманіе, что первый членъ прогрессіи есть l , можемъ написать:

$$h = l + (-d) \cdot 9 = l - 9d. \quad [2]$$

Сложивъ равенства [1] и [2], получимъ:

$$e + h = a + l.$$

Напримѣръ, въ прогрессіи: 12, 7, 2, -3 , -8 , -13 , -18 имѣемъ:

$$12 + (-18) = -6; \quad 7 + (-13) = -6; \quad 2 + (-8) = -6.$$

153. Теорема. Сумма всѣхъ членовъ арифметической прогрессіи равна полусуммѣ крайнихъ ея членовъ, умноженной на число всѣхъ членовъ.

До к. Если сложимъ почленно два равенства

$$\begin{cases} s = a + b + c + \dots + i + k + l \\ s = l + k + i + \dots + c + b + a, \end{cases}$$

то получимъ: $2s = (a+l) + (b+k) + (c+i) + \dots + (l+a)$. Двучлены, стоящіе внутри скобокъ, представляютъ собою суммы членовъ, равноотстоящихъ отъ концовъ прогрессіи; по доказанному, каждая изъ этихъ суммъ равна $a+l$; подставивъ, найдемъ:

$$2s = (a+l) + (a+l) + (a+l) + \dots [n \text{ разъ}],$$

т.е. $2s = (a+l)n$; откуда $s = \frac{(a+l)n}{2}$.

Замѣчаніе. Если въ формулу для суммы вмѣсто члена l вставимъ равное ему выраженіе $a+d(n-1)$, то получимъ:

$$s = \frac{[2a + d(n-1)]n}{2}.$$

Эта формула опредѣляетъ сумму въ зависимости отъ перваго члена, разности и числа членовъ данной прогрессіи.

Примѣръ 1. Опредѣлить сумму натуральныхъ чиселъ отъ 1 до n включительно.

Рядъ: 1, 2, 3, ... $(n-1)$, n представляетъ собою арифметическую прогрессію, у которой первый членъ есть 1,

разность 1, число членов n , послѣдній членъ тоже n ; поэтому:

$$s = \frac{(n+1)n}{2}.$$

Примѣръ 2. Найти сумму n первыхъ нечетныхъ чиселъ.

Рядъ: 1, 3, 5, 7, ... есть арифметическая прогрессія, у которой первый членъ есть 1 и разность 2. Если возьмемъ n членовъ, то послѣдній членъ будетъ $1+2(n-1)=2n-1$. Поэтому:

$$s = \frac{[1+(2n-1)]n}{2} = n^2.$$

Такъ: $1+3+5=9=3^2$; $1+3+5+7=16=4^2$; и т. д.

Примѣръ 3. Найти сумму 10-ти членовъ прогрессіи: 3, $2\frac{1}{2}$, 2...

Въ этой прогрессіи разность равна $-\frac{1}{2}$; поэтому 10-й членъ будетъ: $3-\frac{1}{2} \cdot 9 = -\frac{1}{2}$, и искомая сумма выразится:

$$s = \frac{[3+(-\frac{1}{2})]10}{2} = 7\frac{1}{2}.$$

Дѣйствительно:

$$3+2\frac{1}{2}+2+1\frac{1}{2}+1+\frac{1}{2}+0-\frac{1}{2}-1-1\frac{1}{2}=7\frac{1}{2}.$$

154. Такъ какъ для 5-ти чиселъ a , l , d , n и s мы имѣемъ два уравненія:

$$1) l = a + d(n-1) \quad \text{и} \quad 2) s = \frac{(a+l)n}{2},$$

то по даннымъ тремъ изъ этихъ чиселъ мы можемъ находить остальные два. Рѣшимъ для примѣра слѣдующую задачу.

Задача. Определить число членовъ арифметической прогрессіи, у которой сумма равна 12, первый членъ 7, а разность—2.

Для этой задачи уравненія даютъ:

$$l = 7 - 2(n-1) = 9 - 2n \quad \text{и} \quad 12 = \frac{(7+l)n}{2}.$$

Откуда подстановкою находимъ:

$$12 = \frac{(7+9-2n)n}{2} = (8-n)n$$

или

$$n^2 - 8n + 12 = 0$$

слѣд.,

$$n = 4 \pm \sqrt{16-12} = 4 \pm 2$$

значитъ:

$$n_1 = 6 \quad n_2 = 2.$$

Такимъ образомъ, предложенная задача имѣетъ два отвѣта: число членовъ прогрессіи или 6, или 2. И дѣйствительно, двѣ прогрессіи:

$$\div 7, 5 \quad \text{и} \quad \div 7, 5, 3, 1, -1, -3$$

имѣютъ одну и ту же сумму.

Упражненія.

615. Найти 30-й членъ арифметической прогрессіи, у которой первый членъ есть 3 и разность 4.

616. Найти 15-й членъ прогрессіи, у которой первый членъ 130 и разность—3.

617. Сколько членовъ надо взять въ прогрессіи: 4, 8, 12..., чтобы сумма ихъ равнялась 112?

618. Нѣкто заплатилъ свой долгъ въ 495 руб., уплативъ въ первый разъ 12 руб., затѣмъ 15 руб., далѣе 18 руб. и т. д., увеличивая каждый разъ платежъ на 3 руб. Спрашивается, какъ велика была послѣдняя уплата и сколько было всего уплатъ?

619. А проѣзжаетъ въ каждый день по 40 верстѣ; В, отправившись вмѣстѣ съ А по одному направленію, проѣзжаетъ въ первый день 20 верстѣ, во второй 28, въ третій 36 и т. д. Черезъ сколько дней В догонитъ А?

620. Найти первый членъ прогрессіи съ разностью $1\frac{2}{3}$, если сумма первыхъ трехъ членовъ ея равна $7\frac{1}{7}$.

621. Найти разность прогрессіи изъ 22 членовъ, если первый членъ ея равенъ 1, а послѣдній 15.

622. Рабочему поручили выкопать колодезь въ 20 аршинъ глубины и условились платить ему за первый аршинъ 60 коп.,

за второй 75 коп. и т. д., увеличивая плату за каждый слѣдующій аршинъ на 15 коп. Сколько уплатили рабочему за послѣдній аршинъ и сколько уплатили всего?

Геометрическая прогрессія.

155. Опредѣленіе. Геометрической прогрессіей называется такой рядъ чиселъ, въ которомъ каждое число, начиная со второго, равняется предшествующему, умноженному на одно и то же постоянное для этого ряда число, положительное или отрицательное. Такъ, три слѣдующіе ряда:

$$\div 2, 6, 18, 54, 162, 486, 1458$$

$$\div 8, -16, 32, -64, 128, -256, 512$$

$$\div 20, 10, 5, \frac{5}{2}, \frac{5}{4}, \frac{5}{8}, \frac{5}{16}, \frac{5}{32}$$

представляютъ геометрическія прогрессіи, потому что каждое число, начиная со второго, получается изъ предшествующаго умноженіемъ: въ первомъ ряду на 3, во второмъ на—2, въ третьемъ на $\frac{1}{2}$.

Числа, составляющія прогрессію, наз. ея ч л е н а м и. Постоянное для каждой прогрессіи число, на которое надо умножить какой-нибудь членъ прогрессіи, чтобы получить слѣдующій членъ, наз. з н а м е н а т е л ь м ь п р о г р е с с і и.

Геометрическая прогрессія наз. в о з р а с т а ю щ е ю или у б ы в а ю щ е ю, смотря по тому, увеличивается ли или уменьшается а б с о л ю т н а я в е л и ч и н а членовъ прогрессіи по мѣрѣ удаленія отъ начала ряда; такъ изъ трехъ указанныхъ выше прогрессій первая и вторая—возрастающія, а третья—убывающая. Въ возрастающей прогрессіи абсолютная величина знаменателя больше 1, въ убывающей меньше 1.

Для обозначенія того, что данный рядъ есть прогрессія геометрическая, иногда ставятъ въ началѣ его знакъ \div

Обыкновенно принято обозначать: первый членъ a , послѣдній l , знаменателя q , число всѣхъ членовъ n и сумму ихъ b .

156. Теорема. Всякій членъ геометрической прогрессіи, начиная со второго, равенъ первому ея члену, умноженному на такую степень знаменателя прогрессіи, у которой показатель равенъ числу членовъ, предшествующихъ опредѣляемому.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть имѣемъ прогрессію:

$$\div a, b, c, d, \dots h \dots i, k, l,$$

у которой знаменатель есть q . По опредѣленію прогрессіи:

$$2\text{-й членъ } b, \text{ имѣющій передъ собою 1 чл.} = aq$$

$$3\text{-й } \gg c, \gg \gg \gg 2 \gg = bq = aq^2$$

$$4\text{-й } \gg d, \gg \gg \gg 3 \gg = cq = aq^2$$

.....

Вообще, если членъ h есть m -й отъ начала, то $h = aq^{m-1}$.

Слѣдствіе 1. Примѣняя доказанную теорему къ послѣднему члену прогрессіи (т.-е. къ n -му), получимъ:

$$l = aq^{n-1}$$

т.-е. послѣдній членъ геометрической прогрессіи равенъ первому ея члену, умноженному на такую степень знаменателя, у которой показатель равенъ числу всѣхъ членовъ безъ единицы.

Примѣръ 1. Опредѣлить 6-й членъ прогрессіи, у которой первый членъ 3, а знаменатель 4.

$$6\text{-й членъ} = 3 \cdot 4^5 = 3072.$$

Примѣръ 2. Опредѣлить 10-й членъ прогрессіи $\div 20, 10 \dots$

Такъ какъ знаменатель этой прогрессіи есть $\frac{1}{2}$, то 10-й членъ $= 20 \cdot (\frac{1}{2})^9 = 20 \cdot \frac{1}{512} = \frac{5}{128}$.

Слѣдствіе 2. Геометрическую прогрессію, у которой первый членъ есть a и знаменатель q , можно изобразить такъ:

$$\div a, aq, aq^2, aq^3 \dots aq^{n-1}.$$

157. Теорема. Сумма членовъ геометрической прогрессии равна такой дроби, у которой числитель есть разность между произведениемъ послѣдняго члена на знаменателя прогрессии и первымъ членомъ, а знаменатель есть разность между знаменателемъ прогрессии и единицею, т. е.

$$s = \frac{lq - a}{q - 1}$$

Д о к. По опредѣленію геометрической прогрессии:

$$\left\{ \begin{array}{l} b = aq \\ c = bq \\ d = cq \\ \dots \\ \dots \\ \kappa = lq \\ l = \kappa q \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{Сложимъ эти равенства почленно; тогда въ} \\ \text{лѣвой части получится сумма всѣхъ членовъ} \\ \text{безъ перваго, а въ правой—произведение зна-} \\ \text{менателя } q \text{ на сумму всѣхъ членовъ безъ по-} \\ \text{слѣдняго:} \end{array}$$

$$s - a = (s - l)q.$$

Рѣшимъ это уравненіе относительно s :

$$s - a = sq - lq; \quad lq - a = sq - s = s(q - 1);$$

$$s = \frac{lq - a}{q - 1}. \quad (1)$$

158. Два другихъ выраженія для суммы.

1) Умноживъ числителя и знаменателя формулы (1) на -1 , мы придадимъ другой видъ выраженію суммы:

$$s = \frac{a - lq}{1 - q}. \quad (2)$$

Послѣдняя формула удобна для прогрессии убывающей, потому что тогда $a > lq$ и $1 > q$.

2) Замѣнивъ члсь l въ равенствахъ (1) и (2) равнымъ ему выраженіемъ aq^{n-1} , найдемъ:

$$s = \frac{aq^n - a}{q - 1} \quad \text{или} \quad s = \frac{a - aq^n}{1 - q}.$$

Эти формулы удобно употреблять тогда, когда послѣдній членъ неизвѣстенъ.

Примѣръ 1. Опредѣлить сумму 10-ти членовъ прогрессии: 1, 2, 2², ...

Въ этой прогрессии $a=1$, $q=2$, $l=1$. $2^9=2^9$; поэтому:

$$s = \frac{2^9 \cdot 2 - 1}{2 - 1} = 2^{10} - 1 = 1023.$$

Примѣръ 2. Опредѣлить сумму 8-ми членовъ прогрессии: $\div 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \dots$

Здѣсь $a=1$, $q=\frac{1}{3}$, $l=1$. $(\frac{1}{3})^7=(\frac{1}{3})^7$, поэтому:

$$s = \frac{(\frac{1}{3})^7 \cdot \frac{1}{3} - 1}{\frac{1}{3} - 1} = \frac{1 - (\frac{1}{3})^8}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3280}{2187}.$$

159. Два уравненія: $l = aq^{n-1}$ и $s = \frac{lq - a}{q - 1}$ соединяютъ

5 чиселъ и потому позволяютъ по даннымъ тремъ изъ нихъ найти остальные два. Рѣшимъ для примѣра слѣдующую задачу.

Задача. По даннымъ s , q и n найти a и l .

Изъ уравненія:

$$s = \frac{aq^n - a}{q - 1} \quad \text{находимъ:} \quad a = \frac{s(q - 1)}{q^n - 1}.$$

Послѣ чего получимъ: $l = aq^{n-1} = \frac{s(q - 1)}{q^n - 1} \cdot q^{n-1}.$

Безконечная геометрическая прогрессія.

160. Если рядъ чиселъ, составляющихъ прогрессию, можетъ быть продолжаемъ безъ конца, то прогрессія наз. *безконечною*. Изъ безконечныхъ прогрессій особенно замѣчательна убывающая геометрическая прогрессія, напр., такая:

$$\div 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$$

Такія прогрессии обладаютъ очень важнымъ свойствомъ, а именно: если въ безконечной геометрической убывающей прогрессии къ первому члену приложимъ второй, къ этой

суммѣ прибавимъ третій членъ, затѣмъ четвертый, пятый и т. д., то будемъ получать числа, все болѣе и болѣе приближающіяся къ нѣкоторому, опредѣленному для каждой прогрессіи, числу такъ, что разность между этимъ числомъ (предѣломъ) и получаемыми суммами дѣлается все меньше и меньше и можетъ быть сдѣлана такъ мала, какъ угодно. Если, напр., въ прогрессіи

$$\dots 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}; \dots$$

начнемъ складывать члены, то будемъ получать такія суммы:

$$1 + \frac{1}{2} = 1\frac{1}{2}; \quad 1\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1\frac{3}{4}; \quad 1\frac{3}{4} + \frac{1}{8} = 1\frac{7}{8}; \dots$$

Не трудно сообразить, что эти суммы имѣютъ предѣломъ число 2, т. е. разность между числомъ 2 и этими суммами можетъ сдѣлаться такъ мала, какъ угодно. Въ самомъ дѣлѣ, когда мы сложимъ только 2 члена, то получимъ $1\frac{1}{2}$; значить, до 2-хъ недостаетъ $\frac{1}{2}$; когда мы сложимъ 3 члена, т. е. къ $1\frac{1}{2}$ приложимъ еще $\frac{1}{4}$, то до 2-хъ будетъ неоставать $\frac{1}{4}$; когда сложимъ 4 члена, то до 2-хъ неоставаетъ $\frac{1}{8}$, и т. д.

161. Рассмотримъ это свойство въ примѣненіи къ какой угодно убывающей геометрической прогрессіи. Обозначимъ ее такъ:

$$\dots a, b, c, \dots i, k, l, \dots$$

Если эта прогрессія убывающая, то абсолютная величина ея знаменателя q должна быть меньше 1; замѣтивъ это, возьмемъ въ нашей прогрессіи отъ начала нѣсколько членовъ, напр., до члена l включительно, и сложимъ ихъ; ихъ сумма выразится, какъ мы видѣли, формулой:

$$\frac{a - lq}{1 - q},$$

что можно написать такъ:

$$\frac{a}{1 - q} - \frac{lq}{1 - q}.$$

Теперь вообразимъ, что мы беремъ все больше и больше членовъ и находимъ ихъ суммы; тогда уменьшаемое $\frac{a}{1 - q}$ не будетъ измѣняться, а вычитаемое $\frac{lq}{1 - q}$ будетъ все болѣе и болѣе уменьшаться, такъ какъ вмѣсто члена l будетъ входить слѣдующіе члены, все уменьшающіеся. Можно доказать¹⁾, что дробь $\frac{lq}{1 - q}$, въ которой вмѣсто l подставляются члены, все болѣе и болѣе удаленные отъ начала прогрессіи, можетъ сдѣлаться такою малою, какъ угодно. Значить, взятая нами сумма будетъ все болѣе и болѣе приближаться къ предѣлу $\frac{a}{1 - q}$. Этотъ предѣлъ условно называютъ суммою членовъ безконечной убывающей геометрической прогрессіи. Такимъ образомъ:

сумма членовъ безконечной убывающей геометрической прогрессіи равна частному отъ дѣленія перваго ея члена на избытокъ единицы надъ знаменателемъ прогрессіи, т. е.

$$s = \frac{a}{1 - q}.$$

Примѣръ 1. Найти сумму $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$

Здѣсь $a = 1$, $q = \frac{1}{2}$; поэтому $s = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$.

Примѣръ 2. Опредѣлить точное значеніе чистой періодической дроби: 0,232323...

Точное значеніе этой дроби есть предѣлъ суммы:

$$\frac{23}{100} + \frac{23}{10000} + \frac{23}{1000000} + \dots;$$

слагаемыя этой суммы суть члены геометрической прогрессіи,

¹⁾ Для простоты мы принимаемъ здѣсь это предположеніе безъ доказательства.

у которой первый членъ есть $\frac{23}{100}$, а знаменатель $=\frac{1}{100}$.
Поэтому:

$$s = \frac{\frac{23}{100}}{1 - \frac{1}{100}} = \frac{\frac{23}{100}}{\frac{99}{100}} = \frac{23}{99}.$$

Такое же число мы получили бы по правилам арифметики.

Примѣръ 3. Определить точное значеніе смѣшанной периодической дроби 0,3545454...

Точное значеніе этой дроби есть предѣлъ суммы:

$$\frac{3}{10} + \frac{54}{1000} + \frac{54}{100000} + \frac{54}{10000000} + \dots$$

Слагаемыя этой суммы, начиная со второго, суть члены безконечной геометрической убывающей прогрессіи, у которой первый членъ есть $\frac{54}{1000}$ и знаменатель $\frac{1}{100}$.

Поэтому предѣлъ написанной выше суммы равенъ:

$$\begin{aligned} \frac{3}{10} + \frac{\frac{54}{1000}}{1 - \frac{1}{100}} &= \frac{3}{10} + \frac{54}{990} = \frac{3 \cdot 99 + 54}{990} \\ &= \frac{3 \cdot 100 - 3 + 54}{990} = \frac{354 - 3}{990}. \end{aligned}$$

Такое же число мы получили бы по правилу арифметики.

Упражненія.

623. Найти сумму первыхъ 8 членовъ прогрессіи $\div 3, \frac{6}{5}$,

12/25...
624. Найти первый членъ прогрессіи, у которой знаменатель равенъ 5 и 7-й членъ есть 62500.

625. Одинъ покупатель предлагаетъ художнику купить у него его 14 картинъ по средней цѣнѣ за 4600 руб. каждую. Другой покупатель предлагаетъ ему за первую картину 4 руб., за вторую 8 руб., за третью 16 руб. и т. д. Что выгоднѣе для художника и на сколько?

626. Найти 4 числа, зная, что они составляютъ геометрическую прогрессію, что ихъ сумма равна 360 и что послѣдній членъ въ 9 разъ болѣе второго.

627. Нѣкто поспорилъ, что Нева замерзнетъ 8-го ноября; условія пари были такія: если замерзаніе Невы произойдетъ на нѣсколько дней раньше или позже 8-го ноября, то проигравшій платитъ за первый изъ этихъ дней 5 коп., за второй 15 коп. и т. д., за каждый день вдвое болѣе, чѣмъ за предыдущій. Нева замерзла 20 ноября. Сколько денегъ проигравшій долженъ уплатить?

628. Въ геометрической прогрессіи изъ 7 членовъ сумма первыхъ 6 членовъ равна $157\frac{1}{2}$, а сумма послѣднихъ 6 членовъ вдвое болѣе. Определить эту прогрессію.

629. Говорятъ, что индійскій Шахъ Сирамъ предложилъ изобрѣтателю шахматной игры требовать отъ него награду, какую онъ хочетъ. Тотъ попросилъ, чтобы ему дали за первый квадратъ шахматной доски 1 пшеничное зерно, за второй квадратъ 2 зерна, за третій 4 и т. д. въ возрастающей геометрической прогрессіи. Шахъ согласился. Но когда сосчитали все количество пшеницы, какое слѣдуетъ выдать за 64 квадрата шахматной доски, то оказалось, что награда въ этомъ размѣрѣ не можетъ быть выдана по недостатку пшеницы. Сколько же зеренъ пришлось бы выдать изобрѣтателю?

ДОПОЛНЕНІЯ.

Нѣкоторые уравненія, приводимыя къ квадратнымъ или къ уравненіямъ 2-й степени.

Освобожденіе уравненія отъ радикаловъ.

162. Теорема. Отъ возвышенія обѣихъ частей уравненія въ одну и ту же степень получаемъ новое уравненіе, которое сверхъ корней перваго уравненія можетъ имѣть еще и посторонніе корни.

До к. Мы ограничимся доказательствомъ этой теоремы только для того случая, когда обѣ части уравненія возвышаются въ квадратъ. Пусть имѣемъ уравненіе $A=B$,

въ которомъ для краткости лѣвая часть обозначена одною буквою A , а правая буквою B . Возвысимъ обѣ его части въ квадратъ; тогда получимъ новое уравненіе: $A^2=B^2$. Чтобы узнать, будетъ ли оно имѣть тѣ же самые корни, какъ и данное уравненіе, представимъ его такъ: $A^2-B^2=0$, или:

$$(A-B)(A+B)=0.$$

Чтобы произведеніе равнялось нулю, необходимо и достаточно, чтобы одинъ изъ сомножителей равнялся нулю; значить, послѣднее уравненіе удовлетворится и такими значеніями x , при которыхъ $A-B=0$, и такими, при которыхъ $A+B=0$. Первые значенія удовлетворяютъ данному уравненію, такъ какъ если $A-B=0$, то это значить, что $A=B$. Вторыя значенія x окажутся посторонними для даннаго уравненія, такъ какъ если $A+B=0$, то это значить, что $A=-B$, тогда какъ данное уравненіе требуетъ, чтобы $A=B$.

Примѣръ. $3x-2=2x$ (одинъ корень $x=2$).

Послѣ возвышенія въ квадратъ получимъ:

$$(3x-2)^2=(2x)^2, \text{ т.-е. } 9x^2-12x+4=4x^2,$$

или $5x^2-12x+4=0.$

$$\text{Откуда: } x = \frac{12 \pm \sqrt{12^2 - 4 \cdot 5 \cdot 4}}{2 \cdot 5} = \frac{12 \pm \sqrt{64}}{10} = \frac{12 \pm 8}{10};$$

$$x_1=2; \quad x_2=\frac{2}{5}.$$

Подставивъ эти числа въ данное уравненіе вмѣсто x , увидимъ, что число 2 удовлетворяетъ ему, а число $\frac{2}{5}$ не удовлетворяетъ; оно составляетъ корень измѣненнаго уравненія:

$$3x-2=-2x.$$

163. При рѣшеніи задачъ иногда случается получить уравненіе, въ которомъ неизвѣстное стоитъ подъ знакомъ радикала. Чтобы рѣшить такое уравненіе, его надо предва-

рительно освободить отъ радикаловъ. Покажемъ, какъ это сдѣлать въ слѣдующихъ двухъ простѣйшихъ случаяхъ.

Случай 1. Когда въ уравненіе входитъ только одинъ радикалъ (какой угодно степени), то предварительно уединяютъ его, т.-е. переносятъ всѣ члены, не содержащіе радикала, въ одну часть уравненія, а радикалъ оставляютъ въ другой части, и затѣмъ возвышаютъ обѣ части уравненія въ степень, показатель которой равенъ степени радикала. Найденные корни испытываютъ подстановкою въ данное уравненіе съ цѣлью опредѣлить, какіе изъ нихъ годны и какіе—посторонніе.

Примѣръ 1. $x + \sqrt{x+4} = 8.$

Переносимъ членъ x въ правую часть уравненія:

$$\sqrt{x+4} = 8-x.$$

Теперь возвышаемъ въ квадратъ обѣ части уравненія;

$$(\sqrt{x+4})^2 = (8-x)^2, \text{ т.-е. } x+4 = 64-16x+x^2.$$

Получилось квадратное уравненіе. Рѣшаемъ его:

$$x^2-17x+60=0$$

$$x = \frac{17}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{17}{2}\right)^2 - 60} = \frac{17}{2} \pm \sqrt{\frac{49}{4}} = \frac{17}{2} \pm \frac{7}{2}$$

$$x_1 = \frac{17}{2} + \frac{7}{2} = 12 \quad x_2 = \frac{17}{2} - \frac{7}{2} = 5.$$

Первый корень не годенъ для даннаго уравненія, а второй удовлетворяетъ ему.

Примѣръ 2. $2 + \sqrt[4]{x^2-9} = 0.$

Уединяемъ радикалъ и затѣмъ возвышаемъ въ четвертую степень:

$$\sqrt[4]{x^2-9} = -2; \quad x^2-9=16; \quad x^2=25;$$

$$x_1 = +\sqrt{25} = +5; \quad x_2 = -\sqrt{25} = -5.$$

Подставляя эти рѣшенія въ данное уравненіе, видимъ, что ни одно изъ нихъ не удовлетворяетъ ему; значить, данное уравненіе не имѣетъ корней (найденные два корня удовлетворяютъ измѣненному уравненію:

$$\sqrt[4]{x^2-9}=2, \text{ т.-е. } 2-\sqrt[4]{x^2-9}=0).$$

164. Случай 2. Когда въ уравненіе входятъ только два квадратныхъ радикала, то, уединивъ какой-нибудь одинъ изъ этихъ радикаловъ, возвышаютъ обѣ части уравненія въ квадратъ; отъ этого получается новое уравненіе съ однимъ радикаломъ, отъ котораго затѣмъ освобождаются такъ, какъ было объяснено раньше.

Примѣръ. $\sqrt{12-x}=1+\sqrt{1+x}$.

Здѣсь уже одинъ радикалъ уединенъ. Возвысимъ обѣ части уравненія въ квадратъ:

$$12-x=(1+\sqrt{1+x})^2=1+2\sqrt{1+x}+1+x,$$

или $10-2x=2\sqrt{1+x}, \text{ т.-е. } 5-x=\sqrt{1+x}.$

Вторичнымъ возвышеніемъ находимъ:

$$25-10x+x^2=1+x, \text{ или } x^2-11x+24=0.$$

Откуда: $x=\frac{11}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{11}{2}\right)^2-24}=\frac{11}{2}\pm\sqrt{\frac{25}{4}}=\frac{11}{2}\pm\frac{5}{2}.$

$$x_1=8, \quad x_2=3.$$

Подставивъ каждое изъ этихъ чиселъ въ данное уравненіе, находимъ, что только $x_2=3$ удовлетворяетъ ему.

Упражненія.

630. $3+2\sqrt{x}=5$; **631.** $\sqrt{3x-5}+4=5$. **632.** $5\sqrt{x-7}=3\sqrt{x-1}$.

633. $7\sqrt{3x-1}=5\sqrt{3x+5}$.

(Въ послѣднихъ двухъ примѣрахъ предварительно сдѣлать приведеніе подобныхъ радикаловъ).

634. $2+\sqrt{3x}=1$. **635.** $x-\sqrt{25-x^2}=7$.

(Какъ передѣлать два послѣднихъ примѣра, чтобы найденные корни не были посторонними?).

636. $x+\sqrt{25-x^2}=7$. **637.** $x+\sqrt{25-x^2}=1$.

638. $x-\sqrt{169-x^2}=17$. **639.** $x+\sqrt{169-x^2}=17$.

640. $\sqrt{32+x}=16-\sqrt{x}$. **641.** $\sqrt{x-7}=\sqrt{x+1}-2$.

642. $\sqrt{x+20}-\sqrt{x-1}-3=0$. **643.** $\sqrt{2x+1}+\sqrt{x+1}=12$.

Биквадратное уравненіе.

165. Такъ наз. уравненіе четвертой степени, содержащее неизвѣстное только въ четныхъ степеняхъ. Общій видъ его слѣдующій:

$$ax^4+bx^2+c=0.$$

Такое уравненіе приводится къ квадратному уравненію посредствомъ вспомогательнаго неизвѣстнаго. Положимъ, что $x^2=y$; тогда $x^4=y^2$, и уравненіе приметъ видъ:

$$ay^2+by+c=0.$$

Откуда: $y_1=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}, \quad y_2=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$

Подставивъ каждое изъ этихъ значеній y въ уравненіе $x^2=y$, найдемъ, что биквадратное уравненіе имѣетъ 4 корня, выражаемые слѣдующими формулами:

$$x_1=+\sqrt{\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}}, \quad x_3=+\sqrt{\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}},$$

$$x_2=-\sqrt{\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}}, \quad x_4=-\sqrt{\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}}.$$

Изъ этихъ 4-хъ корней нѣкоторые (и даже всѣ) могутъ оказаться мнимыми.

Примѣръ. $x^4-13x^2+36=0$.

$$x^2=y, \quad x^4=y^2, \quad y^2-13y+36=0$$

$$y=\frac{13}{2}\pm\sqrt{\frac{169}{4}-36}=\frac{13}{2}\pm\sqrt{\frac{25}{4}}=\frac{13\pm 5}{2}$$

$$y_1=\frac{13+5}{2}=9; \quad y_2=\frac{13-5}{2}=4;$$

$$x = \pm \sqrt{y};$$

$$x_1 = +\sqrt{9} = 3; \quad x_2 = -\sqrt{9} = -3; \quad x_3 = +\sqrt{4} = 2;$$

$$x_4 = -\sqrt{4} = -2.$$

Упражнения.

644. $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$. 645. $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$. 646. $x^4 - 6x^2 + 9 = 0$.
 647. $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$. 648. $x^4 - 2x^2 - 3 = 0$. 649. $2x^4 - 7x^2 - 4 = 0$.
 650. $\frac{x^2}{\sqrt{x^2+5}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{x^2+5}}$.

651. Каково должно быть въ уравненіи $x^4 - 4x^2 + q = 0$ число q (т.е. должно ли оно быть положительное, отрицательное или равное нулю и меньше или больше чего должно оно быть) для того, 1^о, чтобы всѣ четыре корня были вещественные; 2^о, чтобы два корня были вещественные и два мнимые; 3^о, чтобы всѣ корни были мнимые; 4^о, чтобы два изъ четырехъ корней равнялись остальнымъ двумъ; и 5^о, чтобы два корня равнялись нулю.

Простѣйшіе случаи системъ двухъ уравненій второй степени.

166. Случай 1-й. Если дана система двухъ уравненій съ двумя неизвѣстными, изъ которыхъ одно уравненіе первой степени, а другое второй степени, то такая система легко рѣшается способомъ подстановки.

Примѣръ. $\begin{cases} x^2 - 4y^2 + x + 3y = 1 \dots \text{ур. 2-й степ.} \\ 2x - y = 1 \dots \dots \dots \text{ур. 1-й степ.} \end{cases}$

Изъ уравненія первой степени опредѣляемъ одно неизвѣстное, напр. y , въ зависимости отъ другого: $y = 2x - 1$. Подставляемъ это выраженіе вмѣсто y въ уравненіе второй степени:

$$x^2 - 4(2x - 1)^2 + x + 3(2x - 1) = 1.$$

Упрощаемъ это уравненіе съ однимъ неизвѣстнымъ:

$$x^2 - 4(4x^2 - 4x + 1) + x + 6x - 3 - 1 = 0$$

$$x^2 - 16x^2 + 16x - 4 + x + 6x - 3 - 1 = 0$$

$$-15x^2 + 23x - 8 = 0; \quad 15x^2 - 23x + 8 = 0.$$

Рѣшаемъ это квадратное уравненіе по извѣстной формулѣ (§ 136):

$$x = \frac{23 \pm \sqrt{23^2 - 4 \cdot 15 \cdot 8}}{2 \cdot 15} = \frac{23 \pm \sqrt{529 - 480}}{30} = \frac{23 \pm \sqrt{49}}{30}$$

$$x_1 = \frac{23 + 7}{30} = 1, \quad x_2 = \frac{23 - 7}{30} = \frac{16}{30} = \frac{8}{15}.$$

Послѣ этого находимъ $y = 2x - 1$:

$$y_1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1, \quad y_2 = 2 \cdot \frac{8}{15} - 1 = \frac{1}{15}.$$

Такимъ образомъ, данная система уравненій имѣетъ двѣ пары рѣшеній:

$$1) \begin{cases} x_1 = 1 \\ y_1 = 1 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x_2 = \frac{8}{15} \\ y_2 = \frac{1}{15} \end{cases}$$

167. Случай 2-й. Когда данныя два уравненія съ двумя неизвѣстными оба второй степени, то способъ подстановки можно примѣнить и въ этомъ случаѣ. Но при этомъ можетъ случиться, что окончательное уравненіе съ однимъ неизвѣстнымъ, полученное послѣ исключенія другого неизвѣстнаго, окажется такимъ, рѣшеніе котораго въ элементарной алгебрѣ не указывается (напр., оно можетъ оказаться уравненіемъ 3-ей степени, или уравненіемъ 4-ой степени, не биквадратнымъ). Приведемъ примѣръ, который можно рѣшить извѣстными намъ способами.

Примѣръ. $x^2 + y^2 = 17; \quad xy = 4.$

Изъ второго уравненія находимъ: $y = \frac{4}{x}$; подставивъ это выраженіе вмѣсто y въ первое уравненіе, получимъ:

$$x^2 + \left(\frac{4}{x}\right)^2 = 17; \quad x^2 + \frac{16}{x^2} = 17; \quad x^4 + 16 = 17x^2$$

$$x^4 - 17x^2 + 16 = 0.$$

Рѣшаемъ это биквадратное уравненіе (§ 165):

$$x^2=z; \quad z^2-17z+16=0; \quad z=\frac{17}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{17}{2}\right)^2-16}$$

$$z=\frac{17}{2} \pm \sqrt{\frac{289}{4}-16}=\frac{17}{2} \pm \sqrt{\frac{225}{4}}=\frac{17}{2} \pm \frac{15}{2}$$

$$z_1=\frac{17}{2}+\frac{15}{2}=16, \quad z_2=\frac{17}{2}-\frac{15}{2}=1$$

$$x=\pm\sqrt{z}$$

$$x_1=+\sqrt{16}=4; \quad x_2=-\sqrt{16}=-4; \quad x_3=+\sqrt{1}=+1;$$

$$x_4=-\sqrt{1}=-1.$$

Соотвѣтственно этимъ 4 значеніямъ x находимъ 4 значенія для y изъ уравненія $y=4/x$. Такимъ образомъ, данная система уравненій имѣетъ 4 пары рѣшеній:

$$1^0. \begin{cases} x_1=4 \\ y_1=1 \end{cases} \quad 2^0. \begin{cases} x_2=-4 \\ y_2=-1 \end{cases} \quad 3^0. \begin{cases} x_3=+1 \\ y_3=+4 \end{cases} \quad 4^0. \begin{cases} x_4=-1 \\ y_4=-4 \end{cases}$$

Упражненія.

$$652. \begin{cases} x^2+y^2=96 \\ x-y=8. \end{cases} \quad 653. \begin{cases} x^2-y^2=146 \\ x-y=6. \end{cases} \quad 654. \begin{cases} x^2+y^2=20 \\ \frac{x}{y}=\frac{1}{2}. \end{cases}$$

$$655. \begin{cases} x^2+y^2=34 \\ x+y=8. \end{cases} \quad 656. \begin{cases} 2x+3y=14 \\ 4x^2+5y^2=84. \end{cases}$$

$$657. \begin{cases} x^2-y^2+x-2y+1=0 \\ 2x+y=1. \end{cases} \quad 658. \begin{cases} x^2+2xy+y^2-2x-y-5=0 \\ x+y=3. \end{cases}$$

$$659. \begin{cases} x^2+4xy-5y^2+2x+92=0 \\ 8x-y=3. \end{cases} \quad 660. \begin{cases} x^2+y^2=65 \\ xy=28. \end{cases}$$

$$661. \begin{cases} \sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a} \\ x+y=b. \end{cases}$$

Извлеченіе кубическаго корня.

Извлеченіе кубическаго корня изъ наибольшаго цѣлаго куба, заключающагося въ данномъ числѣ.

168. Предварительныя замѣчанія. 1) Если возвысимъ въ кубъ числа натурального ряда 1, 2, 3, 4, 5..., то получимъ рядъ кубовъ:

1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000...

Очевидно, что всякое цѣлое число, не находящееся въ этомъ ряду (напр., 500), не можетъ быть кубомъ цѣлаго числа.

Пусть намъ дано какое-нибудь цѣлое число, напр., 56842, и требуется изъ него извлечь кубический корень. Мы не знаемъ, находится ли это число въ рядѣ кубовъ цѣлыхъ чиселъ, и потому заранѣе не знаемъ, можно ли изъ него извлечь цѣлый корень. Въ такихъ случаяхъ условимся, что извлечь кубический корень изъ даннаго числа значитъ: извлечь его или изъ самаго этого числа (если оно есть кубъ цѣлаго числа), или же изъ наибольшаго куба цѣлаго числа, какой заключается въ данномъ числѣ.

2) Если данное число болѣе 1000, то куб. корень изъ него болѣе (или равенъ) 10 и, слѣд., состоитъ изъ двухъ или болѣе цифръ. Изъ сколькихъ бы цифръ онъ ни состоялъ, мы условимся разсматривать его, какъ сумму только десятковъ и единицъ.

169. Свойство числа десятковъ корня.

Пусть требуется извлечь куб. корень изъ какого-нибудь числа, большаго 1000, напримѣръ, изъ 571810. Предположимъ, что въ искомомъ корнѣ десятковъ будетъ x , а единицъ y . Тогда искомый корень выразится $10x+y$, и слѣдовательно:

$$571810=(10x+y)^3+\text{ост.}=1000x^3+3 \cdot 100^2y+3 \cdot 10xy^2+y^3+\text{ост.}$$

Чтобы найти число x , возьмемъ изъ обѣихъ частей этого равенства однѣ только тысячи. Въ лѣвой части находится 571 тысяча, а въ правой тысячъ или x^3 , или болѣе (если тысячи окажутся въ суммѣ послѣднихъ 4-хъ членовъ); поэтому:

$$571 \cong x^3.$$

Значитъ, x^3 есть одинъ изъ цѣлыхъ кубовъ, заключающихся въ 571. Докажемъ, что за x^3 надо взять н а и б о л ъ ш и й изъ этихъ кубовъ, т.-е. 512. Въ самомъ дѣлѣ, если бы мы взяли за x^3 не 512, а положимъ 343, то x равнялся бы 7, а потому искомый корень былъ бы 7 десятковъ съ единицами. Но 7 десятковъ съ единицами (хотя бы единицъ было и 9) меньше 8-ми десятковъ, а 8 десятковъ въ кубѣ составляютъ только 512 тысячъ, что меньше даннаго числа; поэтому мы не можемъ взять 7-ми десятковъ съ единицами, когда и 8-ми десятковъ оказывается не много.

Итакъ, $x^3=512$, и потому $x=\sqrt[3]{512}=8$. Отсюда слѣдуетъ: число десятковъ искомага корня равно кубическому корню изъ наибольшаго цѣлаго куба, заключающагося въ числѣ тысячъ даннаго числа.

Когда данное число, какъ взятое нами, меньше 1 000 000, тогда число тысячъ въ немъ меньше 1000; въ этомъ случаѣ десятки корня легко находятся помощью таблицы кубовъ первыхъ 9-ти чиселъ.

170. Свойство числа единицъ корня. Найдя десятки корня, вычислимъ членъ $1000x^3$ и вычтемъ его изъ даннаго числа; тогда получимъ первый остатокъ. Чтобы найти его, достаточно вычесть x^3 , т.-е. 512, изъ 571 и къ остатку снести остальные три цифры:

$$\begin{array}{r} 571810 \\ -512 \\ \hline 59810 = 3 \cdot 100x^2y + 3 \cdot 10xy^2 + y^3 + \text{ост.} \end{array}$$

Чтобы найти y , возьмемъ въ обѣихъ частяхъ этого равенства только однѣ сотни. Въ лѣвой части сотенъ 598, а въ правой $3x^2y$ или больше (если сотни окажутся въ суммѣ послѣднихъ трехъ членовъ); поэтому:

$$598 \geq 3x^2y, \text{ откуда: } y \leq \frac{598}{3x^2},$$

т.-е. число единицъ корня или равно цѣлому частному отъ дѣленія числа сотенъ перваго остатка на утроенный квадратъ числа десятковъ корня, или меньше этого частнаго.

Подставивъ вмѣсто x найденное для него число 8, получимъ:

$$y \leq \frac{598}{3 \cdot 8^2} = \frac{598}{192} = 3 \frac{22}{192}.$$

Отсюда видно, что y есть или 3, или 2, или 1, или 0. Чтобы опредѣлить, какое изъ этихъ чиселъ надо взять за y , испытаемъ сначала бѣльшую цифру, т.-е. 3. Для этого достаточно вычислить сумму членовъ: $3 \cdot 100x^2y + 3 \cdot 10xy^2 + y^3$ при $x=8$ и $y=3$; если получится число, не бѣльшее перваго остатка 59810, то испытуемая цифра годится; въ противномъ случаѣ надо испытать слѣдующую меньшую цифру:

$$\begin{array}{r} 3x^2y \cdot 100 = 3 \cdot 64 \cdot 3 \cdot 100 = 57600 \\ 3xy^2 \cdot 10 = 3 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 = 2160 \\ y^3 = 3^3 = 27 \\ \hline 59787 \end{array}$$

Испытуемая цифра годится. Искомый корень 83. Чтобы найти послѣдній остатокъ, надо изъ 59810 вычесть 59787; вычтя, получимъ 23; вслѣдствие чего можно написать: $571810 = 83^3 + 23$.

Вычисляя члены $3x^2y \cdot 100$ и $3xy^2 \cdot 10$, мы можемъ не писать на концѣ нулей, а только, при подписываніи слагаемыхъ другъ

подъ другомъ, имѣть въ виду, что произведеніе $3x^2y$ означаетъ сотни, а $3xy^2$ —десятки.

171. Извлечение куб. корня, состоящаго изъ одной или двухъ цифръ. Если данное число меньше 1000, то куб. корень изъ него выражается одною цифрою и тогда онъ находится по таблицѣ кубовъ первыхъ 9 чиселъ (ее надо заучить). Если же данное число болѣе 1000, но менѣе 1000000, то куб. корень изъ него выражается 2 цифрами. Согласно сказанному выше, цифры эти всегда удобнѣе находить слѣдующимъ образомъ:

$$\begin{array}{r} \sqrt[3]{571'810} = 83 \\ 512 \\ 3 \cdot 8^2 = 192 \overline{) 598'10} \\ \underline{3 \cdot 8^2 \cdot 3 = 576} \\ 3 \cdot 8 \cdot 3^2 = 216 \\ \underline{3^3 = 27} \\ 59787 \\ \underline{23} \end{array}$$

Отдѣливъ въ данномъ числѣ тысячи (571), извлекаютъ куб. корень изъ наибольшаго цѣлаго куба, заключающагося въ числѣ ихъ. Полученное число пишутъ въ корнѣ; это будутъ десятки искомаго корня. Возвысивъ найденное число въ кубъ, вычитаютъ результатъ изъ числа тысячъ даннаго числа. Къ остатку (59) сносятъ остальные три цифры подкореннаго числа. Отдѣляютъ въ этомъ остаткѣ сотни; нѣлво отъ него проводятъ вертикальную черту, за которой пишутъ утроенный квадратъ числа десятковъ корня. На это число дѣлятъ сотни остатка. Полученную цифру (3) подвергаютъ испытанію. Для этого вычисляютъ отдѣльно три слагаемыхъ: утроенное произведеніе квадрата десятковъ на единицы, утроенное произведеніе десятковъ на квадратъ единицъ и кубъ единицъ. Подписавъ эти слагаемые другъ подъ другомъ (при чемъ второе и третье сдвигаютъ на одно мѣсто вправо), находятъ ихъ сумму (59787). Если эта сумма оказывается не болѣе остатка, то ее вычитаютъ изъ него; въ противномъ случаѣ подвергаютъ испытанію слѣдующую меньшую цифру.

172. Извлечение кубичнаго корня, состоящаго изъ трехъ или болѣе цифръ.

Пусть требуется теперь извлечь кубичный корень изъ числа бѣльшаго милліона, напр., изъ 53820756. Кубичный корень изъ такого числа болѣе (или равенъ) 100 и потому состоитъ изъ 3 или болѣе цифръ. Мы однако можемъ его разсматривать, какъ состоящій только изъ десятковъ и единицъ. Чтобы найти десятки корня, надо, по доказанному, извлечь куб. корень изъ наибольшаго цѣлаго куба, заключающагося въ числѣ тысячъ даннаго числа, т.-е. въ 53820. Такъ какъ это число

менше 1000000, то корень из него найдем описанным выше приемом:

$$\sqrt[3]{53'820'756} = 377$$

3 . 3 ² = 27	268'20	}	Цифры 9 и 8, по испытаніи ихъ, оказываются велики. Такимъ образомъ, въ искомомъ корнѣ содержится 37 десятковъ.
3 . 3 ² . 7 =	189		
3 . 3 . 7 ² =	44 1		
7 ³ =	3 43		
	236 53		
3 . 37 ² = 4107	31 677'56		
3 . 37 ² . 7 =	28 749		
3 . 37 . 7 ² =	543 9		
7 ³ =	3 43		
	29296 33		
	2381 23		

Чтобы найти единицы корня, надо, по доказанному, найти предварительно первый остатокъ, т.-е. изъ даннаго числа вычесть кубъ десятковъ, т.-е. 37³ . 1000. Для этого достаточно изъ 53820 вычесть 37³ и къ остатку приписать послѣднія три цифры даннаго числа, т. е. 756. Остатокъ отъ вычитанія 37³ изъ 53820 у насъ уже есть, именно 3167. Припишемъ къ этому числу цифры 756; тогда получимъ остатокъ отъ вычитанія 37³ . 1000 изъ всего даннаго числа. Отдѣлимъ въ этомъ остаткѣ сотни и раздѣлимъ число ихъ на 3 . 37²; тогда получимъ, по доказанному, число, или равное числу единиц корня, или большее его. Испытаніемъ убѣдимся, какая цифра будетъ надлежащая. Дѣйствіе можно продолжать тамъ же, гдѣ мы находили десятки корня.

Правило. Чтобы извлечь куб. корень изъ даннаго цѣлаго числа, разбиваютъ его на грани, отъ правой руки къ лѣвой, по три цифры въ каждой, кромѣ послѣдней, въ которой можетъ быть одна или двѣ цифры. Чтобы найти первую цифру корня, извлекаютъ куб. корень изъ первой грани. Чтобы найти вторую цифру, изъ первой грани вычитаютъ кубъ первой цифры корня, къ остатку сносятъ вторую грань и число сотенъ получившагося числа дѣлятъ на утроенный квадратъ первой цифры корня; полученное отъ дѣленія число подвергаютъ испытанію. Слѣдующія цифры корня находятся по тому же приему.

Если послѣ снесенія грани число сотенъ получившагося числа окажется меньше дѣлителя, т.-е. меньше утроеннаго

квадрата найденной части корня, то въ корнѣ ставятъ нуль и сносятъ слѣдующую грань.

173. Число цифръ корня. Изъ рассмотрѣннаго способа нахождения кубичнаго корня слѣдуетъ, что въ корнѣ столько цифръ, сколько въ подкоренномъ числѣ граней по три цифры каждая, кромѣ послѣдней, которая можетъ имѣть и двѣ цифры, и одну.

Извлеченіе приближенныхъ корней.

174. Теорема 1. Если цѣлое число не есть кубъ другого цѣлаго числа, то оно не можетъ быть и кубомъ дроби.

Пусть N есть цѣлое число, не равное кубу цѣлаго числа; требуется доказать, что оно не можетъ быть и кубомъ дроби. Предположимъ противное: пусть нѣкоторая несократимая дробь a/b , будучи возвышена въ кубъ, даетъ число N , т.-е.

$$N = \left(\frac{a}{b}\right)^3; \text{ откуда: } N = \frac{a^3}{b^3}.$$

Это равенство возможно только тогда, когда a^3 дѣлится на b^3 ; но этого не можетъ быть, такъ какъ числа a и b не имѣютъ общихъ множителей. Слѣдовательно, число N не можетъ быть кубомъ дроби.

Теорема 2. Если числитель или знаменатель несократимой арифметической дроби не представляютъ собою кубовъ цѣлыхъ чиселъ, то такая дробь не можетъ быть кубомъ ни цѣлаго, ни дробнаго числа.

Пусть a/b есть такая несократимая дробь, у которой a или b не суть кубы цѣлыхъ чиселъ. Предположимъ, что a/b есть кубъ нѣкоторой несократимой дроби p/q . Тогда:

$$\left(\frac{p}{q}\right)^3 = \frac{a}{b}, \text{ т.-е. } \frac{p^3}{q^3} = \frac{a}{b}.$$

Такъ какъ дроби p^3/q^3 и a/b несократимы, то ихъ равенство возможно только тогда, когда у нихъ равны числители между собою и знаменатели между собою:

$$p^3 = a \text{ и } q^3 = b.$$

Но это невозможно, такъ какъ, по предположенію, a или b не суть кубы цѣлыхъ чиселъ. Съ другой стороны, очевидно, что дробь a/b не можетъ быть кубомъ и цѣлаго числа; слѣд., теорема доказана.

Числа, изъ которыхъ кубичный корень можетъ быть выраженъ цѣлымъ или дробнымъ числомъ, наз. точными кубами. Изъ остальныхъ чиселъ можно извлекать только иррациональные кубичные корни.

175. Определенія приближеннаго кубичнаго корня. 1) Приближеннымъ кубичнымъ корнемъ изъ даннаго (цѣлаго или дробнаго) числа съ точностью до 1 наз. каждое изъ двухъ такихъ цѣлыхъ чиселъ, между кубами которыхъ заключается данное число, и которыя различаются одно отъ другого на 1.

Такъ, напр., каждое изъ чиселъ: 7 и 8 есть приближенный кубичный корень изъ числа 500, съ точностью до 1, потому что $7^3 < 500 < 8^3$ и $8 - 7 = 1$. Число 7 есть приближенный корень съ недостаткомъ, а 8—съ избыткомъ.

2) Приближеннымъ кубичнымъ корнемъ изъ даннаго числа съ точностью до $\frac{1}{n}$ называется каждая изъ двухъ такихъ дробей съ знаменателемъ n , между кубами которыхъ заключается данное число, и которыя различаются одно отъ другого на $\frac{1}{n}$.

Напримѣръ, приближенный куб. корень изъ 9, съ точностью до $\frac{1}{10}$, есть $\frac{20}{10} = 2$ или $\frac{21}{10}$, потому что эти числа различаются на $\frac{1}{10}$ и между кубами ихъ заключается 9 (такъ какъ $2,1^3 = 9,261$ и $2^3 = 8$). 2 есть приближенный куб. корень съ недостаткомъ, а 2,1—съ избыткомъ.

176. Правило 1. Чтобы найти приближенный куб. корень съ недостаткомъ съ точностью до 1, достаточно извлечь куб. корень изъ наибольшаго цѣлага куба, заключающагося въ цѣлой части даннаго числа.

Пусть, напр., требуется найти приближенный куб. корень съ точностью до 1 изъ числа 500,6. Для этого находимъ куб. корень изъ наибольшаго куба, заключающагося въ 500; это есть 7. Такъ какъ $7^3 < 500$, то, и подавно, $7^3 < 500,6$; съ другой стороны, $8^3 > 500$, и такъ какъ 0,6 не составляютъ ни одной цѣлой единицы, то $8^3 > 500,6$. Следовательно, каждое изъ чиселъ: 7 или 8 есть приближенный куб. корень, съ точностью до 1, изъ числа 500,6; первое есть приближенный куб. корень съ недостаткомъ, второе—съ избыткомъ.

Примѣры. 1) $\sqrt[3]{\frac{3}{4}} = 0$ или 1; 2) $\sqrt[3]{5607/8} = 8$ или 9;

3) $\sqrt[3]{\frac{3846}{17}} = \sqrt[3]{226\frac{4}{17}} = 6$ или 7.

Правило 2. Чтобы найти приближенный куб. корень съ недостаткомъ съ точностью до $\frac{1}{n}$, достаточно умножить

данное число на n^3 , изъ полученнаго произведенія извлечь куб. корень съ недостаткомъ съ точностью до 1 и раздѣлить его на n .

Дѣйствительно, пусть искомые приближенные корни изъ даннаго числа A съ точностью до $\frac{1}{n}$ будутъ $\frac{x}{n}$ и $\frac{x+1}{n}$. Тогда, согласно опредѣленію:

$$\left(\frac{x}{n}\right)^3 < A < \left(\frac{x+1}{n}\right)^3 \text{ или } \frac{x^3}{n^3} < A < \frac{(x+1)^3}{n^3}.$$

Умноживъ все члены неравенства на n^3 , получимъ:
 $x^3 < An^3 < (x+1)^3.$

Изъ этого двойнаго неравенства видно, что числа x и $x+1$ суть приближенные куб. корни изъ числа An^3 , съ точностью до 1. Найдя эти корни такъ, какъ было указано прежде, получимъ числители дробей $\frac{x}{n}$ и $\frac{x+1}{n}$, а раздѣливъ ихъ на n , найдемъ и самыя дроби.

Примѣры. 1) Найти $\sqrt[3]{5}$ съ точностью до $\frac{1}{8}$.

$5 \cdot 8^3 = 2560; \sqrt[3]{2560} = 13$ или $14; \sqrt[3]{5} = \frac{13}{8}$ или $\frac{14}{8}$ (до $\frac{1}{8}$);

2) Найти $\sqrt[4]{9}$ до сотыхъ долей:

$\frac{4}{9} \cdot 100^3 = 444444\frac{4}{9}; \sqrt[4]{444444} = 76$ или $77; \sqrt[4]{9} = 0,76$ или $0,77$;

3) Найти $\sqrt[3]{2}$ съ десятичнымъ приближеніемъ:

$$\sqrt[3]{2} = 1,25\dots$$

	1
$3 \cdot 12^2 = 3$	10'00
$3 \cdot 12^2 \cdot 2 =$	6
$3 \cdot 12^2 \cdot 2^2 =$	12
$2^3 =$	8
	728
$3 \cdot 12^2 = 432$	2720'00
$3 \cdot 12^2 \cdot 5 =$	2160
$3 \cdot 12^2 \cdot 5^2 =$	900
$5^3 =$	125
	225125
	46875

Сначала извлекаемъ корень съ точностью до 1; это будетъ 1. Чтобы найти цифру десятыхъ, надо было бы умножить 2 на 10^3 , т.-е. къ 2 приписать три нуля. Очевидно, это все равно, что приписать къ остатку три нуля. Найдя цифру десятыхъ, можемъ снова приписать къ остатку три нуля и искать цифру сотыхъ, и т. д.

Извлечение кубических корней из дробей.

177. Точный кубический корень из несократимой дроби можно извлечь лишь в томъ случаѣ, когда оба члена дроби точные кубы (§ 174). Въ этомъ случаѣ достаточно извлечь корень изъ числителя и знаменателя отдѣльно; напр.:

$$\sqrt[3]{\frac{27}{125}} = \frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{125}} = \frac{3}{5}.$$

Приближенные куб. корни изъ дробей обыкновенно находятъ такъ, какъ указано въ предыдущемъ параграфѣ (примѣры 2 и 3). Впрочемъ, можно поступать иначе. Объяснимъ это на примѣрѣ.

Найти приближенное значеніе $\sqrt[3]{\frac{5}{24}}$.

Изъ разложенія: $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$ видимъ, что если оба члена дроби умножимъ на 3^2 , то сдѣлаемъ знаменателя точнымъ кубомъ; сдѣлавъ это, извлечемъ корень изъ числителя и знаменателя отдѣльно:

$$\sqrt[3]{\frac{5}{24}} = \sqrt[3]{\frac{5 \cdot 3^2}{24 \cdot 3^2}} = \sqrt[3]{\frac{45}{2^3 \cdot 3^3}} = \frac{\sqrt[3]{45}}{2 \cdot 3} = \frac{3}{6} \text{ или } \frac{4}{6} \left(\text{до } \frac{1}{6} \right).$$

Упражненія.

Къ § 171. 662. $\sqrt[3]{50653}$. 663. $\sqrt[3]{884736}$. 664. $\sqrt[3]{405224}$.

Къ § 172. 665. $\sqrt[3]{17173512}$. 666. $\sqrt[3]{64481201}$.

667. $\sqrt[3]{340068392}$. 668. $\sqrt[3]{113028882875}$.

Къ § 176. 669. $\sqrt[3]{600\frac{1}{4}}$ до 1. 670. $\sqrt[3]{30,56}$ до 1. 671. $\sqrt[3]{5}$ до 0,1.

672. $\sqrt[3]{7\frac{1}{2}}$ до 0,1. 673. $\sqrt[3]{2,3}$ до 0,1. 674. $\sqrt[3]{\frac{5}{6}}$ до 0,01.

675. $\sqrt[3]{28,25}$ до 0,01. 676. $\sqrt[3]{3,3054}$ до 0,1.

Къ § 177. Сдѣлать знаменателя дроби точнымъ кубомъ и затѣмъ извлечь кубический корень:

677. $\sqrt[3]{\frac{5}{7}}$. 678. $\sqrt[3]{\frac{2}{9}}$. 679. $\sqrt[3]{\frac{7}{12}}$. 680. $\sqrt[3]{\frac{13}{250}}$. 681. $\sqrt[3]{0,2}$.

682. $\sqrt[3]{0,36}$. 683. $\sqrt[3]{2,1034}$.

Дѣйствіе надъ радикалами.

178. Предварительныя замѣчанія. Мы уже видѣли, какъ можно изъ всякаго положительнаго числа извлечь квадратный корень точно или приближенно (съ какою угодно степенью точности). Подобно этому существуютъ способы извлекать изъ чиселъ корни другихъ степеней: 3-й, 4-й, 5-й и т. д. Мы не будемъ однако указывать эти способы, а рассмотримъ только, какъ можно совершать различныя дѣйствія надъ корнями различныхъ степеней, когда эти корни не вычислены, а только обозначены.

Мы знаемъ, что корень четной степени изъ положительнаго числа имѣетъ два значенія, одно положительное, другое отрицательное, съ одинаковой абсолютной величиной (§ 115); напр., $\sqrt[4]{16} = \pm 2$. Первое изъ этихъ значеній наз. а р и е м е т и ч е с к и мъ. Мы условимся въ дальнѣйшемъ знакомъ $\sqrt{\quad}$ обозначать только ариѣметическое значеніе.

Замѣтимъ, что ариѣметическое значеніе радикала данной степени изъ даннаго числа можетъ быть только одно. Напр., $\sqrt[4]{16}$ равенъ 2 и только 2, если считать ариѣметическое значеніе этого радикала.

179. Теорема. Если показателя радикала и показателя подкореннаго числа умножимъ или раздѣлимъ на одно и то же цѣлое и положительное число, то величина радикала не измѣнится.

Напр., умножимъ въ выраженіи $\sqrt[3]{a^2}$ показателя корня и показателя подкореннаго числа на 4; тогда получимъ новый радикаль $\sqrt[12]{a^8}$. Докажемъ, что

$$\sqrt[3]{a^2} = \sqrt[12]{a^8}.$$

Для этого возвысимъ объ части доказываемаго равенства въ 12-ю степень: $(\sqrt[12]{a^8})^{12} = a^8$ согласно опредѣленію корня (корнемъ 12-й степени изъ a^8 называется такое число, которое.....). Чтобы возвысить $\sqrt[3]{a^2}$ въ 12-ю степень, можно возвысить $\sqrt[3]{a^2}$ въ 3-ю степень и результатъ возвысить въ 4-ю (§ 108, 2): $(\sqrt[3]{a^2})^{12} = [(\sqrt[3]{a^2})^3]^4$. Но $(\sqrt[3]{a^2})^3 = a^2$ согласно опредѣленію корня, и $(a^2)^4 = a^8$. Такимъ образомъ, мы видимъ, что два радикала $\sqrt[12]{a^8}$ и $\sqrt[3]{a^2}$ послѣ возвышенія въ одну и ту же степень даютъ одно и то же число, именно a^8 ; значитъ, эти радикалы равны.

Подобнымъ же образомъ можно убѣдиться, что вообще:

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[\frac{np}{n}]{a^{mp}}$$

Читая это равенство справа налѣво, видимъ, что величина радикала не измѣняется отъ дѣленія показателя его и показателя подкоренного числа на одно и то же число (конечно, если дѣленіе возможно нацѣло).

180. Слѣдствія. 1) Если показатель радикала и показатель подкоренного числа имѣютъ общаго множителя, то на него можно сократить обоихъ показателей. Напримѣръ:

$$\sqrt[12]{a^8} = \sqrt[3]{a^2}; \quad \sqrt[4]{25} = \sqrt[4]{5^2} = \sqrt{5}; \quad \sqrt[4]{(1+x)^2} = \sqrt[2]{1+x}.$$

2) Если подкоренное выраженіе представляетъ собою произведеніе нѣсколькихъ степеней съ различными показателями, и всѣ эти показатели имѣютъ общаго множителя съ показателемъ радикала, то на него можно сократить всѣхъ этихъ показателей. Напр., въ выраженіи: $\sqrt[12]{64a^{12}b^6x^{18}}$ подкоренное число представляетъ произведеніе четырехъ степеней: $2^6 \cdot a^{12} \cdot b^6 \cdot x^{18}$, показатели которыхъ имѣютъ

имѣютъ общаго множителя 6 съ показателемъ радикала; въ такомъ случаѣ этотъ радикалъ можемъ представить такъ:

$$\sqrt[12]{2^6 a^{12} b^6 x^{18}} = \sqrt[2]{(2a^2 b x^3)^6}.$$

Теперь, согласно слѣдствію 1), можно сократить показателя радикала и показателя подкоренного числа на 6:

$$\sqrt[12]{2^6 a^{12} b^6 x^{18}} = \sqrt{2a^2 b x^3}.$$

3) Показателей нѣсколькихъ корней можно сдѣлать одинаковыми подобно тому, какъ знаменателей нѣсколькихъ дробей можно сдѣлать равными. Для этого достаточно найти общее кратное (лучше всего наименьшее) показателей всѣхъ радикаловъ и помножить показателя каждого изъ нихъ и показателя подкоренного числа на соответствующаго дополнительнаго множителя (т.-е. на частное отъ дѣленія общаго кратнаго на показателя радикала). Пусть даны, напр., радикалы:

$$\sqrt{ax}, \quad \sqrt[3]{a^2}, \quad \sqrt[12]{x}.$$

Наименьшее кратное показателей есть 12; дополнительные множители: для перваго корня 6, для втораго 4 и для третьяго 1; на основаніи доказанной теоремы можемъ написать:

$$\sqrt{ax} = \sqrt[12]{(ax)^6} = \sqrt[12]{a^6 x^6}; \quad \sqrt[3]{a^2} = \sqrt[12]{a^8}; \quad \sqrt[12]{x} = \sqrt[12]{x}.$$

181. Подобные радикалы. Подобными радикалами наз. такіе, у которыхъ одинаковы подкоренныя выраженія и показатели радикаловъ (различаться могутъ, слѣд., только множители, стоящіе передъ знаками радикала, и знаки передъ ними). Таковы, напр., выраженія $+3a\sqrt[3]{xy}$ и $-5b\sqrt[3]{xy}$.

Чтобы опредѣлить, подобны ли между собою данныя радикалы, слѣдуетъ предварительно упростить ихъ. Для этого слѣдуетъ:

1) вынести из-под знака радикала тѣхъ множителей, изъ которыхъ возможно извлечь корень (§ 118);

2) понизить, если возможно, степень радикала, сокративъ показателя его и показателей подкоренного числа на общаго множителя;

и 3) освободиться подъ радикалами отъ знаменателей дробей (какъ будетъ указано на приводимомъ ниже примѣрѣ).

Примѣръ. $\sqrt[6]{8a^{12}x^3}$, $\sqrt{\frac{2}{x}}$, $\sqrt[6]{\frac{8}{x^9}}$.

Чтобы узнать, подобны ли эти радикалы, упростимъ ихъ:

$$\sqrt[6]{8a^{12}x^3} = \sqrt[6]{2^3 a^{12} x^3} = \sqrt{2a^4x} = a^2 \sqrt{2x}.$$

$$\sqrt{\frac{x}{2}} = \sqrt{\frac{2x}{4}} = \frac{\sqrt{2x}}{\sqrt{4}} \quad (\S 116, \text{ теор. } 3); \quad \sqrt{\frac{x}{2}} = \frac{\sqrt{2x}}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{2x}$$

$$\sqrt[6]{\frac{8}{x^9}} = \sqrt[6]{\frac{8x^3}{x^{12}}} = \frac{\sqrt[6]{8x^3}}{\sqrt[6]{x^{12}}} = \frac{\sqrt[6]{2^3 x^3}}{x^2} = \frac{1}{x^2} \sqrt{2x}.$$

Всѣ три корня оказались подобными.

182. Сложение и вычитаніе. Чтобы сложить или вычесть радикалы, соединяютъ ихъ знаками + или —, и, если возможно, дѣлаютъ приведеніе подобныхъ радикаловъ.

Примѣры.

1) $a\sqrt[3]{a^4bc} + b\sqrt[3]{ab^2c} + c\sqrt[3]{abc^2} = a^2\sqrt[3]{abc} + b^2\sqrt[3]{abc} + c^2\sqrt[3]{abc} = (a^2 + b^2 + c^2)\sqrt[3]{abc}.$

2) $15\sqrt[3]{4} - 3\sqrt[3]{32} - 16\sqrt[3]{\frac{1}{16}} - \sqrt[3]{108} = 15\sqrt[3]{4} - 6\sqrt[3]{4} - 4\sqrt[3]{4} - 3\sqrt[3]{4} = 2\sqrt[3]{4}.$

Умноженіе. Такъ какъ $\sqrt[n]{abc\dots} = \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b}\sqrt[n]{c}\dots$ (§ 116, теор. 1), то и наоборотъ: $\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b}\sqrt[n]{c}\dots = \sqrt[n]{abc\dots}$. Отсюда слѣдуетъ: чтобы перемножить нѣсколько радикаловъ съ одинаковыми показателями, достаточно перемножить подкоренныя числа.

Если для перемноженія даны радикалы съ различными показателями, то ихъ предварительно приводятъ къ одинаковому показателю. Если передъ радикалами есть коэффициенты, то ихъ перемножаютъ.

Примѣры. 1) $ab\sqrt{2a} \cdot \frac{a}{b}\sqrt{\frac{b}{2}} \cdot 2b\sqrt{ab} = 2a^2b\sqrt{a^2b^2} = 2a^3b^2.$

2) $\sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[6]{\frac{1}{2}} = \sqrt[12]{3^3 \cdot \frac{1}{3^4} \cdot \frac{1}{2^2}} = \sqrt[12]{\frac{1}{12}}.$

Дѣленіе. Такъ какъ $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ (§ 116, теор. 3), то и

наоборотъ: $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$, т.е. чтобы раздѣлить радикалы

съ одинаковыми показателями, достаточно раздѣлить ихъ подкоренныя числа.

Радикалы съ различными показателями предварительно приводятъ къ одинаковому показателю. Если есть коэффициенты, то ихъ дѣлятъ.

Примѣры.

1) $-6\sqrt{\frac{2a-2b^2}{x^2}} \cdot \frac{4}{5}\sqrt{\frac{a-b^2}{2bx^2}} = -\frac{15}{2}\sqrt{\frac{2(a-b^2)2bx^2}{x^2(a-b^2)}} = -15\sqrt{b}.$

2) $\sqrt[5]{\frac{2a+b}{a+b}} - 1 : \sqrt[5]{1 - \frac{b}{a+b}} = \sqrt[5]{\frac{a}{a+b}} : \sqrt[5]{\frac{a}{a+b}} = 1.$

Возвышеніе въ степень. Чтобы возвысить радикаль въ степень, достаточно возвысить въ эту степень подкоренное число. Дѣйствительно:

$$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{a} \dots = \sqrt[n]{aaa\dots a} = \sqrt[n]{a^m}.$$

Примѣры. 1) $(\sqrt[4]{2ab^3x^2})^3 = \sqrt[4]{(2ab^3x^2)^3} = \sqrt[4]{8a^3b^9x^6}.$
 2) $(\sqrt[6]{\frac{2x}{1+x}})^3 = \sqrt[6]{\left(\frac{2x}{1+x}\right)^3} = \sqrt{\frac{2x}{1+x}}.$
 3) $(a\sqrt[3]{a\sqrt{b}})^3 = a^3(\sqrt[3]{a\sqrt{b}})^3 = a^3\sqrt{(a\sqrt{b})^3} = a^3\sqrt{a^3(\sqrt{b})^3} = a^3\sqrt{a^3b} = a^4\sqrt{ab}.$

Извлечение корня. Чтобы извлечь корень изъ радикала, достаточно перемножить ихъ показателей, т. е.

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}.$$

Для доказательства возвысимъ обѣ части этого предполагаемаго равенства въ nm -ую степень. Отъ возвышенія правой части получимъ, по опредѣленію корня, a ; чтобы возвысить лѣвую часть въ nm -ую степень, достаточно возвысить ее сначала въ n -ую степень, а потомъ результатъ въ m -ую степень:

$$\left(\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}\right)^{nm} = \left[\left(\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}\right)^n\right]^m = (\sqrt[m]{a})^m = a.$$

Отсюда видно, что предполагаемое равенство вѣрно.

Примѣръ. $\sqrt[4]{x\sqrt{2x^2\sqrt[3]{4x^3}}}$

Подведемъ множителя $2x^2$ подъ знакъ квадратнаго радикала, для чего предварительно возвысимъ его въ квадратъ (§ 118); тогда получимъ:

$$\sqrt[4]{x\sqrt{\sqrt{(2x^2)^2}\sqrt[3]{4x^3}}} = \sqrt[4]{x\sqrt{\sqrt{4x^4}\sqrt[3]{4x^3}}} = \sqrt[4]{x\sqrt[3]{4x^4 \cdot 4x^3}} = \sqrt[4]{x\sqrt[3]{16x^7}} = \sqrt[4]{x\sqrt[6]{3x^7}}.$$

Теперь подведемъ множителя x подъ знакъ радикала 6-й степени; тогда получимъ:

$$\sqrt[4]{\sqrt[6]{x^6 \cdot 3x^7}} = \sqrt[4]{\sqrt[6]{3x^{13}}} = \sqrt[24]{3x^{13}}.$$

Слѣдствіе. Такъ какъ $\sqrt{\sqrt{a}} = \sqrt[4]{a}$ и $\sqrt[3]{\sqrt{a}} = \sqrt[6]{a}$ = $\sqrt[6]{a}$, то извлечение корня 4-й степени сводится къ двукратному извлеченію квадратнаго корня, а извлечение корня 6-й степени приводится къ извлеченію корня кубичнаго и затѣмъ квадратнаго или наоборотъ.

183. Дѣйствія надъ многочленами содержащими радикалы (иначе сказать, надъ ирраціональными многочленами) производятся по тѣмъ же правиламъ, какія выведены были для многочленовъ, не содержащихъ радикаловъ (для рациональныхъ многочленовъ).

Примѣры. 1) $(2a\sqrt{x} - \frac{1}{3}a\sqrt{y})(2a\sqrt{x} + \frac{1}{3}a\sqrt{y}) = (2a\sqrt{x})^2 - (\frac{1}{3}a\sqrt{y})^2 = 4a^2x - \frac{1}{9}a^2y;$
 2) $(5a\sqrt{2x} - \sqrt{\frac{1}{2}})^2 = (5a\sqrt{2x})^2 - 2(5a\sqrt{2x})(\sqrt{\frac{1}{2}}) + (\sqrt{\frac{1}{2}})^2 = 25a^2 \cdot 2x - 10a\sqrt{x} + \frac{1}{2} = 50a^2x - 10a\sqrt{x} + \frac{1}{2}.$

Упражненія.

Къ § 180. Упростить слѣдующіе радикалы:

684. $\sqrt{x^3}, \sqrt[3]{a^4}, \sqrt[6]{(a+b)^9}.$ 685. $\sqrt[4]{9}, \sqrt[3]{8}, \sqrt[8]{10000}.$ 686. $\sqrt[6]{9a^4b^8}.$
 687. $\sqrt[8]{16a^8b^{12}}.$ 688. $\sqrt[6]{121a^4b^4}.$ 689. $\sqrt[15]{8a^3b^{12}c^{30}}.$
 690. $\sqrt[4]{144a^2b^6}.$

Привести къ одинаковому показателю радикалы:

691. $\sqrt[12]{2a}$ и $\sqrt[3]{a^2}.$ 692. $\sqrt{x}, \sqrt[5]{y}, \sqrt[2]{z}.$ 693. $\sqrt[3]{a^2}, \sqrt[6]{a}.$ 694. $\sqrt[2]{2}$ и $\sqrt[3]{5}.$
 695. $\sqrt[3]{2}$ и $\sqrt[4]{3}.$ 696. $\sqrt[5]{3}, \sqrt[4]{4}, \sqrt[12]{12}.$ 697. $\sqrt[6]{\frac{1}{2}}, \sqrt[5]{\frac{1}{3}}, \sqrt[10]{\frac{1}{3}}.$
 698. $\sqrt[6]{y^2z}, \sqrt[12]{yz^2}, \sqrt[18]{y^2z}.$

Къ § 181. Упростить слѣдующіе радикалы:

699. $\sqrt[3]{8}$, $\sqrt[3]{18}$, $\sqrt[3]{50}$. 700. $\sqrt[3]{1^1/3}$, $\sqrt[3]{5^1/3}$, $\sqrt[3]{16^1/3}$.

701. $\sqrt[3]{4}$, $\sqrt[3]{32}$, $\sqrt[3]{108}$. 702. $\sqrt[3]{1^3/5}$, $\sqrt[3]{12,8}$, $\sqrt[3]{5^2/5}$.

703. $\sqrt[3]{a^3x}$, $\sqrt[3]{ax^3}$, $\sqrt[3]{ax}$. 704. $\sqrt[3]{54a^4x^4}$, $\sqrt[3]{16a^7x^4}$, $\sqrt[3]{2ax}$.

705. $\sqrt[3]{\frac{a}{x}}$, $\sqrt[3]{\frac{x}{9a}}$, $\sqrt[3]{ax^3}$, $\sqrt[3]{0,25ax}$. 706. $\sqrt[3]{\frac{bx^2}{a}}$, $\sqrt[3]{\frac{ax^4}{b}}$, $\sqrt[3]{\frac{x^6}{ab}}$.

Къ § 182.

Сложение и вычитание. 707. $2\sqrt[3]{8} - 7\sqrt[3]{18} + 5\sqrt[3]{72} - \sqrt[3]{50}$.

708. $\sqrt[3]{12} + 2\sqrt[3]{27} + 3\sqrt[3]{75} - 9\sqrt[3]{48}$.

709. $2\sqrt[3]{5/3} + \sqrt[3]{60} - \sqrt[3]{15} + \sqrt[3]{3/5}$.

710. $2/3\sqrt[3]{18a^5b^3} + 1/3\sqrt[3]{50a^3b^3} - b\sqrt[3]{\frac{9a}{b}}$.

711. $p^2\sqrt[3]{54p^4x^4} - 1/2p\sqrt[3]{16p^7x^4}$.

712. $3\sqrt[3]{a^2} - 2\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{a^2} - (-5\sqrt[3]{a})$.

713. $3\sqrt[3]{2a^5} + 4a\sqrt[3]{16a^2} - 3a^2\sqrt[3]{\frac{2}{a}}$.

714. $\sqrt{4+4x^2} + \sqrt{9+9x^2} - \sqrt{a^2+a^2x^2} - 5\sqrt{1+x^2}$.

Умножение. 715. $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{9} \cdot \sqrt[3]{6}$. 716. $2\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{12} \cdot 1/4\sqrt[3]{15}$.

717. $6\sqrt[3]{25} \cdot 3\sqrt[3]{125} \cdot 2\sqrt[3]{125}$. 718. $\sqrt[3]{a} \cdot 2\sqrt[3]{a^4} \cdot 3\sqrt[3]{a^4}$.

719. $2\sqrt[3]{\frac{3a}{x^2}} \cdot 4\sqrt[3]{\frac{4x^4}{3a^3}}$. 720. $\sqrt[4]{32a^3b^5} \cdot \sqrt[4]{8ab^4} \cdot \sqrt[4]{b^3}$.

721. $\sqrt[6]{15} \cdot \sqrt[6]{2}$. 722. $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{4}$. 723. $\sqrt[3]{1/2} \cdot \sqrt[3]{1/4} \cdot \sqrt[6]{1/3}$.

724. $4x^4\sqrt{x} \cdot 2\sqrt{x^3} \cdot \sqrt[3]{24x^7}$. 725. $\sqrt{0,2} \cdot \sqrt[3]{0,5} \cdot \sqrt[6]{1000}$.

Дѣленіе. 726. $\sqrt{120a^3b} : \sqrt{3ab}$. 727. $18\sqrt[4]{27a^3} : 3\sqrt[4]{30a^2}$.

728. $\sqrt{2a} : \sqrt{\frac{1}{4a^2}}$. 729. $0,1\sqrt[3]{2x^2y^2z^{10}} : 0,01\sqrt[3]{2xy^2z}$.

730. $\sqrt{x} : \sqrt[3]{x}$. 731. $\sqrt[3]{8} : \sqrt[3]{2}$. 732. $8a^2\sqrt[6]{81m^4n^5} : 2a\sqrt[3]{3mn^2}$.

Возвышеніе въ степень. 733. $(1/2\sqrt{2ab})^3$. 734. $(\sqrt[3]{1/2a^2x})^2$.

735. $(3a^2x\sqrt{a+b})^2$. 736. $(\sqrt[4]{(1+x^3)^2})^2$. 737. $(\sqrt[5]{x^2} \cdot \sqrt{x})^{10}$.

738. $(3ab^2\sqrt[3]{a^2b})^4$. 739. $(\sqrt[4]{\frac{2a}{1+x}})^3$. 740. $(\sqrt[3]{\sqrt{3ax}})^2$.

741. $(\sqrt[3]{\frac{3}{a}})^3$. 742. $(-0,1a^2x\sqrt[3]{ax})^3$. 743. $(-1/3x^m\sqrt[4]{2ax})^4$.

Извлеченіе корня. 744. $\sqrt[3]{\sqrt[3]{a}}$. 745. $\sqrt{\sqrt[3]{a}}$. 746. $\sqrt[3]{\sqrt[3]{ab}}$.

747. $\sqrt[3]{2\sqrt[3]{3}}$. 748. $\sqrt{a\sqrt{a}}$. 749. $\sqrt[3]{a\sqrt{a\sqrt{a}}}$.

750. $\sqrt[3]{2a\sqrt[4]{a}}$. 751. $\sqrt[3]{1/2ax\sqrt[4]{2a}}$.

Вычислить слѣдующіе корни (основываясь на равенствѣ

$\sqrt[m]{a} = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}$). 752. $\sqrt[4]{25}$. 753. $\sqrt[4]{144}$. 754. $\sqrt[4]{512}$.

755. $\sqrt[4]{117649}$.

Къ § 183. Дѣйствія надъ ирраціональными многочленами:

756. $(\sqrt{3} - \sqrt{2})^2$. 757. $(\sqrt{a} + 2)(\sqrt{a} - 2)$.

758. $(\sqrt{a-x} + \sqrt{a+x})^2$. 759. $(\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}})^2$.

760. $(\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})$.

761. $(3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})(2\sqrt{3} - \sqrt{2})$. 762. $(2\sqrt{a} + 3\sqrt{b} - 1/2\sqrt{c})^2$.

Упростить выраженія: 763. $[-(-\sqrt{2\sqrt{3}})^2]^3$.

764. $\frac{x + \sqrt{x^2 - a^2}}{x - \sqrt{x^2 - a^2}} \cdot \frac{x - \sqrt{x^2 - a^2}}{x + \sqrt{x^2 - a^2}}$.

765. $\frac{1}{4(1+\sqrt{x})} + \frac{1}{4(1-\sqrt{x})} + \frac{1}{2(1+x)}$.

Отрицательные и дробные показатели.

184. Значеніе отрицательнаго показателя. Условимся при дѣленіи степеней одного и того же числа производить вычитаніе показателей и въ томъ случаѣ, когда показатель дѣлителя больше показателя дѣлимаго, тогда мы получимъ въ частномъ букву съ отрица-

т е л ь н ы м ь показателемъ; напр.: $a^2 : a^5 = a^{-3}$. Конечно, отрицательный показатель не можетъ имѣть того значенія, которое придается положительнымъ показателямъ, такъ какъ нельзя повторить число сомножителемъ—2 раза, —3 раза и т. д. Число съ отрицательнымъ показателемъ мы будемъ употреблять для обозначенія частнаго отъ дѣленія степеней этого числа въ томъ случаѣ, когда показатель дѣлителя превосходитъ показателя дѣлимаго на столько единицъ, сколько ихъ находится въ абсолютной величинѣ отрицательнаго показателя. Такъ, a^{-2} означаетъ частное $a^m : a^{m+2}$, вообще a^{-n} означаетъ частное $a^m : a^{m+n}$.

Понимаемое въ этомъ смыслѣ число съ отрицательнымъ показателемъ равно дроби, у которой числитель есть 1, а знаменатель—то же число съ положительнымъ показателемъ.

Дѣйствительно, согласно нашему условію: $a^{-n} = a^m : a^{m+n} = \frac{a^m}{a^{m+n}}$. Сокративъ полученную дробь на a^m , получимъ:

$$a^{-n} = \frac{a^m}{a^{m+n}} = \frac{1}{a^n}.$$

Напр.: $a^{-1} = \frac{1}{a}$, $x^{-2} = \frac{1}{x^2}$, $(a+x)^{-3} = \frac{1}{(a+x)^3}$ и т. п.

185. Отрицательные показатели даютъ возможность всякое дробное алгебраическое выраженіе представить подъ видомъ цѣлаго; для этого стоитъ только всѣхъ множителей знаменателя перенести множителями въ числителя, взявъ ихъ съ отрицательными показателями. Напримѣръ:

$$\frac{3a}{b^2c^3} = 3a \cdot \frac{1}{b^2} \cdot \frac{1}{c^3} = 3ab^{-2}c^{-3}.$$

Само собою разумѣется, что такое преобразование дробнаго выраженія въ цѣлое есть только измѣненіе одного вида выраженія, а не содержація его.

186. Дѣйствія надъ степенями съ отрицательными показателями. Такое измѣненіе внѣшняго вида имѣеть, однако, важное значеніе, такъ какъ всѣ дѣйствія надъ степенями съ отрицательными показателями можно выполнять по тѣмъ же правиламъ, какія были выведены для показателей положительныхъ. Докажемъ это.

Умноженіе. Разсмотримъ отдѣльно три случая: 1) когда одно множимое имѣеть отрицательнаго показателя, 2) когда одинъ множитель имѣеть отрицательнаго показателя и 3) когда оба сомножителя съ отрицательными показателями. Предстоитъ доказать, что во всѣхъ этихъ случаяхъ показатели одинаковыхъ буквъ складываются. Для этого, какъ въ случаѣ умноженія, такъ и при доказательствѣ правилъ другихъ дѣйствій, поступимъ такъ: вмѣсто степени съ отрицательнымъ показателемъ подставимъ дробь, у которой числитель есть 1, а знаменатель—возвышаемое число съ положительнымъ показателемъ, затѣмъ произведемъ дѣйствіе по правилу, относящемуся до дробей, и полученный результатъ сравнимъ съ тѣмъ, который предстоитъ доказать.

1) Требуется доказать, что: $a^{-m} \cdot a^n = a^{-m+n}$.

$$\text{Д о к.: } a^{-m} \cdot a^n = \frac{1}{a^m} \cdot \frac{a^n}{a^0} = \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} = a^{-m+n}.$$

2) Требуется доказать, что: $a^m \cdot a^{-n} = a^{m+(-n)}$.

Доказательство то же самое.

3) Требуется доказать, что: $a^{-m} \cdot a^{-n} = a^{-m+(-n)}$.

$$\text{Д о к.: } a^{-m} \cdot a^{-n} = \frac{1}{a^m} \cdot \frac{1}{a^n} = \frac{1}{a^m a^n} = \frac{1}{a^{m+n}} = a^{-(m+n)} = a^{-m+(-n)}.$$

Дѣленіе. Разсмотримъ также три случая:

1) Требуется доказать, что: $a^{-m} : a^n = a^{-m-n}$.

$$\text{Д о к.: } a^{-m} : a^n = \frac{1}{a^m} : \frac{a^n}{a^0} = \frac{1}{a^m \cdot a^n} = \frac{1}{a^{m+n}} = a^{-(m+n)} = a^{-m-n}.$$

2) Требуется доказать, что: $a^m : a^{-n} = a^{m-(-n)}$.

Д о к.: $a^m : a^{-n} = a^m \cdot \frac{1}{a^n} = a^m \cdot a^n = a^{m+n} = a^{m-(-n)}$.

3) Требуется доказать, что: $a^{-m} \cdot a^{-n} = a^{-m-(-n)}$.

Д о к.: $a^{-m} \cdot a^{-n} = \frac{1}{a^m} \cdot \frac{1}{a^n} = \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} = a^{-m-(-n)}$.

Возвышение въ степень. Рассмотрим также три случая:

1) Требуется доказать, что: $(a^{-m})^n = a^{(-m)n}$.

Д о к.: $(a^{-m})^n = \left(\frac{1}{a^m}\right)^n = \frac{1}{(a^m)^n} = \frac{1}{a^{mn}} = a^{-mn} = a^{(-m)n}$.

2) Требуется доказать, что: $(a^m)^{-n} = a^{m(-n)}$.

Д о к.: $(a^m)^{-n} = \frac{1}{(a^m)^n} = \frac{1}{a^{mn}} = a^{-mn} = a^{m(-n)}$.

3) Требуется доказать, что: $(a^{-m})^{-n} = a^{(-m)(-n)}$.

Д о к.: $(a^{-m})^{-n} = \left(\frac{1}{a^m}\right)^{-n} = \frac{1}{\left(\frac{1}{a^m}\right)^n} = \frac{1}{\frac{1}{a^{mn}}} = a^{mn} = a^{(-m)(-n)}$.

Извлечение корня. Требуется доказать, что: $\sqrt[n]{a^{-m}} = a^{-\frac{m}{n}}$, если m дѣлится на n нацѣло; напр., $\sqrt[4]{a^{-12}} = a^{-3}$.

Д о к.: $\sqrt[4]{a^{-12}} = \sqrt[4]{\frac{1}{a^{12}}} = \frac{\sqrt[4]{1}}{\sqrt[4]{a^{12}}} = \frac{1}{a^3} = a^{-3}$.

Въ нашемъ курсѣ не встрѣтятся надобности разсматривать радикалы съ отрицательными показателями, а потому мы ограничимся только доказаннымъ выше случаемъ.

Примѣры. 1) $(3a^{-2n}b^2c^{1-r})(0,8a^{n+1}b^{-3}c^{r+2}) = 2,4a^{1-n}b^{-1}c^3$.

$$2) (x^{2n-r}y^{-m}z^2) : (5x^{-r}y^3z^{-n}) = \frac{1}{5}x^{2n}y^{-m-3}z^{n+2}$$

$$3) (a^{-2}+b^{-3})(a^{-2}-b^{-3}) = a^{-4}-b^{-6}$$

$$4) \sqrt[3]{27p^{-9}q^{-3x+6}r^2} = 3p^{-3}q^{-x+2}\sqrt[3]{r^2}$$

187. Значеніе дробнаго показателя. Мы видѣли (§ 116, теор. 2-я), что при извлеченіи корня изъ степени показатель подкоренного числа дѣлится на показателя корня, если такое дѣленіе выполняется нацѣло. Теперь мы условимся распространить это правило и на тотъ случай, когда показатель подкоренного числа не дѣлится нацѣло на показателя корня. Въ такомъ случаѣ въ результатѣ извлеченія корня мы должны получить степень съ дробнымъ показателемъ; напр.:

$$\sqrt[3]{a^5} \text{ выразится } a^{\frac{5}{3}} \\ \sqrt[n]{a^m} \quad \gg \quad a^{\frac{m}{n}} \text{ и т. п.}$$

Само собою разумѣется, что дробные показатели не могутъ имѣть того значенія, какое имѣютъ цѣлые показатели; напр., нельзя понимать степень $a^{\frac{2}{3}}$ въ томъ смыслѣ, что a берется сомножителемъ $\frac{2}{3}$ раза, такъ какъ выраженіе « $\frac{2}{3}$ раза» не имѣетъ смысла. Мы условимся, что степень $a^{\frac{m}{n}}$ представляетъ собою только иной видъ радикала, у котораго показатель подкоренного числа есть m , а показатель самого радикала есть n . Такимъ образомъ, $a^{\frac{2}{3}}$ есть ни что иное, какъ $\sqrt[3]{a^2}$, $(1+x)^{\frac{1}{2}}$ есть иной видъ выраженія $\sqrt{1+x}$, и т. п.

Условно допускаютъ также и отрицательные дробные показатели, принимая, что число съ такимъ показателемъ равносильно дроби, у которой числитель есть 1, а знаменатель—то же число съ положительнымъ показателемъ; такъ:

$$a^{-\frac{3}{4}} = \frac{1}{a^{\frac{3}{4}}} = \frac{1}{\sqrt[4]{a^3}}$$

188. Дробные показатели дают возможность представить иррациональное выражение под видом рационального; напр., выражение $3\sqrt[3]{a} \sqrt{x^2}$ можно представить так: $3a^{\frac{1}{3}} x^{\frac{2}{3}}$. Конечно, такое преобразование изменяет только внешний вид выражения, а не содержание его; однако подобное изменение вида имеет важное значение, так как все действия над степенями, имеющими дробных показателей, можно производить по тем же правилам, как и были выведены для целых показателей. Докажем это.

189. Основное свойство дробного показателя. Если дробный показатель $\frac{m}{n}$ заменим равным ему дробным показателем $\frac{m'}{n}$, то величина степени не изменится.

Пусть $\frac{m}{n} = \frac{m'}{n}$; требуется доказать, что $a^{\frac{m}{n}} = a^{\frac{m'}{n}}$. Для доказательства заменим степени с дробными показателями их настоящими значениями:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}; \quad a^{\frac{m'}{n}} = \sqrt[n]{a^{m'}}.$$

Приведя эти радикалы к одинаковому показателю получим:

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot n']{a^{mn'}}; \quad \sqrt[n]{a^{m'}} = \sqrt[n \cdot n']{a^{m'n}}.$$

Но из равенства: $\frac{m}{n} = \frac{m'}{n'}$, которое можно рассматривать, как пропорцию, следует, что $mn' = nm'$; значит:

$$\sqrt[n \cdot n']{a^{mn'}} = \sqrt[n \cdot n']{a^{m'n}}, \text{ т. е. } \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n']{a^{m'}}, \text{ или: } a^{\frac{m}{n}} = a^{\frac{m'}{n'}}.$$

Основываясь на этом свойстве, мы можем преобразовывать дробного показателя совершенно так, как обыкновенную дробь, лишь бы только преобразование не изменяло величины показателя; напр., мы

можем числителя и знаменателя дробного показателя умножить или разделить на одно и то же число (сравн. с § 179).

190. Действия над степенями с дробными показателями.

Умножение. Требуется доказать, что: $a^{\frac{m}{n}} a^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{m}{n} + \frac{p}{q}}$.

$$\text{Д о к. } a^{\frac{m}{n}} a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[n]{a^m} \sqrt[q]{a^p} = \sqrt[nq]{a^{mq}} \sqrt[nq]{a^{pn}} = \sqrt[nq]{a^{mq+pn}} = \sqrt[nq]{a^{mq+pn}} = a^{\frac{mq+pn}{nq}} = a^{\frac{mq}{nq} + \frac{pn}{nq}} = a^{\frac{m}{n} + \frac{p}{q}}.$$

Полагая $n=1$, или $q=1$, найдем, что правило о сложении показателей распространяется и на тот случай, когда один из показателей дробь, а другой целое число.

Деление. Требуется доказать, что: $a^{\frac{m}{n}} : a^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{m}{n} - \frac{p}{q}}$.

$$\text{Д о к. } a^{\frac{m}{n}} : a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[n]{a^m} : \sqrt[q]{a^p} = \sqrt[nq]{a^{mq}} : \sqrt[nq]{a^{pn}} = \sqrt[nq]{a^{mq-pn}} = \sqrt[nq]{a^{mq-pn}} = a^{\frac{mq-pn}{nq}} = a^{\frac{mq}{nq} - \frac{pn}{nq}} = a^{\frac{m}{n} - \frac{p}{q}}.$$

Доказательство не теряет силы, если положим $n=1$ или $q=1$.

Возвышение в степень. Требуется доказать, что:

$$\left(a^{\frac{m}{n}}\right)^p = a^{\frac{m}{n} \cdot p}.$$

$$\text{Д о к. } \left(a^{\frac{m}{n}}\right)^p = \sqrt[n]{\left(a^{\frac{m}{n}}\right)^p} = \sqrt[n]{\left(\sqrt[n]{a^m}\right)^p} = \sqrt[n]{\sqrt[n]{a^{mp}}} = \sqrt[nq]{a^{mp}} = a^{\frac{mp}{nq}} = a^{\frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q}}.$$

Доказательство не теряет силы, если положим $n=1$ или $q=1$.

Извлечение корня. В нашем курсе не встретится надобности рассматривать радикалы с дробными пока-

зателями; поэтому мы будемъ всегда предполагать, что показатель корня есть число цѣлое положительное. Требуется доказать, что:

$$\sqrt[p]{a^{\frac{m}{n}}} = a^{\frac{m}{n}} : p.$$

Д о к.: $\sqrt[p]{a^{\frac{m}{n}}} = \sqrt[p]{\sqrt[n]{a^m}} = \sqrt[np]{a^m} = a^{\frac{m}{np}} = a^{\frac{m}{n}} : p.$

191. Если показатели будутъ не только дробные, но и отрицательные, то и тогда къ нимъ можно примѣнить правила, относящіяся до цѣлыхъ положительныхъ показателей. Покажемъ это, напр., для умноженія. Требуется доказать, что:

$$a^{-\frac{m}{n}} \cdot a^{-\frac{p}{q}} = a^{-\frac{m}{n} + (-\frac{p}{q})}.$$

Д о к.: $a^{-\frac{m}{n}} \cdot a^{-\frac{p}{q}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}} \cdot \frac{1}{a^{\frac{p}{q}}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n} + \frac{p}{q}}} = a^{-\frac{m}{n} + (-\frac{p}{q})}.$

Примѣръ.

$$\frac{2a^{\frac{7}{12}}b^{-\frac{1}{6}}}{3a^{-\frac{3}{4}}b^{\frac{1}{3}}} \cdot \frac{5a^{\frac{1}{12}}b^{\frac{1}{6}}}{\sqrt{a^{\frac{3}{4}}b^{\frac{5}{3}}}} = \frac{2a^{\frac{7}{12}}b^{-\frac{1}{6}}}{3a^{-\frac{3}{4}}b^{\frac{1}{3}}} \cdot \frac{5a^{\frac{1}{12}}b^{\frac{1}{6}}}{a^{\frac{1}{4}}b^{\frac{5}{3}}} = \frac{10a^{\frac{31}{12}}b^{-\frac{17}{6}}}{3a^{-\frac{1}{2}}b^{\frac{13}{3}}} = \frac{10}{3} a^{\frac{37}{12}} b^{-\frac{57}{12}} = \frac{10}{3} \sqrt[12]{\frac{a^{37}}{b^{57}}} = \frac{10a^{\frac{31}{12}}}{3b^{\frac{17}{4}}} \sqrt[12]{\frac{a}{b^9}}.$$

Упражненія.

Къ § 184. Слѣдующія дроби изобразить при помощи отрицательныхъ показателей: 766. $\frac{a^2}{a^5}; \frac{x}{x^3}; \frac{(a+1)^2}{(a+1)^3}$. 767. $\frac{1}{x}; \frac{1}{x^3}; \frac{1}{(1+x)^2}$.

Вычислить слѣдующія выраженія: 768. $5^{-2}; 10^{-1}; 2^{-4}$. 769. $(-1)^{-1}; (-2)^{-2}$. 770. $(\frac{1}{2})^{-3}; (0,1)^{-2}$. 771. $(\frac{2}{1})^{-3}; (0,3)^{-4}$.

Къ § 185. Слѣдующія выраженія изобразить безъ знаменателя:

772. $\frac{1}{a^2b}; \frac{2}{a^3b^4}$. 773. $\frac{3a}{6x}; \frac{x}{3ay^2z^3}$. 774. $\frac{a}{a+x}; \frac{2a}{a-x}$. 775. $\frac{3ab}{(1+x)^2(1-x)^3}$.

Къ § 186. Умноженіе. 776. $a^4 \cdot a^{-4}; x^3 \cdot x^{-2}; x^{-3} \cdot x^2$.

777. $7a^3b^{-1} \cdot 2ab^3$. 778. $4^{\frac{1}{2}}/2a^4x^{-3}y^{-2} \cdot 2a^{-4}x^3y^5$.

779. $5(a+b)^2 \cdot 7(a+b)^{-3}$.

Дѣленіе. 780. $a^3:a^{-1}; x^{-2}:x$. 781. $x^2:x^{-2}; x^{-2}:x^2$.

782. $10a^3b^{-2}:5ab^{-5}$. 783. $25a^{-3}b^{-2}z^2:5a^{-4}b^2x^3$.

Возвышеніе въ степень. 784. $(a^{-2})^4; (a^2)^{-4}; (a^{-2})^{-4}$.

785. $(2a^2b^{-3})^2$. 786. $(\frac{1}{2}x^{-3}y^{-2})^{-2}$. 787. $[3(1-x)^{-2}(1+x)^2]^3$.

788. $(\frac{a^{-2}x^2}{by^{-4}})^2$.

Извлеченіе корня. 789. $\sqrt{a^{-8}}; \sqrt[3]{x^{-6}}; \sqrt{(a+b)^{-2}}$.

790. $\sqrt{4a^{-2}b^4c^{-6}}$. 791. $\sqrt[3]{27x^{-3}y^{-6}z^{18}}$.

Различныя дѣйствія. 792. $\left[\left(\frac{3a^3b^{-2}c^{-3}}{2x^2y} \right)^2 \right]^{-3}$.

793. $\sqrt[3]{3a^{-2}\sqrt{27x^{-12}y^6}}$. 794. $(2a^{-1}-1)(2a^{-1}+1)$.

795. $(a^{-2}-1^{-1})^2$. 796. $[-2(a+x)^{-3}y^5z^{-2}]^2$. 797. $\frac{5a^{-3}b}{7m^3n^{-1}} \cdot \frac{7ab^{-2}}{5m^2n^{-2}}$.

Къ §§ 187 и 188. Изобразить безъ знака радикала слѣдующія выраженія:

798. $\sqrt{a^3}; \sqrt{a}$. 799. $\sqrt[3]{a}; \sqrt[3]{a^2}$. 800. $\sqrt{a+b}; \sqrt[3]{1+x}; \sqrt[3]{(1+x)^2}$.

801. $\sqrt{a^{-1}}; \sqrt{x^{-5}}; \sqrt{x^{-2}}$. 802. $\sqrt[3]{2ab}$. 803. $\sqrt[3]{3a}; \sqrt[3]{2a}$.

804. $5\sqrt{2a}; \sqrt[3]{6b^2x^{-1}}$.

Въ слѣдующихъ выраженіяхъ дробные показатели замѣнить радикалами:

805. $a^{\frac{1}{2}}; a^{\frac{1}{3}}; a^{\frac{2}{3}}$. 806. $a^{-\frac{1}{6}}; a^{-\frac{2}{3}}$. 807. $(1+x)^{\frac{1}{3}}; (1+x)^{\frac{2}{3}}$.

808. $[3a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}(1+x)^{\frac{2}{3}}]^{\frac{3}{5}}$.

Къ § 189. Доказать слѣдующія равенства:

809. $a^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{2}{4}}; a^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{4}{6}}; x^{\frac{3}{4}} = x^{\frac{9}{12}}$.

Къ §§ 190 и 191. Умноженіе. 810. $x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{2}{3}}$. 811. $a^3 \cdot a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{1}{6}}$.

812. $\sqrt[3]{a^2} \cdot a^{\frac{2}{3}}$. 813. $\frac{2a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{3}}}{3m^3x^{\frac{2}{3}}} \cdot \frac{5a^{\frac{1}{3}}x^{\frac{1}{2}}}{2m^{-3}y^{\frac{1}{3}}}$.

Дѣленіе. 814. $a^{\frac{3}{2}} : a^{\frac{1}{2}}; a^{\frac{1}{2}} : a^{\frac{3}{4}}$. 815. $5(a-1)^{\frac{2}{3}} : 2(a-1)^{\frac{1}{3}}$.

816. $20 a^{-2} b^{\frac{2}{3}} c^{\frac{2}{3}} : 4 a^{-3} b^{\frac{1}{3}} c^{\frac{2}{3}}$. 817. $\sqrt[3]{3a^2b} : 4ab^3$.
 Возвышеніе въ степень. 818. $(a^{\frac{3}{4}})^2; (a^{\frac{3}{4}})^{-2}; (a^{\frac{3}{4}})^{\frac{1}{2}}$.
 819. $(a^3)^{\frac{1}{3}}, (a^{-3})^{-\frac{1}{3}}$; 820. $(4a^2b^3)^{\frac{1}{2}}$. 821. $(27a^{-3}b^{\frac{1}{3}}c^{-\frac{1}{3}})^{\frac{1}{3}}$.
 Извлеченіе корня. 822. $\sqrt{a^{\frac{1}{2}}}; \sqrt[3]{a^{-\frac{1}{3}}}$. 823. $\sqrt{(1-x)^{\frac{3}{2}}}$.
 824. $\sqrt[3]{(a+b)^{-\frac{1}{2}}}$. 825. $\sqrt[4]{16a^{-\frac{1}{2}}b^{0,4}}$.
 Различныя дѣйствія. 826. $(a^{\frac{1}{2}}-b^{\frac{1}{2}})^2$. 827. $(x^{\frac{2}{3}}+x^{\frac{1}{3}})(x^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{1}{3}})$.
 828. $(2a^{\frac{1}{3}}+\frac{1}{2}b^{\frac{1}{2}})^2$. 829. $(x^{-\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{4}}-x^{\frac{1}{2}})^2$.
 830. $\left[\frac{c^2d}{(a+b)^{\frac{3}{2}}}\right]^{-\frac{4}{3}} \cdot \sqrt{\left[\frac{a\sqrt{b}}{\sqrt[3]{ab}}\right]^2}$.

ЛОГАРИӨМЫ.

Предварительныя понятія.

192. **Опредѣленіе логаріөма.** Возьмемъ какое-нибудь число, напр. 4, и станемъ его возвышать въ различныя степени, какъ съ положительными, такъ и съ отрицательными показателями, цѣлыми и дробными. Тогда будемъ получать различныя числа; напр.:

$$4^0=1, 4^1=4, 4^2=16, 4^3=64, 4^4=256$$

$$4^{-1}=\frac{1}{4^1}=\frac{1}{4}; 4^{-2}=\frac{1}{4^2}=\frac{1}{16}; 4^{-3}=\frac{1}{4^3}=\frac{1}{64};$$

$$4^{\frac{1}{2}}=\sqrt{4}=2; 4^{\frac{3}{4}}=\sqrt[4]{4^3}=1,587\dots; 4^{\frac{2}{3}}=\sqrt[3]{4^2}=\sqrt[3]{16}=2,519\dots^1)$$

$$4^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{4^{\frac{1}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{4}}=\frac{1}{2}; 4^{-\frac{2}{3}}=\frac{1}{4^{\frac{2}{3}}}=\frac{1}{\sqrt[3]{4^2}}=\frac{1}{2,519\dots}$$

¹⁾ Когда показатели числа дробныя, т.-е. когда они выражаютъ корни какой-нибудь степени, мы условимся брать только *аріөметическія* значенія корней (§ 178).

Условимся называть: число, возвышаемое въ степень,— основаніемъ, результатъ возвышенія въ степень— числомъ и показателя степени—логаріөмомъ.

Такъ, въ равенствѣ $4^3=64$ основаніе есть 4, число 64, а логаріөмъ 64-хъ по основанію 4 есть 3.

Вообще, логаріөмомъ числа N по основанію a наз. **показатель степени, въ которую надо возвысить a , чтобы получить N .**

Значитъ, если говорятъ, что логаріөмъ числа N по основанію a есть x , то это надо понимать, что x удовлетворяетъ равенству: $a^x=N$.

Что логаріөмъ числа N по основанію a есть x , выражаютъ часто такими обозначеніями:

$$\text{Log}_a N=x, \log_a N=x \text{ или } \lg_a N=x,$$

гдѣ знаки Log , \log или \lg представляютъ собою сокращеніе слова «логаріөмъ», а буква (или число), поставленное внизу знака, означаетъ основаніе, по которому взятъ логаріөмъ. Эту букву не пишутъ, если заранѣе извѣстно, какое число взято за основаніе.

Примѣръ. Если за основаніе взять число 4, то, какъ видно изъ написанныхъ выше равенствъ:

$$\log 1=0; \log 4=1; \log 16=2; \log 64=3; \log 256=4;$$

$$\log \frac{1}{4}=-1; \log \frac{1}{16}=-2; \log \frac{1}{64}=-3;$$

$$\log 2=\frac{1}{2}; \log 1,587\dots=\frac{1}{3}; \log 2,519\dots=\frac{2}{3};$$

$$\log \frac{1}{2}=-\frac{1}{2}; \log 0,39\dots=-\frac{2}{3} \text{ и т. п.}$$

Подобно этому найдемъ, что если основаніе равно 10, то: $\log 10=1, \log 100=2, \log 1000=3; \log 0,1=-1, \log 0,01=-2; \log 0,001=-3; \text{ и т. д.}$

Нѣкоторыя свойства логаріөмовъ.

193. 1. При всякомъ основаніи (не равномъ 1) логаріөмъ самого основанія равенъ 1, а логаріөмъ 1 есть 0.

Напр., если основание есть 10, то $\log 10=1$, потому что $10^1=10$, и $\log 1=0$, потому что $10^0=1^1$).

2. При положительномъ основаніи отрицательныя числа не имѣютъ логарисмовъ.

Напр., если основание есть положительное число 10, то въ какую бы степень мы ни возвышали это основаніе, никогда не получимъ никакого отрицательнаго числа.

$$\text{Такъ: } 10^2=100, 10^{-2}=1/100, 10^{\frac{1}{2}}=\sqrt{10}=3,16228\dots$$

$$10^{-\frac{1}{2}}=1 : 10^{\frac{1}{2}}=1 : 3,16228\dots=0,316\dots$$

3. При всякомъ положительномъ основаніи (не равномъ 1) для всякаго положительнаго числа можетъ быть найденъ логарисмъ, точный или приближенный (съ какою угодно степенью точности) ¹⁾.

Если, напр., за основаніе возьмемъ положительное число 10, то какое бы положительное число мы ни взяли, хотя бы очень большое или очень малое, всегда можно найти такого показателя x , при которомъ 10^x или равно взятому числу, или отличается отъ него такъ мало, какъ угодно. Предложеніе это мы примемъ безъ доказательства.

Замѣтимъ, что способы находить логарисмы разныхъ чиселъ при данномъ основаніи указываются вышей математикой.

4. Когда основаніе больше 1, то бѣльшему логарисму соотвѣтствуетъ бѣльшее число (и обратно).

Такъ, если основаніе 10, а 4 и 3 будутъ два логарисма, то число, соотвѣтствующее первому логарисму ($10^4=10000$), больше числа, соотвѣтствующаго второму логарисму ($10^3=1000$).

¹⁾ Если бы основаніе было равно 1, то логарисмъ основанія былъ бы равенъ любому числу, такъ какъ 1 въ какой угодно степени даетъ 1.

²⁾ Такъ какъ въ этой книгѣ мы ограничиваемся числами только *соизмѣримыми*, то здѣсь нельзя утверждать, что всякое положительное число имѣетъ *точный* логарисмъ.

5. Логарисмъ произведенія равенъ суммѣ логарисмовъ сомножителей.

Д о к. Пусть N, N_1, N_2 будутъ какія-нибудь числа, имѣющія соотвѣтственно логарисмы: x, x_1, x_2 по одному и тому же основанію a . Тогда:

$$N=a^x, N_1=a^{x_1}, N_2=a^{x_2}.$$

Перемноживъ эти равенства, получимъ:

$$NN_1N_2=a^x a^{x_1} a^{x_2}=a^{x+x_1+x_2}.$$

Откуда: $\log (NN_1N_2)=x+x_1+x_2$.

Но $x=\log N, x_1=\log N_1, x_2=\log N_2$.

Поэтому: $\log (NN_1N_2)=\log N+\log N_1+\log N_2$.

6. Логарисмъ дроби равенъ логарисму числителя безъ логарисма знаменателя.

Д о к. Раздѣлимъ почленно два равенства:

$$N=a^x, N_1=a^{x_1}.$$

Тогда получимъ: $\frac{N}{N_1}=\frac{a^x}{a^{x_1}}=a^{x-x_1}$.

Откуда: $\log \frac{N}{N_1}=x-x_1=\log N-\log N_1$.

7. Логарисмъ степени равенъ логарисму возвышаемаго числа, умноженному на показателя степени.

Д о к. Возвысимъ обѣ части равенства $N=a^x$ въ n -ую степень:

$$N^n=(a^x)^n=a^{xn}.$$

Откуда: $\log N^n=xn=(\log N)n$.

8. Логарисмъ корня равенъ логарисму подкореннаго числа, дѣленному на показателя корня.

Д о к. Извлечемъ корень n -ой степени изъ обѣихъ частей равенства $N=a^x$.

$$\sqrt[n]{N}=\sqrt[n]{a^x}=a^{\frac{x}{n}}.$$

Откуда: $\log \sqrt[n]{N}=\frac{x}{n}=\frac{\log N}{n}$.

194. Логарифмирование алгебраическаго выраженія. Логарифмировать данное алгебраическое выраженіе значитъ выразить логарифмъ его посредствомъ логарифмовъ отдѣльныхъ чиселъ, оставляющихъ выраженіе. Пусть требуется логарифмировать слѣдующее выраженіе, которое обозначимъ одною буквою N :

$$N = \frac{3a^2 \sqrt[3]{b \sqrt{x}}}{4m^3 \sqrt[6]{y}}$$

Замѣтивъ, что это выраженіе представляетъ собою дробь, пишемъ, на основаніи свойства 6-го:

$$\log N = \log \left(3a^2 \sqrt[3]{b \sqrt{x}} \right) - \log \left(4m^3 \sqrt[6]{y} \right).$$

Затѣмъ, примѣняя свойство 5-е, получимъ:

$$\log N = \log 3 + \log a^2 + \log \sqrt[3]{b \sqrt{x}} - \log 4 - \log m^3 - \log \sqrt[6]{y}.$$

и далѣе, на основаніи свойствъ 7 и 8:

$$\begin{aligned} \log N &= \log 3 + 2 \log a + \frac{1}{2} \log (b \sqrt{x}) - \log 4 - 3 \log m - \frac{1}{6} \log y = \\ &= \log 3 + 2 \log a + \frac{1}{2} \left(\log b + \frac{1}{2} \log x \right) - \log 4 - 3 \log m - \frac{1}{6} \log y = \\ &= \log 3 + 2 \log a + \frac{1}{2} \log b + \frac{1}{4} \log x - \log 4 - 3 \log m - \frac{1}{6} \log y. \end{aligned}$$

Логарифмировать можно только такія выраженія, которыя представляютъ собою произведеніе, частное, степень или корень, но не сумму и не разность, такъ какъ мы не имѣемъ такихъ свойствъ логарифмовъ, которыя выражали бы, чему равняется логарифмъ суммы или логарифмъ разности.

Умѣя логарифмировать алгебраическія выраженія, мы можемъ, обратно, по данному результату логарифмирования

найти выраженіе x , которое при логарифмировании даетъ этотъ результатъ; такъ, если

$$\log x = \log a + \log b - 3 \log c - \frac{1}{2} \log d,$$

то на основаніи тѣхъ же теоремъ не трудно найти, что искомое выраженіе будетъ

$$x = \frac{ab}{c^3 \sqrt{d}}.$$

Десятичные логарифмы.

195. Польза логарифмическихъ таблицъ.

Имѣя таблицы, въ которыхъ помѣщены логарифмы цѣлыхъ чиселъ, вычисленные по одному и тому же основанію, отъ 1 до какого-нибудь большого числа, мы можемъ производить надъ числами дѣйствія умноженія, дѣленія, возвышенія въ степень и извлеченія корня проще, чѣмъ обыкновеннымъ путемъ. Положимъ, напр., что надо вычислить $\sqrt[3]{ABC}$, гдѣ A , B и C какія-нибудь данныя цѣлыя числа. вмѣсто того, чтобы производить умноженіе и затѣмъ извлеченіе кубическаго корня, мы можемъ, пользуясь таблицами логарифмовъ, найти сначала $\log \sqrt[3]{ABC}$, основываясь на разложеніи:

$$\log \sqrt[3]{ABC} = \frac{1}{3} (\log A + \log B + \log C).$$

Найдя въ таблицахъ отдѣльно $\log A$, $\log B$ и $\log C$, сложивъ ихъ и раздѣливъ сумму на 3, получимъ $\log \sqrt[3]{ABC}$. По этому логарифму, пользуясь тѣми же таблицами, можемъ найти соотвѣтствующее число.

196. На практикѣ употребительны таблицы логарифмовъ, вычисленныхъ при основаніи 10. Такіе логарифмы называются обыкновенными или десятичными:

по имени шотландскаго математика Бригга, введеннаго (въ началѣ XVII столѣтія) эти логарисмы въ употребленіе, они называются также Бригговыми логарисмами.

Чтобы понять устройство и употребленіе этихъ таблицъ, предварительно рассмотримъ пѣкоторые свойства десятичныхъ логарисмовъ.

1. Свойства десятичныхъ логарисмовъ чиселъ, большихъ 1.

197. 1. Логарисмъ цѣлаго числа, изображаемаго 1-ею съ нулями, т.-е. 10, 100, 1000 и т. д., есть цѣлое число, заключающее столько единицъ, сколько нулей въ числѣ.

Дѣйствительно, такъ какъ:

$$10^1=10, 10^2=100, 10^3=1000, 10^4=10000\dots$$

и вообще: $10^m = 100\dots 0$,
то $\log 10=1, \log 100=2, \log 1000=3, \log 10000=4\dots$

и вообще: $\log 100\dots 0 = m$.

II. Логарисмъ цѣлаго числа, не изображаемаго 1-ею съ нулями, можетъ быть выраженъ только приближенно.

Обыкновенно выражаютъ его въ видѣ десятичной дроби съ 5-ю десятичными знаками (значить, съ точностью до одной, и даже до половины, стотысячной доли). Цѣлое число логарисма наз. его характеристикой, а дробная десятичная часть — мантиссой. Если, напр., приближенный логарисмъ какого-нибудь числа есть 2,36547, то 2 есть характеристика, а 0,36547 мантисса.

III. Характеристика логарисма цѣлаго числа или цѣлаго числа съ дробью содержитъ столько единицъ, сколько въ цѣлой части числа находится цифръ безъ одной.

Возьмемъ, напр., число 5683,72. Такъ какъ:

$$10000 > 5683,72 > 1000,$$

то $\log 10000 > \log 5683,72 > \log 1000,$

т.-е. $4 > \log 5683,72 > 3,$

значить, $\log 5683,72 = 3 + \text{полож. правильная дробь},$

т.-е. характеристика $\log 5683,72 = 3.$

Подобнымъ образомъ убѣдимся, что характ. $\log 7,3 = 0,$ характ. $\log 28\frac{3}{4} = 1,$ характ. $\log 4569372 = 6$ и т. п.

2. Свойства десятичныхъ логарисмовъ чиселъ, меньшихъ 1.

198. Предварительное замѣчаніе. Всякое число¹⁾, меньшее 1, можно выразить правильною дробью $\frac{a}{b}$. Такъ какъ

$$\log \frac{a}{b} = \log a - \log b$$

и $\log a < \log b,$

то логарисмъ всякаго числа, меньшаго единицы, есть отрицательное число; значить, онъ состоитъ изъ отрицательной характеристики и отрицательной мантиссы. На практикѣ однако предпочитаютъ преобразовывать такіе логарисмы такъ, чтобы у нихъ отрицательной была только одна характеристика. Чтобы у отрицательнаго логарисма сдѣлать мантиссу положительной, достаточно прибавить къ его мантиссѣ положительную единицу, а къ характеристикѣ отрицательную единицу (отчего, конечно, величина ло-

¹⁾ Здѣсь рѣчь идетъ только о числахъ соизмѣримыхъ.

гарифма не измѣнится). Если, напр., мы имѣемъ отрицательный логариомъ $-2,08734$, то можемъ написать:

$$\begin{aligned} -2,08734 &= -2 - 0,08734 = -2 - 1 + 1 - 0,08734 = \\ &= -2 - 1 + (1 - 0,08734) = -3 + 0,91266 \end{aligned}$$

или сокращенно: $-2,08734 = \overset{-1+1}{-2,08734} = 3,91266$.

Для указанія того, что у логариома отрицательна только одна характеристика, ставятъ надъ ней минусъ; такъ, вмѣсто того, чтобы писать: $-3 + 0,91266$, пишутъ короче: $\bar{3},91266$ ¹⁾.

Для обратнаго преобразованія, т. е. чтобы логариомъ съ отрицательной характеристикой и положительной мантиссой превратить въ отрицательный, достаточно приложить къ мантиссѣ отрицательную единицу, а къ характеристикѣ положительную; такъ:

$$\begin{aligned} \bar{7},83026 &= -7 + 0,83026 = -7 + 1 - 1 + 0,83026 = (-7 + 1) - \\ &- (1 - 0,83026) = -6 - 0,16974 = -6,16974, \end{aligned}$$

или сокращенно: $\bar{7},83026 = \overset{+1-1}{\bar{7},83026} = -6,16974$.

199. Свойства. I. Если десятичная дробь выражается 1-ю съ предшествующими нулями (0,1; 0,01; 0,001; и т. д.), то логариомъ ея состоитъ изъ одной характеристики, содержащей столько отрицательныхъ единицъ, сколько есть нулей въ изображеніи десятичной дроби, считая въ томъ числѣ и 0 цѣлыхъ.

Дѣйствительно, такъ какъ:

$$10^{-1} = \frac{1}{10} = 0,1; \quad 10^{-2} = \frac{1}{10^2} = 0,01; \quad 10^{-3} = \frac{1}{10^3} = 0,001; \quad \text{и т. д.}$$

то $\log 0,1 = -1$; $\log 0,01 = -2$; $\log 0,001 = -3$ и т. д.

II. Логариомъ всякой другой правильной десятичной дроби, если его мантисса сдѣлана положительной, содер-

¹⁾ Такое число проносятся такъ: 3 съ минусомъ 91266.

жить въ характеристикѣ столько отрицательныхъ единицъ, сколько есть нулей въ изображеніи десятичной дроби передъ первой значащей цифрой, считая въ томъ числѣ и 0 цѣлыхъ.

Возьмемъ, напр., дробь 0,00035, у которой передъ первой значащей цифрой стоятъ 4 нуля, считая въ томъ числѣ и 0 цѣлыхъ. Тогда очевидно, что:

$$\overset{3 \text{ нуля}}{0,001} > \overset{4 \text{ нуля}}{0,00035} > \overset{4 \text{ нуля}}{0,0001}.$$

Слѣдовательно: $\log 0,001 > \log 0,00035 > \log 0,0001$, т. е.

$$-3 > \log 0,00035 > -4.$$

Такъ какъ изъ двухъ чиселъ: -3 и -4 послѣднее меньше перваго, то можно положить, что:

$$\log 0,00035 = -4 + \text{полож. прав. дробь.}$$

Значитъ, х а р а к т. $\log 0,00035 = -4$ (при положительной мантиссѣ).

Подобнымъ же образомъ можемъ убѣдиться, что

$$\text{х а р. } \log 0,25 = -1, \quad \text{х а р. } \log 0,000048 = -5 \text{ и т. п.}$$

3. Свойство десятичныхъ логариомовъ всякихъ чиселъ.

200. Если какое-либо число умножимъ или раздѣлимъ на 10, 100, 1000 и т. д., то положительная мантисса логариома не измѣнится.

Напр., умножимъ или раздѣлимъ число N на 1000; тогда

$$\log (N \cdot 1000) = \log N + \log 1000 = \log N + 3$$

и $\log \frac{N}{1000} = \log N - \log 1000 = \log N - 3$.

Такъ какъ въ суммѣ $\log N + 3$ цѣлое число 3 прибавляется, очевидно, къ характеристикѣ, а не къ мантиссѣ, и въ разности $\log N - 3$ это цѣлое число можно всегда вычитать также изъ характеристики, то ясно, что мантисса у $\log (N \cdot 1000)$ и у $\log (N : 1000)$ та же самая, что и у $\log N$.

Слѣдствія. 1) Положительная мантисса логариема десятичнаго числа не измѣняется отъ перенесенія въ числѣ запятой, потому что перенесеніе запятой равносильно умноженію или дѣленію на 10, 100, 1000 и т. д. Такимъ образомъ, логариемы чиселъ :

0,00423, 0,0423, 0,423, 4,23, 423

отличаются только характеристиками, но не мантиссами, при условіи, что всѣ мантиссы положительны.

2) Мантиссы чиселъ, имѣющихъ одну и ту же значащую часть, не отличающихся только нулями на концѣ, одинаковы; такъ, логариемы чиселъ: 23, 230, 2300, 23000 отличаются только характеристиками.

Замѣчаніе. Характеристику логариема цѣлаго числа, и десятичной дроби мы можемъ находить безъ помощи таблицъ; вслѣдствіе этого въ логариемическихъ таблицахъ помѣщаются только однѣ мантиссы; кромѣ того, такъ какъ нахожденіе логариемовъ дробей сводится къ нахожденію логариемовъ цѣлыхъ чиселъ (логариемъ дроби = логариему числителя безъ логариема знаменателя), то въ таблицахъ помѣщаются мантиссы логариемовъ только цѣлыхъ чиселъ.

Устройство и употребленіе таблицъ.

201. Устройство таблицъ. Опишемъ вкратцѣ устройство и употребленіе пятизначныхъ таблицъ, изданныхъ Пржевальскимъ, какъ наиболѣе употребительныхъ въ курсѣ среднихъ учебныхъ заведеній. Эти таблицы содержатъ логариемы чиселъ отъ 1 до 10009.

На первой страницѣ помѣщены числа отъ 1 до 100 въ столбцахъ съ надписью N (n и m e g u — число). Противъ каждого числа, въ столбцахъ съ надписью Log , находятся мантиссы, вычисленные съ 5-ю десятичными знаками.

Слѣдующія страницы устроены иначе. Въ первомъ столбцѣ подъ рубрикою N , помѣщены числа отъ 100 до 1000, а ря-

домъ съ ними въ столбцѣ, надъ которымъ стоитъ цифра 0, находятся соответствующія мантиссы; первыя двѣ цифры мантиссы, общія нѣсколькимъ логариемамъ, написаны только разъ, а остальные три цифры помѣщены рядомъ съ числомъ, находящимся въ столбцѣ N . Эти же мантиссы принадлежатъ и числамъ, которыя получаютъ, если къ числамъ, стоящимъ подъ рубрикою N , приписать справа 0. Такъ, мантисса логар. 5690 будетъ та же, что и у числа 569, т.-е. 75511 (стран. 17-я). Слѣдующіе столбцы съ надписями надъ ними: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, служатъ для нахожденія логариемовъ четырехзначныхъ чиселъ (и пятизначныхъ до 10009), оканчивающихся на эти значащія цифры, причемъ первыя три цифры каждого изъ этихъ чиселъ помѣщены въ столбцѣ N , а послѣднюю надо искать наверху, въ ряду цифръ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Такъ, чтобы найти мантиссу логариема числа 5673, надо отыскать въ столбцѣ N число 567 (стран. 17) и наверху цифру 3; въ пересѣченіи горизонтальной линіи, идущей отъ 567, съ вертикальной линіей, опущенной отъ цифры 3, находятся три послѣднихъ цифры мантиссы (381), первыя же ея цифры надо искать въ столбцѣ подъ цифрою 0 на одной горизонтальной линіи, или выше; такъ, для числа 5673 первыя двѣ цифры мантиссы будутъ 75, а послѣднія 381, такъ что всѣ пять знаковъ будутъ 75381. Если передъ послѣдними тремя цифрами мантиссы стоитъ въ таблицахъ звѣздочка, то это значитъ, что первыя двѣ цифры надо брать и въ горизонтальной линіи, на которой расположены послѣднія цифры мантиссы. Такъ, для числа 5758 мантисса будетъ 76027 (стран. 17).

202. По данному десятичному числу найти логариемъ. Характеристику логариема цѣлаго числа или десятичной дроби мы выставляемъ непосред-

ственно, руководствуясь указанными нами свойствами десятичных логарифмовъ.

При нахожденіи мантииссы мы примемъ во вниманіе, что положеніе запятой въ десятичномъ числѣ, а также и число нулей на концѣ цѣлаго числа, не оказываютъ вліянія на мантииссу (§ 200, слѣдствія); поэтому мы можемъ отбросить запятую въ десятичной дроби и въ цѣломъ числѣ зачеркнуть всѣ нули, если они есть на концѣ числа. Тогда могутъ представиться слѣдующіе 2 случая.

1) Цѣлое число не превосходитъ 10009. Тогда мантиисса находится прямо изъ таблицъ. Приведемъ примѣры:

$$\begin{aligned} \text{Log } 82 &= 1,91381; & \text{Log } 0,082 &= \bar{2},91381 \text{ (стран. 1);} \\ \text{Log } 2560 &= 3,40824; & \text{Log } 256000 &= 5,40824 \text{ (стран. 7);} \\ \text{Log } 7416 &= 3,87017; & \text{Log } 74,16 &= 1,87017 \text{ (стран. 23).} \end{aligned}$$

Въ этомъ случаѣ найденная мантиисса будетъ точна до $\frac{1}{2}$ стотысячной доли.

2) Цѣлое число превосходитъ 10009. Тогда мантиисса находится на основаніи слѣдующей истины, которую мы примемъ безъ доказательства:

если числа болѣе 1000, и разности между ними не превосходятъ 1, то безъ чувствительной ошибки можно принять, что разности между числами пропорціональны разностямъ между ихъ логарифмами.

Принявъ это, положимъ, что требуется найти логарифмъ числа 74,2354, которое, по отбрасываніи запятой, даетъ цѣлое число, превосходящее 10009.

Перенесемъ въ немъ запятую на столько знаковъ, чтобы въ цѣлой части образовалось наибольшее число, какое только можно найти въ таблицахъ; въ нашемъ примѣрѣ

для этого достаточно перенести запятую вправо на два знака. Теперь будемъ искать

$$\text{Log } 7423,54 = ?$$

Выписываемъ изъ таблицъ (стран. 23) мантииссу логарифма числа 7423 и находимъ такъ называемую т а б л и ч н у ю разность, т.е. разность между взятой мантииссой и слѣдующей болѣе (соотвѣтствующей числу 7424). Для этого вычитаемъ (въ умѣ) изъ 064 (изъ трехъ послѣднихъ цифръ мантииссы числа 7424) число 058 (три послѣднія цифры мантииссы числа 7423); находимъ 6 (стотысячн.). Значить:

$$\text{Log } 7423 = 3,87058;$$

$$\text{Log } 7424 = 3,87058 + 6 \text{ (стотыс.).}$$

Обозначимъ буквою Δ то неизвѣстное число стотысячныхъ, которое надо приложить къ $\text{Log } 7423$, чтобы получить $\text{Log } 7423,54$; тогда можемъ написать:

$$\text{Log } 7423,54 = 3,87058 + \Delta \text{ (стотыс.).}$$

Изъ этихъ равенствъ мы видимъ, что если число 7423 увеличится на 1, то логарифмъ его увеличится на 6 (стотыс.), а если то же число увеличится на 0,54 то логарифмъ его увеличится на Δ (стотыс.).

На основаніи указанной выше пропорціональности можемъ написать пропорцію:

$$\Delta : 6 = 0,54 : 1; \text{ откуда: } \Delta = 6 \cdot 0,54 = 3,24 \text{ (стотыс.).}$$

Приложивъ къ 3,87058 найденную разность, мы найдемъ $\text{Log } 7423,54$. Такъ какъ мы ограничиваемся 5-ю десятичными знаками мантииссы, то въ числѣ 3,24 можемъ отбросить цифры 2 и 4, представляющія собою миллионныя и десяти-миллионныя доли; при этомъ, для уменьшенія ошибки, будемъ всегда руководствоваться слѣдующимъ правиломъ: если отбрасываемая часть больше (или равна) 5 миллионныхъ, то, отбрасывая ее, мы увеличимъ на 1 оставшеяся

число сотысячныхъ; въ противномъ же случаѣ оставимъ число сотысячныхъ безъ измѣненія. Такимъ образомъ:

$$\text{Log } 7423,54 = 3,87058 + 3 \text{ сотыс.} = 3,87061.$$

Такъ какъ $\text{Log } 74,2354$ долженъ имѣть ту же самую мантиссу, а характеристика его должна быть 1, то

$$\text{Log } 74,2354 = 1,87061.$$

Правило. Чтобы найти мантиссу даннаго цѣлаго числа, имѣющаго 5 или болѣе цифръ, выписываютъ изъ таблицъ мантиссу числа, составленнаго первыми 4 цифрами даннаго числа, и къ ней прибавляютъ произведеніе табличной разности на десятичную дробь, образованную остальными цифрами даннаго числа, при чемъ вмѣсто точной величины этого произведешя берутъ ближайшее къ нему цѣлое число.

203. По данному логариему найти десятичное число. Пусть требуется найти число, котораго логариемъ равенъ $\bar{1},51001$. Не обращая пока вниманія на характеристику, отыскиваемъ въ таблицахъ сначала первыя двѣ цифры мантиссы, а потомъ и остальные три. Оказывается, что въ таблицахъ есть мантисса 51001, соответствующая числу 3236. Принявъ во вниманіе характеристику, окончательно пишемъ:

$$\bar{1},51001 = \text{Log } 0,3236.$$

Чаще случается, что данная мантисса не находится въ таблицахъ. Пусть напр., намъ данъ логариемъ, у котораго мантисса есть 59499, не встрѣчающагося въ таблицахъ, и какая-нибудь характеристика (напр., 2). Тогда искомое число можно найти простымъ вычисленіемъ, подобнымъ тому, которымъ мы находили логариемъ числа, не помѣщающагося въ таблицахъ.

Предположимъ сначала, что характеристика даннаго логариема есть 3, т.е. что данный логариемъ есть 3,59499. Беремъ изъ таблицъ мантиссу 59494, ближайшую меньшую

къ данной, выписываемъ четырехзначное число 3935, соответствующее ей, и опредѣляемъ (вычитаніемъ въ умѣ) табличную разность 12 (сотыс.) между взятой мантиссой и слѣдующей болѣе (соответствующей числу 3936). Такимъ образомъ:

$$3,59494 = \text{Log } 3935;$$

$$3,59494 + 12 \text{ сотыс.} = \text{Log } 3936.$$

Опредѣлимъ еще разность 5 (сотыс.) между данной мантиссой (59499) и мантиссой, взятой изъ таблицъ (59494) и обозначимъ буквою h ту неизвѣстную дробь, которую надо приложить къ числу 3935, чтобы логариемъ его увеличился на 5 (сотыс.). Тогда

$$3,59494 + 5 \text{ сотыс.} = \text{Log } (3935 + h).$$

Изъ этихъ 3-хъ равенствъ усматриваемъ, что если логариемъ увеличивается на 12 (сотыс.), то соответствующее число увеличивается на 1, а если логариемъ увеличивается на 5 (сотыс.), то число увеличивается на h . На основаніи допущенной нами пропорціональности можемъ написать:

$$12 \cdot 5 = 1 : h \text{ откуда: } h = \frac{5}{12} = 0,4\dots$$

Значитъ, число, соответствующее логариему 3,59499, равно, $3935 + 0,4\dots = 3935,4\dots$; а такъ какъ характеристика даннаго логариема есть 2, а не 3, то искомое число равно 393,54..., такъ что можно написать:

$$2,59499 = \text{Log } 393,54\dots$$

$$x = N \text{ Log } 2,59499 = 393,54\dots$$

Правило. Чтобы найти число по данному логариему, сначала находятъ въ таблицахъ ближайшую меньшую мантиссу и соответствующее ей четырехзначное число; затѣмъ къ этому числу прибавляютъ частное, выраженное десятичной дробью, отъ дѣленія разности между данной мантиссой и ближайшей меньшей на соответствующую

табличную разность¹⁾; наконецъ, въ полученномъ числѣ ставить запятую сообразно характеристикѣ даннаго логариема.

204. Дѣйствія надъ логариемами съ отрицательными характеристиками. Сложене и вычитаніе не представляютъ никакихъ затрудненій, какъ это видно изъ слѣдующихъ примѣровъ:

$$\begin{array}{r} \bar{2},97346 \\ + 1,83027 \\ \hline 0,80373 \end{array} \quad \begin{array}{r} \bar{3},73846 \\ + 5,98043 \\ \hline \bar{7},71889 \end{array} \quad \begin{array}{r} \bar{1},03842 \\ - 5,96307 \\ \hline \bar{7},07535 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0,00523 \\ - 4,57365 \\ \hline 3,43158 \end{array}$$

Не представляетъ никакихъ затрудненій также и умноженіе логариема на положительное число; напр.:

$$\begin{array}{r} \bar{3},58376 \\ \times 9 \\ \hline \bar{22},25384 \end{array} \quad \begin{array}{r} \bar{2},47356 \\ \times 34 \\ \hline 189424 \\ 142068 \\ \hline 16,10104 \\ -68 \\ \hline 52,10104 \end{array}$$

Въ послѣднемъ примѣрѣ отдѣльно умножена положительная мантисса на 34, затѣмъ отрицательная характеристика на 34.

Если логариемъ съ отриц. характеристикой и полож. мантиссой умножается на отрицательное число, то поступаютъ двояко: или предварительно данный логариемъ обращаютъ въ отрицательный, или же умножаютъ отдѣльно мантиссу и характеристику, и результаты соединяютъ вмѣстѣ; напр.:

- 1) $\bar{3},56327 \cdot (-4) = -2,43673 \cdot (-4) = 9,74692.$
- 2) $\bar{3},56327 \cdot (-4) = +12 - 2,25308 = 9,74692.$

¹⁾ Число это достаточно вычислить съ точностью до $\frac{1}{2}$ десятой, такъ какъ бѣлая точность все равно не достигается.

При дѣленіи могутъ представиться два случая: 1) отрицательная характеристика дѣлится и 2) не дѣлится на дѣлителя. Въ первомъ случаѣ отдѣльно дѣлятъ характеристику и мантиссу:

$$\bar{10},37846 : 5 = \bar{2},07569.$$

Во второмъ случаѣ прибавляютъ къ характеристикѣ столько отрицательныхъ единицъ, чтобы образовавшееся число дѣлилось на дѣлителя; къ мантиссѣ прибавляютъ столько же положительныхъ единицъ:

$$\bar{3},76081 : 8 = (-8 + 5,76081) : 8 = \bar{1},72010.$$

Это преобразование надо совершать въ умѣ, такъ что дѣйствіе располагается такъ:

$$\bar{3},76081 : 8 = \bar{1},72010 \text{ или } \bar{3},76081 \overline{)8} \underline{1,72010}$$

205. Примѣры вычисленій помощью логариемовъ.

Примѣръ I. Вычислить выраженіе:

$$x = \frac{\sqrt[3]{A} \cdot B^4}{C^3 \cdot \sqrt[3]{D}}$$

если $A=0,821573$, $B=0,04826$, $C=0,0051275$ и $D=7,24635$.

Логариемуемъ данное выраженіе:

$$\text{Log } x = \frac{1}{3} \text{Log } A + 4 \text{Log } B - 3 \text{Log } C - \frac{1}{3} \text{Log } D.$$

Теперь производимъ вычисленіе $\text{Log } x$ и затѣмъ x :

Предварительныя вычисленія.

A) Числу 8215 соответствуетъ въ таблицахъ мантисса 91461, при чемъ табличная разность есть 5 (стотыс.). Произведеніе этой разности на 0,73 составляетъ 3,65. Ближайшее къ этому произведенію цѣлое число есть 4 (стотыс.).

Значить, искомая мантисса должна быть $91461+4=91465$ (стотыс.). Поэтому

$$\text{Log } 0,821573 = \bar{1},91465 \text{ и } \frac{1}{3} \text{Log } 0,821573 = \bar{1},97155.$$

В) Изъ таблицъ находимъ:

$$\text{Log } 0,0482 = \bar{2},68359 \text{ и потому } 4 \text{ Log } 0,0482 = \bar{6},73436.$$

С) Числу 5127 соотвѣтствуетъ въ таблицахъ мантисса 70986, при чемъ табличная разность есть 9 (стотыс.). Произведение ея на 0,5 равно 4,5 (стотыс.); ближайшее цѣлое число равно 5 (стотыс.). Значить, искомая мантисса должна быть $70986+5=70991$. Поэтому

$$\text{Log } 0,0051275 = \bar{3},70991 \text{ и } 3 \text{ Log } 0,0051275 = \bar{7},12973.$$

Д) Числу 7246 соотвѣтствуетъ въ таблицахъ мантисса 86010, при чемъ табличная разность равна 6 (стотыс.). Произведение ея на 0,35 составляетъ 2,10 (стотыс.); ближайшее цѣлое число есть 2 (стотыс.). Значить, искомая мантисса должна быть $86010+2=86012$ и потому

$$\text{Log } 7,24635 = 0,86012 \text{ и } \frac{1}{3} \text{Log } 7,24635 = 0,28671.$$

Окончательныя вычисления.

$$\begin{array}{r} \frac{1}{3} \text{Log } A = \bar{1},97155 \\ + \quad 4 \text{ Log } B = \bar{6},73436 \\ \hline \bar{6},70591 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \text{ Log } C = \bar{7},12973 \\ + \frac{1}{3} \text{Log } D = 0,28671 \\ \hline \bar{7},41644 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \bar{6},70591 \\ - \bar{7},41644 \\ \hline \text{Log } x = 1,28947 \end{array}$$

Въ таблицахъ ближайшая меньшая мантисса есть 28937; ей соотвѣтствуетъ число 1947, при чемъ табличная разность равна 22, а разность между данной мантиссой и ближайшей меньшей есть 10. Частное отъ дѣленія второй

на первую составляетъ 0,5. Значить, искомое число (принимая во вниманіе характеристику) есть:

$$x = 19,475.$$

Примѣръ 2. Вычислить

$$x = (-2,31)^3 \sqrt[5]{72} = -(2,31)^3 \sqrt[5]{72}.$$

Такъ какъ искомое число отрицательное, а отрицательныя числа не имѣютъ логарифмовъ, то предварительно находимъ положительное число $y = (2,31)^3 \sqrt[5]{72}$, а потомъ и x .

$$\text{log } y = 3 \text{ log } 2,31 + \frac{1}{5} \text{ log } 72$$

$$\text{log } 2,31 = 0,36361$$

$$3 \text{ log } 2,31 = 1,09083$$

$$\text{log } 72 = 1,85733$$

$$\frac{1}{5} \text{ log } 72 = 0,37147$$

$$\text{log } y = 1,46230$$

Въ таблицахъ ближайшая меньшая мантисса есть 46225, соотвѣтствующая числу 2899, при чемъ табличная разность равна 15. Разность между данной мантиссой и ближайшей меньшей составляетъ 5. Частное отъ дѣленія второй на первую равно 0,3. Значить:

$$y = 28,993 \text{ и } x = -28,993.$$

Примѣръ 3. Вычислить $x = \sqrt[3]{\sqrt[5]{8} + \sqrt[4]{3}}$.

Сплошного логарифмированія здѣсь примѣнить нельзя, такъ какъ подъ знакомъ корня стоитъ сумма. Въ подобныхъ случаяхъ вычисляютъ формулу по частямъ. Сначала находимъ $N = \sqrt[5]{8}$, потомъ $N_1 = \sqrt[4]{3}$; далѣе простымъ сложениемъ определяемъ $N + N_1$ и, наконецъ, вычисляемъ $\sqrt[3]{N + N_1}$.

$$\text{log } N = \frac{3}{5} \text{ log } 8 = 0,18062; N = 1,5157.$$

$$\text{log } N_1 = \frac{1}{4} \text{ log } 3 = 0,11928; N_1 = 1,3160;$$

$$N + N_1 = 2,8317.$$

$$\text{log } \sqrt[3]{N + N_1} = \frac{1}{3} \text{ log } 2,8317 = 0,15068; \sqrt[3]{N + N_1} = 1,4147.$$

Упражнения.

Къ § 192. **831.** Написать при помощи знака \log слѣдующія равенства: $10^0=1$; $10^1=10$; $10^2=100$; $100^{-2}=0,01$; $a^x=N$.

832. Переписать безъ знака \log слѣдующія равенства: $\log_{10} 1000=3$; $\log_{10} 0,001=-3$; $\log_{16} 4=1/2$; $\log_a P=y$.

833. Если за основаніе взять 16, то какіе логарифмы будутъ у слѣдующихъ чиселъ: 16, 256, $1/16$, $1/256$, 4, $1/4$, 2, $1/2$.

834. Если основаніе равно 10, то какіе логарифмы будутъ у слѣдующихъ чиселъ: 10, 100, 1000, 10000; 0,1; 0,01, 0,001; 0,0001.

835. Найти: $\log_2 4096$; $\log_4 4096$; $\log_8 4096$; $\log_{16} 4096$; $\log_8 8$; $\log_{64} 8$; $\log_{512} 8$.

Къ § 194. Логарифмировать слѣдующія выраженія:

836. $\log(a^2b^3)$. **837.** $\log(5a^3x^2)$. **838.** $\log(mn)^3$. **839.** $\log \frac{2a^2}{3b^3}$.

840. $\log \frac{4a^3b^{-3}}{5mn^2x^{\frac{1}{2}}}$. **841.** $\log \sqrt{ab}$. **842.** $\log \sqrt[3]{7a^3b}$.

843. $\log(4\sqrt[5]{2ab^3})$. **844.** $\log(7a^3b\sqrt[3]{c})$. **845.** $\log \sqrt[4]{10a^3b^2}$.

846. $\log \sqrt[3]{a\sqrt{b}\sqrt[5]{c}}$. **847.** $\log \frac{a^2\sqrt[3]{2b}}{8x^3y^2}$.

848. $\log(a^2-b^2)$. **849.** $\log(a-b)^2$.

Найти выраженіе x , если его логарифмъ равенъ:

850. $\log x = \log a + \log b$. **851.** $\log x = \log a - \log b$. **852.** $\log x = 2 \log a$. **853.** $\log x = 2 \log a + 3 \log b - \log c$. **854.** $\log x = 1/2 \log a$.

855. $\log x = 1/3 (\log a + \log b)$. **856.** $\log x = 1/2 [\log a + 1/2 (\log b + 2/3 \log c)]$.

Къ § 197. III. **857.** Найти характеристики логарифмовъ слѣдующихъ чиселъ: 3, 38, 382, 3824; 3,1; 3,12; 37,2; 56315, 726; 57; $57 1/2$; $3485^2/7$.

Къ § 198 **858.** У слѣдующихъ отрицательныхъ логарифмовъ сдѣлать мантиссы положительными: $-2,37805$; $-1,07380$; $-0,00340$; $-5,56000$.

859. Слѣдующіе логарифмы превратить въ отрицательные: $\bar{2},73594$; $\bar{1},08037$; $\bar{4},07630$; $\bar{1},00230$.

Къ § 199. I. **860.** Чему равны десятичные логарифмы слѣдующихъ дробей: 0,1; 0,01; 0,001; 0,00001; 0,0000001?

Къ § 199. II. **861.** Найти характеристики десят. логарифмовъ слѣдующихъ дробей: 0,36; 0,183; 0,02; 0,0036; 0,00056; 0,00000378.

Къ § 202. Найти по таблицамъ логарифмы слѣдующихъ чиселъ: **862.** 9; 26; 573; 57,55; 7,414; 0,7579. **863.** 56348. **864.** 10,0035. **865.** 0,0378467.

Къ § 203. Найти числа по слѣдующимъ логарифмамъ:

866. 2,86764; 1,34967; 0,01115; 3,14114. **867.** 1,66283.

868. 2,31145. **869.** 0,51008. **870.** $\bar{1},58062$. **871.** $\bar{3},74670$.

872. $-1,08347$.

873. $-0,63475$. **874.** $-3,91340$.

(Въ послѣднихъ трехъ примѣрахъ предварительно превратить логарифмы).

Къ § 204. Произвести слѣдующія дѣйствія надъ логарифмами:

875. $+\begin{matrix} \sqrt{2,73085} \\ \sqrt{3,96839} \end{matrix} + \begin{matrix} \{1,57340 \\ \sqrt{2,84309} \end{matrix}$ **876.** $-\begin{matrix} \sqrt{2,03871} \\ \sqrt{1,74569} \end{matrix} - \begin{matrix} \{0,37560 \\ \sqrt{2,74893} \end{matrix}$

877. $\bar{2},74029 \times 7$. **878.** $\bar{1},40185 \times 9$. **879.** $\bar{3},56120 \times 36$.

880. $\bar{1},70456 \times 18$. **881.** $\bar{2},37409 \times (-3)$. **882.** $\bar{3},56030 \times (-23)$.

883. $\bar{12},63102 : 4$. **884.** $\bar{3},02745 : 5$. **885.** $\bar{1},00347 \cdot 6$.

886. $\bar{2},50746 : 7$.

Къ § 205. Вычислить помощью логарифмовъ слѣдующія выраженія:

887. $\sqrt[6]{235,78}$. **888.** $\sqrt[3]{\frac{13}{16}}$. **889.** $\sqrt[3]{17705^5/6}$. **890.** $(2^5/6)^9$.

891. $\sqrt[3]{\frac{7^4}{3}\sqrt[6]{6}}$. **892.** $243 \sqrt[3]{\frac{716,5}{\sqrt{2}}}$. **893.** $(-7,5)^3 \sqrt[3]{63}$.

894. $\sqrt[3]{-34,56}$. **895.** $\sqrt[3]{50 + \sqrt[3]{2}}$. **896.** $\sqrt[16]{\frac{43 + 5\sqrt[3]{278}}{\sqrt[3]{17}}}$.

897. $\sqrt[3]{10 - 5,6\sqrt[3]{5}}$.

Сложные проценты.

206. Основная задача на сложные проценты. Говорятъ, что капиталъ отданъ по сложнымъ процентамъ, если причитающіяся за него процентныя деньги не берутся изъ банка, а присоединяются въ концѣ каждаго года къ капиталу для наращенія ихъ процентами. Замѣтивъ это, предложимъ себѣ такую задачу:

Въ какую сумму обратится черезъ t лѣтъ капиталъ a рублей, отданный въ ростъ по r сложнымъ процентамъ?

Обозначимъ черезъ r ежегодную прибыль на 1 рубль, т.-е. положимъ $p/100=r$; тогда черезъ 1 годъ каждый рубль капитала обратится въ $1+r$ руб. (напр., если капиталъ отданъ по 5%, то каждый рубль его черезъ годъ обратится въ $1+5/100$, т.-е. въ 1,05 рубля); слѣд., a рублей обратятся черезъ 1 годъ въ $a(1+r)$ руб. Еще черезъ годъ, т.-е. черезъ 2 года отъ начала роста, каждый рубль изъ этихъ $a(1+r)$ руб. обратится снова въ $1+r$ руб.; значитъ, весь капиталъ обратится въ $a(1+r)^2$ руб. Такимъ же образомъ найдемъ, что черезъ три года капиталъ будетъ $a(1+r)^3$, черезъ 4 года $a(1+r)^4$..., вообще черезъ t лѣтъ, если t цѣлое число, онъ обратится въ $a(1+r)^t$ руб. Такимъ образомъ, обозначивъ черезъ A окончательный капиталъ, будемъ имѣть слѣдующую формулу сложныхъ процентовъ:

$$A=a(1+r)^t.$$

Напримѣръ, если $a=2300$, $p=5\%$, $t=10$, то найдемъ:

$$r=\frac{p}{100}=0,05; \quad A=2300(1,05)^{10}.$$

Чтобы вычислить A , пользуемся логарифмами:

$$\log A = \log 2300 + 10 \log 1,05 = 3,36173 + 0,21190 = 3,57363$$

$$A = 3746,54 \text{ руб.}$$

207. По даннымъ тремъ изъ чиселъ: A , a , r и t опредѣлить четвертое. Формула сложныхъ процентовъ применима и къ рѣшенію такихъ задачъ, въ которыхъ неизвѣстно или a , или r , или t при прочихъ данныхъ числахъ. Такъ, изъ нея находимъ:

Для опредѣленія начального капитала: $a = \frac{A}{(1+r)^t}$,

и слѣд., $\log a = \log A - t \log (1+r)$.

Для опредѣленія процента: $1+r = \sqrt[t]{\frac{A}{a}}$,

и слѣд., $\log (1+r) = \frac{1}{t} (\log A - \log a)$.

Вычисливъ по таблицамъ $1+r$, найдемъ потомъ r , т.-е. $p/100$, а слѣд., и p .

Для опредѣленія времени будемъ имѣть:

$$\log A = \log a + t \log (1+r);$$

откуда: $t = \frac{\log A - \log a}{\log (1+r)}$.

Упражненія.

898. Въ какую сумму обратится капиталъ въ 4000 руб. черезъ 20 лѣтъ, если онъ отданъ по 4% (сложныхъ)?

899. Нѣкто, умирая, оставилъ наслѣдство въ 32000 руб., положенныхъ въ банкъ по 3% съ условіемъ, чтобы капиталъ съ процентами былъ раздѣленъ между наслѣдниками только черезъ 15 лѣтъ. Какую сумму придется дѣлить?

900. Населеніе города опредѣлено въ 250000 чел. Замѣтили, что оно увеличивается съ каждымъ годомъ на $1/20$ часть. Какое будетъ населеніе черезъ 100 лѣтъ, если увеличеніе постоянно будетъ слѣдовать этому закону?

901. Черезъ сколько лѣтъ капиталъ, отданный по 5% сложныхъ удвоится? (Указаніе: начальный капиталъ x , окончательный $2x$; въ уравненіи x сокращается).

902. То же, если капиталъ отданъ по 4%.

903. Какой капиталъ надо отдать въ банкъ по 4%, чтобы черезъ 10 лѣтъ онъ обратился въ 45000 руб.?

904. По скольку процентовъ надо помѣстить капиталъ въ 7500 руб., чтобы онъ черезъ 6 лѣтъ обратился въ 10050 руб. 72 коп.?

905. Черезъ сколько лѣтъ капиталъ въ 6200 руб. обратится въ 8158 руб. 75 коп.; считая по 4%?

906. Капиталъ въ 6000 руб. отданъ по 5% и въ концѣ каждаго года къ нему добавляются по 400 руб. Какая сумма образуется черезъ 10 лѣтъ. (Указаніе: составить формулы, показывающія, во что обратится капиталъ сначала въ концѣ 1-го года, потомъ въ концѣ 2-го года, затѣмъ 3-го и т. д. до 10-го).

907. Нѣкто занялъ 5000 руб., по 6%. Въ концѣ каждаго года онъ уплачиваетъ по 400 руб. Какой остался долгъ къ концу 6 года? (Указаніе: см. пред. задачу).

ОТВѢТЫ НА УПРАЖНЕНІЯ.

1. $\frac{apt}{100 \cdot 360}$. 2. $\frac{ma + nb + pc}{a + b + c}$. 3. $\frac{35 \cdot 8 \cdot 48}{360} = 37\frac{1}{3}$ руб.; 3500— $37\frac{1}{3}$.
4. 1) $a + b + c$; 2) $m - n$; 3) pqr ; 4) x^2, y^3 ; 5) $\sqrt{a}; \sqrt[3]{b}$; 6) $x^2 + y^2$;
 7) m^2n^3 . 5. 1) 99; 2) 561; 3) 11; 4) 3; 5) 1137; 6) 1089; 7) 689; 8) 3.
 7. 1) 38; 2) 5600. 8. 1) $a^2 - b^2$; 2) $(a - b)^2$; 3) $(a + b)(a - b)$; 4) $(a^3 + b^3) : (a + b)^3$. 9. $3a + 2b$; y ; a^2x ; $5a^2b^3$; $3ab$; a ; $3a$; $5a^3b^2x^4$; $6x^3y$;
 15 ab . 10. +10; -10; +3; -3. 11. +8; -2; +1; -3; 12. +1;
 -1; -2; +2. 13. 0; 0; 0; 0; 8; $\frac{3}{4}$; 2; 0,3; 0. 14. +2; $-\frac{6}{4}$.
 15. -5,7; 0. 19. -4; -15; $-\frac{1}{4}$; $-\frac{29}{63}$. 20. -1,58; $-\frac{1}{11}$. 21. - b ;
 - y . 22. $b - a$; 35—40=-5 (т.-е. получено убытку 5 руб.).
 23. $a - b$; -100. Последній отвѣтъ означаетъ, что получается
недостатокъ 100 руб. 24. $m - n$; 200—250=-50; этотъ отвѣтъ
 означаетъ, что лодка движется по теченію рѣки со скоростью
 50 фут. въ мин. 25. Черезъ 20 лѣтъ; черезъ—5 лѣтъ. Последній
 отвѣтъ означаетъ: «5 лѣтъ тому назадъ». 26. 14; 10; 18; 2.
 27. $a + b$; $m + n$; $5x$. 28. 9; x ; $2m$; a . 29. +16. 30. +106.
 31. $-\frac{3}{4}$. 32. 5. 33. $10 + (-2) + (-3) + 7$. 34. $10 - (-8)$. 35. $a -$
 $(-x)$. 36. $a + (-b) + (-c)$. 37. -16; -14; +80. 38. $-\frac{187}{8}$; $-\frac{2}{25}$;
 + $\frac{21}{50}$. 39. +1; -1; +1; -1. 40. +4; -8; +16; -32. 41. 3. $4^2 +$
 $(-4) \cdot 4 + (-5) = 48 - 16 - 5 = 27$. 42. $(-4)(-2)^3 + 3(-2) + (-5) =$
 $-16 - 6 - 5 = -27$. 43. 0; 0; 0; 0. 44. -168. 45. -1,4. 46. +3 $\frac{1}{16}$.
 50. 0; 0; 0; 0; невозм.; невозм.; невозм.; любое число. 51. +5;

- 5; -5; +5. 52. - a ; -5; + x^2 . 55. $4x$; $3(a + b)$; $\frac{4m}{9}$; $3ab$;
 $2a^2x^3y$; $2ax - \frac{3b}{2}$. 56. $aabbb + aabbb + aabbb$; $\frac{aa}{3} + \frac{aa}{3}$; $aa + aa + aa -$
 $-\left(\frac{b}{4} + \frac{b}{4} + \frac{b}{4}\right)$. 57. 90. 58. $\frac{13}{15}$. 59. $30\frac{1}{4}$. 60. 0; 31; 160; 19431.
 61. 0; 0; 0. 62. 829. 65. $13a^2b$. 66. $3\frac{11}{20}ax^3$. 67. $a^3x^2 + 4\frac{1}{2}a^2x^3$.
 68. $2x - 16,3xy$. 69. $a + 3\frac{1}{2}mxy^2$. 70. $a - 3\frac{1}{2}mxy^3$. 71. $2ax - b^2x$.
 72. $0,25ab^3 - 4a^3b$. 73. $4a^3 - 3a^2b - 13ab^3$. 74. $x^5 - 7a^2x^3$. 75. $4x^7 -$
 $-4ax^6 - 2a^4x^3$. 76. $A + x - y - z$. 77. $m^2 + 2n^3$. 78. $-2a + 5b + 3c$.
 79. $3m^2 + n^2$. 80. $8a^3 - 11a^2b + 13ab^2 - 3b^3$. 81. $2a^4 + 8a^3 - 4a^2 + 9a - 6$.
 82. $7ax^3 + 2ab^2x - c^3 - abcx - 3c^2d$. 83. $A - m + n + p$. 84. $25 - x$.
 85. $45 - 2a$. 86. $a^2 - 5b + c$. 87. $2a - 5b + 2c$. 88. $-3a + 3b$. 89. $3ax^3 -$
 $-6ab^2x + 3c^3$. 90. $3a^3 + a^2b + 2ab^2 + 8c^3 - b^3$. 91. $3a^2 + 3b^2 + 3c^2$.
 92. $x + y$. 93. $2m - 2n$. 94. $a - b + 2c - d$. 95. 1. 96. $b - 4c$. 97. $2a -$
 $-2b + 2c$. 98. $-9a^3 + 7ab^2 - 7b^3$. 99. $4x^2 - 2y^2$. 100. 1) $a - (b + c - d)$;
 2) $a - b + (d - c)$; 3) $a - (b + c) + d$. 103. a^9 ; a^{11} ; am^{+n} ; $(2a)^7$. 104. x^m ;
 x^{2m-1} ; y^{3m+1} . 105. $15a^3b^7c$. 106. $\frac{5}{8}a^4x^4$. 107. $0,81a^3b^2x^{m+2}$. 108. $a^9b^3c^3$.
 109. $\frac{9}{49}m^2x^4y^6$. 110. $0,01x^2my^{2n+2}$. 111. $8a^9b^3x^9$. 112. $\frac{1}{8}m^9n^2y^9$.
 113. $-2a^7b^3c^3$. 114. $+0,3x^4ym^{+1}$. 115. $-35am^{+1}bm^{+2}$.
 116. $+\frac{5}{14}m^4n^6y^4$. 117. $+0,04a^6b^4$. 118. $-8x^9y^6$. 119. $8a - 8b + 8c$;
 $0,8m + 0,8n - 0,8p$; $\frac{23}{2}x - \frac{69}{4}y + \frac{23}{4}z$. 120. $6a^3b - 4ab^4 + 2abc$.
 121. $25a^3b - 20a^4b^3 + 15a^5b^3 - 35a^6b^4$. 122. $9a^5b - 12a^4b^3 + 18a^3b^3 -$
 $-9a^2b^4$. 123. $\frac{16}{105}a^7b^6c - \frac{20}{21}a^6b^7c$. 124. Каждое изъ данныхъ вы-
 раженій, по раскрытіи скобокъ и приведеніи подобныхъ чле-
 новъ, даетъ: $x^2z + y^2z + xy^2 + xz^2 + yz^2 + x^2y$. 125. $am + bm - cm -$
 $-an - bn + cn$. 126. $6a^2 - 3ab + 2ab^2 - b^3$. 127. $2a^2 + ab - ab -$
 $-\frac{1}{2}b^2 = 2a^2 - \frac{1}{2}b^2$. 128. $x^3 - y^3$. 129. $x^3 + y^3$. 130. $49x^2 - 112xy +$
 $+64y^2$; $0,09a^2x^4 - 0,3ax^2 + \frac{1}{4}$. 131. $\frac{1}{16}a^6x^2 - a^5x^3 + 4a^4x^4$. 132. $25a^3 -$
 $-5ab - 22a^2b + 10b^2$. 133. $6x^5 + x^4 + 7x^2 - 7x + 1$. 134. $(x^3 + 6x^2 +$

- $+24x+60)(x^2-6x^2+12x+12)=x^6+1008x+720$. 185. $(16y^4+$
 $+8xy^2+4x^2y^2-2x^3y+x^2)(-2y+x)=-32y^5+8x^2y^2-4x^4y+x^5$.
 186. $x^2-x^5-x^4+2x^2-x^2-x+1$. 187. $a^4-2a^2x+2ax^2-x^4$.
 188. $6x^4-22x^4y+37x^2y^2-33x^2y^2+16xy^4-3y^5$. 189. a^5+b^5 .
 140. Высший членъ a^5 ; низший b^5 ; получаюся умноженіемъ
 высшего члена на высший и низшаго на низший. 141. 10 чле-
 новъ; послѣ приведенія останутся 2 члена, потому что выс-
 ший и низший члены не могутъ имѣть себя подобныяхъ. 142. m^2-
 $-n^2$; $(10+2)(10-2)=12 \cdot 8=96$ и $10^2-2^2=100-4=96$.
 143. a^2-1 . 144. $4a^2-25$. 145. $9a^2x^4-\frac{1}{4}$. 146. $1-a^4$. 147. a^2-4b .
 148. $\frac{4}{9}a^2-\frac{4}{25}b^2$. 149. $b^2-\frac{1}{4}$. 150. $0,09x^4-100y^6$. 151. $x^2+2xy+y^2$.
 $(3+2)^2=5^2=25$ и $3^2+2 \cdot 3 \cdot 2+2^2=9+12+4=25$; $(\frac{1}{2}+\frac{1}{3})^2=$
 $=(\frac{5}{6})^2=\frac{25}{36}$ и $(\frac{1}{2})^2+2(\frac{1}{2})(\frac{1}{3})+(\frac{1}{3})^2=\frac{1}{4}+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}=\frac{9+12+4}{36}=\frac{25}{36}$.
 152. a^2+2a+1 . 153. $1+4a+4a^2$. 154. $x^2+x+\frac{1}{4}$. 155. $4x^2+12x+9$.
 156. $9a^4+6a^2+1$. 157. $0,01x^2m+xm+1+25x^2$. 158. $16a^4b^2+$
 $+4a^2b^2+\frac{1}{4}a^2b^4$. 159. $0,64a^6x^2+1,2a^4x^2+\frac{9}{16}a^2x^4$. 160. m^2-2mn+
 $+n^2$; $(5-3)^2=2^2=4$ и $5^2-2 \cdot 5 \cdot 2+2^2=25-30+9=4$; $(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})^2=$
 $=(\frac{1}{6})^2=\frac{1}{36}$ и $(\frac{1}{2})^2-2(\frac{1}{2})(\frac{1}{3})+(\frac{1}{3})^2=\frac{1}{4}-\frac{1}{3}+\frac{1}{9}=\frac{1}{36}$. 161. $25a^2-$
 $-20a+4$. 162. $9a^4b^2-3a^2b+\frac{1}{4}$. 163. $9a^4b^2-24a^2bc+16a^2c^2$.
 164. $0,04x^6-\frac{3}{20}x^4+\frac{9}{64}x^2$. 165. $4m^2+12mn+9n^2$. 166. $8x^2-$
 $-12x^2+6x-1$. 167. $27a^6+108a^4b^2+144a^2b^4+64b^6$. 168. $64a^3b^3-$
 $-96a^2b^4+48a^4b^5-8a^3b^6$. 169. $(x^2+1)(x^2-1)=x^4-1$. 170. $(4x^2+$
 $+y^2)(4x^2-y^2)=16x^4-y^4$. 171. $(m+n)^2-p^2=m^2+2mn+n^2-p^2$.
 172. $a^2-(b+c)^2=a^2-b^2-2bc-c^2$. 173. $(a+b)^2-(c+d)^2=a^2+$
 $+2ab+b^2-c^2-2cd-d^2$. 174. $x=2(a^2+b^2)$. 175. $y=4ab$. 176. $2a^4$.
 177. $2x^2y$. 178. $-17a$. 179. $2a^5$. 180. $5a^2b$. 181. $2a^2xy$. 182. $\frac{3}{5}x^2$.
 183. $-5y^4$. 184. $+\frac{1}{5}bx^2$. 185. $\frac{3}{28}ac$. 186. $-\frac{64}{15}x^2y$. 187. $-\frac{6}{5}a^3$.

188. $6am^2x^2$. 189. $5(a+b)^2$. 190. $3am^2b^2$. 192. $9b-4c+$
 $+5d$. 193. $\frac{16}{3}a+8b-16a^2b^4$. 194. $9x^2y^2-6axyx+a^2x^2$.
 195. $x^4+2xy+y^2-x^2$. 196. $6x^3-4x^2+5x-2$. 197. x^2+
 $+3x+2$. 198. $3ax$. 199. $7a^3-3a^2+5a-1$. 200. $x-a$. 201. x^2+
 $+ax+a^2$. 202. $x^2+ax^2+a^2x+a^3$. 203. Частное: $3a^2+4a^2+3a-3$,
 остатокъ: $-18a^2+19a-6$. 204. Частное: $2+3x$, остатокъ:
 $5x^2-17x^2$. 205. Частное: $2-3x+8x^2$, остатокъ: $-19x^3+20x^4$.
 206. Частное: $x^4-2ax^2-4a^2x^2+3a^2x+4a^4$, остатокъ: $3a^5$; если
 въ дѣльмомъ вмѣсто x поставимъ a , то получимъ: a^5-
 $-3a^5-2a^5+7a^5+a^5-a^5=3a^5$. 207. Частное: $ax^2+(a+b)x^2+$
 $+(a+b+c)x+(a+b+c+d)$, остатокъ: $a+b+c+d+e$. 208. $a(b+c)$.
 209. $3(x+y-z)$. 210. $a(5a-3a^2+1)$. 211. $2a(2x-y)$.
 212. $5a^2x(1-2x^2+8x)$. 213. $4ab^2(2abx-x^3+3b^2)$. 214. $xy(y-7+4x)$.
 215. $2m(1+2x-3x^2)$. 216. $2xm(am-3+2x^2m)$. 217. $4(a-b)x(a-b-3)$.
 218. $(x-y)^2$, или $(y-x)^2$. 219. $(m+n)^2$. 220. $(a+b)^2$. 221. $(a-2b)^2$.
 222. $(x+4)^2$. 223. $(x+1)^2$. 224. $(a-2)^2$. 225. $-(a-b)^2$.
 226. $(a+\frac{1}{2})^2$. 227. $(a^2-b)^2$. 228. $(5x^2+3y)^2$. 229. $(0,1ab-1)^2$.
 230. $5a(a-2b)^2$. 231. $[(x+1)+1]^2=(x+2)^2$. 232. $(a+b+2)^2$.
 233. $(m+n)(m-n)$. 234. $(a+1)(a-1)$. 235. $(1+a)(1-a)$.
 236. $(x+2)(x-2)$. 237. $(x^2+1)(x^2-1)=(x^2+1)(x+1)(x-1)$.
 238. $(5b+3a)(5b-3a)$. 239. $(\frac{1}{2}a^2-\frac{1}{3}y^2)(\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}y^2)$.
 240. $(9x^2+5)(9x^2-5)$. 241. $(0,1a^3+3)(0,1a^3-3)$. 242. $(4ab^2c^2+$
 $+3x^2y)(4ab^2c^2-3x^2y)$. 243. $3a(a^2+4b^2)(a+2b^2)(a-2b^2)$. 244. $(a+$
 $+b+c)(a+b-c)$. 245. $(a+b+c)(a-b-c)$. 246. $(a+b-c)(a-b+c)$.
 247. $(a+y+x-xy)(a+y-x+y)=2x \cdot 2y=4xy$. 248. $(a^4+x^4)(a^2+$
 $+x^2)(a+x)(a-x)$. 249. $(x+a)^2$. 250. $(x+1)^2$. 251. $(a-2)^2$.
 252. $(\frac{1}{2}x-1)^2$. 253. $(2-a^2)^2$. 254. $(a+b)^2-a^2=(a+b+c)(a+b-c)$.
 255. $a^2-(b-c)^2=(a+b-c)(a-b+c)$. 256. $(a+b-1)(a-b+1)$.
 257. $(x+1+y)(x+1-y)$. 258. $(m+n+1)(m-n-1)$. 259. $(2a-b+$
 $+c)(2a-b-c)$. 260. $(5x^2-y+3z^2)(5x^2-y-3z^2)$. 261. $(a+b)(x+y)$.
 262. $(a-b)(a-d)$. 263. $(a-b)(x+y)$. 264. $(3+a)(x-y)$.
 265. $(a+b)(a-1)$. 266. $(x-3)(z+y)$. 267. $(2a-3)^2(2a+3)$.
 267. a. Напр., многочленъ задачи 251-й разлагается такъ:
 $a^3-8=(3a^2-12a)=a^3-2^3=6a(a-2)=(a-2)(a^2+2a+2^2)-$

- $-6a(a-2) = (a-2)(a^2+2a+4-6a) + (a-2)(a^2-4a+4) =$
 $= (a-2)(a-2)^2 = (a-2)^3.$ 268. $\frac{5x}{7y}; \frac{3ab}{10m}$ 269. $\frac{8a^2}{11b}; \frac{100m}{236n} = \frac{25m}{59n}$.
 270. $\frac{9ab}{10x^2}$ 271. $\frac{14a^3}{11b}$ 272. $\frac{12x-1}{4a-4b}$ 273. $\frac{20a^2+2a-1}{4a-4}$
 274. $\frac{18a-14}{6-a}$ 275. $\frac{ax^2+bx+c}{ax^2+x}$ 276. $\frac{x^2+ax-b}{x^2-x}$ 277. $\frac{x-1}{x}$
 278. $\frac{3a^2}{b-a}$ 279. $\frac{a-1}{b-2}$ 280. $\frac{a^2+b^2-2ab}{a-b}$ 281. $-\frac{3a}{6}, -\frac{5x^2}{3}$
 282. $-\frac{a-1}{6}; -\frac{a}{x-2}$ 283. $-\frac{m^2-n^2}{m-n}$ 284. $\frac{3b}{2x}$ 285. $\frac{ac}{4b}$
 286. $\frac{16ay^3}{15}$ 287. $\frac{3x^2yz}{4}$ 288. $\frac{3xy}{4a^2}$ 289. $\frac{b}{5ac}$ 290. $\frac{a+x}{3b-cx}$
 291. $\frac{7x}{5b}$ 292. $\frac{5a}{a-x}$ 293. $\frac{n^2}{n-2}$ 294. $\frac{3y}{4x}$ 295. $\frac{x^2+a^2}{x}$
 296. Общ. знам. = $2abc$, числители: $4bc, 6ac, ab$. 297. Общ. знам. = $60a^2b^2x$; числители: $105b^2x^2, 40a^3x, 48a^2b^4$. 298. Общ. знам. = $12a^2b^2c^2xy$; числители: $20mx^3y^2, 9a^3b^3c$. 299. Общ. знам. = x , числители: $2ax, a^2$. 300. Знаменатель: $40abx^3$, числители: $15x^3, 120abx^4, 8a^2b$. 301. Знаменатель: a^2-b^2 , числители: $a-b, a+b$. 302. Общ. знам. = $(1-x^2)(1+2x)$; числители: $a(1+x)(1+2x), b(1-x)(1+2x)$ и $c(1-x^2)$. 303. Знам. = $=8a^3b^2$; числители: $2a^2bx, y$. 304. Знам. = $16mx^3y^2$; числители: $a, 8(a+b)mx^2y, (4(a-b)x^3)$. 305. Знам. = m^2-1 ; числ.: $m-1, 2, 3(m+1)$. 306. Знам. = x^2-2x+1 ; числ.: $3a(x-1), 2a$. 307. Знам. = a^2+4a+4 ; числ.: $=a-1; (a-2)(a+2)$. 308. Знам. = $=(x-1)(2x-1)$; числ.: $2x-1, (2x-1), 1$. 309. Знам. = $=(a+b)(a-b)b$; числ.: $=a^2-b^2, ab(a+b), 2a$. 310. Знам. = $=(a+b)^3$; числ.: $a^3, ab(a+b), b(a+b)^2$. 311. Знам. = $84a^3b^2$; числ.: $3x, 4aby$. 312. Знам. = $300a^3x^3y^2$; числ.: $12mxy, 20a^2nx^2, 5a^3py$. 313. Знам. = $150a^2x^3y$; числ.: $3ay, 20ax, 2x^2y^2, 45ax^4$. 314. Знам. = $b(a^2-b^2)$; числ.: $(a-b)(a^2-b^2), 2ab(a+b), b$. 315. Знам. = $24(a+b)^2(a-b)c$; числ.: $4a(a-b)c, 3(a+b)^2bc, 2abc(a+b), 3a^2(a+b)^2$. 316. $\frac{6bc+3ac+2ab}{6abc}$ 317. $\frac{6+5x}{3x^2}$
 318. $\frac{az+by-cx}{xyz}$ 319. $\frac{bx+a}{b}$ 320. $\frac{413x-187a}{204}$ 321. $\frac{1}{x-y}$
 322. $\frac{a^2+z^2}{a^2-z^2}$ 323. $\frac{12x}{1-9x^2}$ 324. $\frac{2x}{3}$ 325. $\frac{4}{1-a^4}$

326. $\frac{6}{x(x+1)(x+2)}$ 327. $\frac{x-3}{x+3}$ 327. a. $\frac{6a+20b+3a^2-9ab+6b^2}{a^2-4b^2}$
 327. b. $\frac{-6x^2-2x+8}{(x-1)^3}$, что послѣ сокращенія даетъ: $-\frac{2(3x+4)}{(x-1)^2}$
 327. c. $\frac{4a}{a^4+a^2+1}$ 328. $\frac{12x^2y^2}{p^2q^7}$ 329. $-\frac{6b}{7x^2}$ 330. $\frac{1}{5(1+a)x}$
 331. $\frac{(x+y)^2}{xy}$ 332. $\frac{1}{(x-1)(x+2)}$ 333. $\frac{a(b-c)}{2(2b-c)}$ 334. $\frac{a^2b^2+2ab^3}{(a+b)^2}$
 335. $\frac{9b^2c^2x^2y}{16a^2z^2}$ 336. $\frac{3a^2}{5mn}$ 337. $15a^2x^2y$ 338. $\frac{1}{5(a-b)}$
 339. $\frac{x+y}{x-y}$ 340. $\frac{(a+b-c)(a-b+c)}{(a+b+c)(b+c-a)}$ 341. $\frac{b+c-a}{a+c-b}$ 342. b
 343. $\frac{(a^2+b^2)^2}{a^4+b^4}$ 344. $x = \frac{6}{5}$ 345. $x = 50$ 346. $x = 9$ 347. $x = \frac{5207^2}{2590}$
 348. $x = 7$ 349. $x = 4$ 350. $x = 561\frac{15}{37}$ 351. $x = 8$ 352. $x = 5$
 353. $x = \frac{1}{5}$ 354. $x = \frac{d-b}{a-c}$ 355. $x = \frac{ab-1}{bc+d}$ 356. $x = 3$
 357. $x = \frac{mn}{m-n}$ 358. $x = a$ 359. По упрощеніи получаемъ уравненіе $7x+16=7x+16$ или $0=0$, которое удовлетворяется всевозможными значеніями x . 360. 1°, получается нелѣпое равенство $0=66$; 2°, нелѣпое равенство $11=9$. Оба уравненія не удовлетворяются никакими значеніями x . 361. Равенства 1° и 3° суть тождества и, слѣд., удовлетворяются всевозможными значеніями x ; равенства 2° и 4° суть уравненія; первое изъ нихъ имѣетъ корень $x=11$, второе $x+\frac{3}{2}$.
 362. 1868 и 1220. 363. 1400 и 400. 364. $\frac{7}{12}$ 365. 12600 руб.,
 366. 270 руб. 367. 6840 руб. 368. $x=5$. 369. 36 гусей.
 370. $84\frac{7}{22}$ версты. 371. 6 дней. 372. Перваго сорта $31\frac{1}{4}$ бут.,
 второго сорта $18\frac{3}{4}$ бут. 373. $\frac{12}{13}$ часа. 374. 120 арш.
 375. $\frac{4}{5}$ часа 376. 108 руб. 377. 12 дней. 378. 80 яицъ.
 379. 90 руб. 380. 26. 381. 96 382. 265. 383. Золота $7\frac{36}{47}$ фун. 384. $1\frac{7}{8}$ ведра. 386. Черезъ —4 дня (т.е. 4 дня тому назадъ). 388. Черезъ $-\frac{1}{4}$ года (невозможная задача).
 389. $x=16, y=35$. 390. $x=14, y=125$. 391. $x=9, y=123\frac{1}{2}$.
 392. $x=320\frac{35}{52}, y=91\frac{5}{26}$ 393. $x=3, y=5$. 394. $x=2, y=1$.

395. $x=1, y=2$. 396. $x=4, y=6$. 397. $x=44, y=21$.
 398. 500 руб. у А, 700 руб. у В 399. 75 коп. и 55 коп.
 400. $\frac{6}{25}$. 401. 5 руб. и 2 руб. 402. 121100 руб. 403. Фон-
 таны влив. 15 и 6 вед. въ часъ. Весь бассейнъ нап. въ 10 час.
 404. Въ правой 10 мон., въ лѣвой 8. 504. Капиталъ
 5000 руб., проц. 2^o/_o. 406. $x=12, y=25, z=6$. 407. $x=13,$
 $y=24, z=62$. 408. $x=4, y=0, z=5$. 409. $x=10, y=24,$
 $z=25$. 410. $x=17, y=22, z=45$. 411. $x=2, y=4, z=1,$
 $u=5$. 412. $x=1, y=10, z=-2, v=7, u=3$. 413. $x=2,$
 $y=7, z=3, t=8$. 414. $x=3, y=7, z=16$. 415. $x=16,$
 $y=7\frac{3}{4}, z=5\frac{1}{2}$. 417. $x=3, y=2, z=1$. 418. $x=1, y=-\frac{5}{6},$
 $z=\frac{2}{3}$. 419. 18 лѣтъ, 38 лѣтъ, 62 года. 420. 400 руб.,
 640 руб. и 780 руб. 421. Фунтъ кофе стоитъ $\frac{3}{4}$ руб., фунтъ,
 сахару $\frac{1}{5}$ руб. и фунтъ чаю 2 руб. 422. Искомое число

есть 432. 423. А окончилъ бы въ 20 дней, В въ 30 дней
 и С въ 60 дней, работая вмѣстѣ, они окончатъ работу въ
 10 дней. 424. 3 фун., 12 фун и 4 фун. 425. 133 фун.,
 150 фун. и 76 фун. 426. $\frac{13}{8}a, \frac{7}{8}a$ и $\frac{1}{2}a$. 427. Потому что

число уравнений меньше числа неизвѣстныхъ. Чтобы найти
 нѣсколько рѣшеній этихъ системъ, подставляемъ въ первой
 изъ нихъ на мѣсто одного неизвѣстнаго, а во второй на мѣсто
 двухъ неизвѣстныхъ, произвольныя числа и рѣшаемъ образо-
 вавшіяся системы двухъ уравнений съ двумя неизвѣстными.
 Если, напр., положимъ въ первой системѣ $z=1$, то получимъ

$$\begin{aligned} 7x - 2y &= 32 \\ x + 10y &= 17 \end{aligned} \quad \text{откуда: } x = \frac{59}{12}, \quad y = \frac{29}{24}$$

Если во второй системѣ положимъ $z=1, t=0$, то будемъ имѣть

$$\begin{aligned} 5x - y &= -1 \\ 3x + 2y &= 21 \end{aligned} \quad \text{откуда: } x = \frac{19}{13}, \quad y = \frac{108}{13} \quad \text{и т. д.}$$

428. Первая система невозможна, вторая возможна (имѣетъ
 рѣшеніе: $x=5, y=3$). 429. $20a-b=29$. 430. Система не-
 опредѣленная, такъ какъ второе уравненіе приводится къ одному
 виду съ первымъ. 431. Система невозможна, такъ какъ она
 приводится къ противорѣчающимъ уравненіямъ: $5x-5y=312$

и $x-y=-24$. 432. Система невозможна, такъ какъ въ 3-мъ
 уравненіи лѣвая часть есть сумма лѣвыхъ частей первыхъ
 двухъ уравненій, а правая часть не равна суммѣ правыхъ
 частей этихъ уравненій. 433. Система неопредѣленная, такъ
 какъ 3-е уравненіе есть слѣдствие первыхъ двухъ (получается
 изъ нихъ сложениемъ). 434. $+1; -1; +1; -1; +1$. 435. $-8;$
 $+16; -32$. 436. $-a^3; +a^6; +a^8$ 437. $-1; +1; +1$.
 438. $m^2n^2, 8x^3y^3, +\frac{1}{16}a^4x^4y^4$. 439. $a^6; -a^{12}; +a^{12}; x^{mn}$.
 440. $-a^{24}$. 441. $\frac{4}{9}; \frac{1}{64}; \frac{a^5}{b^5}; +\frac{x^4}{y^4}, 0,0081$. 442. $4a^6b^6c^2$. 443. $\frac{8}{27}a^{12}x^6$.
 444. $0,008a^3b^9x^{12}$. 445. $+0,0001x^{4m}y^4$. 446. $\frac{9a^2x^6}{25b^4y^2}$.
 447. $-\frac{64a^6m^3n^9}{27b^8x^{12}}$. 448. $\frac{4(a+b)^2x^{10}}{49a^6b^2y^4}$. 449. $4a^4-2a^3+4\frac{1}{4}a^2-a+1$.
 450. $\frac{1}{4}x^4-4x^3+13x^2+24x+9$. 451. $25a^6x^2-30a^5x^3+19a^4x^4-$
 $-36a^3x^5+19a^2x^6-6ax^7+9x^8$. 452. $0,09x^6-0,06x^5-0,44x^4+0,45x^3+$
 $+\frac{37}{80}x^2-\frac{3}{4}x+0,25$. 453. $\frac{9}{25}a^6b^2-\frac{4}{5}a^5b^3+\frac{128}{45}a^4b^4-\frac{227}{75}a^3b^5+$
 $+4\frac{2}{5}a^2b^6-1,2ab^7+0,09b^8$. 454. 625; 289; 1521. 455. 55696
 962861; 654481. 456. 31775769; 9162729. 457. $-3; +3; \frac{1}{2}; -\frac{1}{2};$
 $0,1; -0,1$. 458. $\pm 3; \pm \frac{1}{2}; \pm 0,1; \pm 5; \pm 10; \pm 2; \pm \frac{1}{2}; \pm 3$.
 459. Всѣ 4 корня мнимыя числа. 460. $\pm 2,3$
 461. $\pm \frac{1}{2}, 0,1, 5$. 462. $\pm 2\sqrt{a}\sqrt{b}$. 463. $\pm 3ax\sqrt{y}$.
 464. $-8a\sqrt[3]{b}\sqrt[3]{c}$. 465. $\pm \frac{1}{2}\sqrt[4]{a}\sqrt[4]{x}$. 466. $\sqrt[5]{a}\sqrt[5]{b}\sqrt[5]{c}\sqrt[5]{d}$. 467. $\pm a^2;$
 $\pm 2^2; \pm x^3, \pm(a+b)^4$. 468. $2^2; -a^2; x^4; (m+n)^3$. 469. $am; x^2$.
 470. x^{5m}, a^3 471. $\pm \frac{3}{5}$. 472. Мнимое число. 473. $\pm \frac{a}{b^2}$.
 474. $\frac{\sqrt{a+b}}{\sqrt{m-n}}$ 475. $\frac{2}{5}$. 476. $-0,3$. 477. $\frac{a^2}{b}$. 478. $\frac{\sqrt[3]{x}}{y}$.
 479. $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$ 480. $\frac{a^n}{\sqrt{b}}$. 481. $\frac{a^3}{b^4}$. 482. $\pm 5a^3bc^6$. 483. $\pm 0,6x^2yzm$.
 484. $\frac{1}{2}a^3(b+c)^3$. 485. $-0,1x^4y$. 486. $5(a+b)^2(c+d)$ 487. $\pm \frac{3ab^2}{5x^2y}$.

488. $\pm \frac{0,1a^2b^2c}{7m^2np}$. 489. $-\frac{3a^2b^2}{xy^4}$. 490. $\frac{2(a+b)^2c}{x^4}$. 491. $2a\sqrt{a}$.
 492. $2a^2b^4\sqrt{2b}$. 493. $5a^2bx^2\sqrt{2abx}$. 494. $2a\sqrt[3]{2a}$. 495. $-3x\sqrt[3]{3x^2y^2}$.
 496. $7(a+b)\sqrt{2(a+b)x}$. 497. $(m-n)xy^2\sqrt[3]{(m-n)^2xy}$. 498. $\sqrt{8}$.
 499. $\sqrt{3}$. 500. $\sqrt{a^3}$. 501. $\sqrt{2a^2b^2}$. 502. $\sqrt[3]{\frac{1}{2}a}$. 503. $\sqrt[3]{24x^7b^5}$.
 504. $\sqrt{(a+b)^3}$. 505. $\sqrt{2a^3(x-y)^5}$. 506. 65. 507. 17. 508. 247.
 509. 763. 510. 978. 511. 7563. 512. 8276. 513. 534762.
 514. 6950078. 515. 3 или 4. 516. 3,6 или 3,7. 517. 3,605
 или 3,606. 518. 6 или 7. 519. 15 или 16. 520. 10,04 или 10,05.
 521. 0,89 или 0,90. 522. 0,942 или 0,943. 523. 1,80 или 1,81.
 524. 0,5 или 0,6; 0,50 или 0,51. 525. 4,11 или 4,12.
 526. 18,867... 527. $\frac{3}{5}$ или $\frac{4}{5}$ (до $\frac{1}{5}$); $\frac{8}{11}$ или $\frac{9}{11}$ (до $\frac{1}{11}$).
 528. $\frac{3}{6}$ или $\frac{4}{6}$ (до $\frac{1}{6}$); $\frac{8}{50}$ или $\frac{9}{50}$ (до $\frac{1}{50}$). 529. $\frac{5}{10}$ или $\frac{6}{10}$
 (до $\frac{1}{10}$); 2,3 или 2,4. (до 0,1). 530. 1,46 или 1,47 (до 0,01).
 531. 0,051 или 0,052 (до 0,001). 532. $x=\pm 7$. 533. $x=\pm 3$.
 534. Корни мнимые. 535. $x=\pm 9$. 536. $x=\pm 9$. 537. $x_1=0$;
 $x_2=\frac{7}{2}$. 538. $x_1=0$, $x_2=-\frac{7}{3}$. 539. $x_1=0$, $x_2=3\frac{3}{4}$. 540. $x=0$.
 541. $x=0$. 542. $x=0$. 543. $x_1=2$, $x_2=3$. 544. $x_1=12$, $x_2=4$.
 545. $x_1=3$, $x_2=-9$. 546. $x=\frac{23\pm\sqrt{1681}}{8}$; $x_1=8$, $x_2=-2\frac{1}{4}$.
 547. $x=4\pm\sqrt{30}=4\pm 5,477\dots$; $x_1=9,477\dots$; $x_2=-1,477$.
 548. $x=\frac{24}{5}\pm\sqrt{\left(\frac{24}{5}\right)^2-21\frac{15}{16}}$; $x_1=5\frac{17}{20}$, $x_2=3\frac{3}{4}$. 549. $x=4$.
 550. $x_1=44$, $x_2=-2$. 551. $x_1=\frac{9}{2}x_2=\frac{1}{2}$. 552. $x_1=7$, $x_2=\frac{2}{5}$.
 553. $x=-\frac{2}{3}$. 554. $x_1=6\frac{3}{7}$, $x_2=3\frac{1}{4}$. 555. $x_1=\frac{1}{2}$, $x_2=-3$.
 556. $x_1=14$, $x_2=-10$. 557. $x=\frac{860\pm 752}{24}$; $x_1=67\frac{1}{6}$, $x_2=4\frac{1}{2}$.
 558. 8 и -9. 559. -1 и -1. 560. +1 и +2. 561. $\frac{5}{4}$ и 2.
 562. 4 и -2. 563. $x^2-5x+6=0$; $x^2+x-6=0$; $x^2-x-6=0$;

- $x^2+5x+6=0$. 564. $x^2-6x+\frac{35}{4}=0$; $x^2+x-\frac{35}{4}=0$; x^2+6x+
 $+\frac{35}{4}=0$. 565. $x^2-4=0$. 566. $x^2-6x+9=0$. 567. x^2+
 $+6x+9=0$. 568. $x^2-10x=0$; $x^2+10x=0$. 569. x^2-6x+
 $+4=0$. 570. $x^2-4x+7=0$. 571. $x^2-(a+b)x+ab=0$.
 572. $x^2-(a-b)x-ab=0$. 573. $x^2+(a+b)x+ab=0$. 574. 50 и 15
 или -50 и -15. 575. 12 и 20 или -20 и -12. 576. 18
 и -17. 577. 12 платковъ. 578. 54 бѣдн. 579. 8 мужч. и
 12 женщ. 580. 15 арш. и 18 арш. или же 5 арш. и 8 арш.
 581. 10 вер. и 9 вер. въ часъ. 582. Или 60 руб., или 40 руб.
 583. 4 руб., 20 руб. 584. Два рѣшенія: 72 зол. или 24 зол.
 585. 30 лѣтъ (рѣшеніе: 70 лѣтъ не годится, такъ какъ въ за-
 дачѣ сказано: «молодая женщина»). 586. 24 часа, 25 верстъ
 въ часъ; или 20 часовъ, 30 вер. въ часъ. 587. 4 часа, 6 час.
 588. А въ 1 часть, В въ 2 ч. 40 мин. дня. 589. $x=7$.
 590. $x=\frac{ad}{b}$. 591. $x=a^2-b^2$. 592. $x=3(a+b)^2$. 593. $x=6a^4b^2$.
 594. 5 : 15 = 2 : 6 и другія пропорціи, которыя можно получать
 посредствомъ перестановки членовъ указанной. 595. $x : 3 = 11 : 7$
 и другія. 596. $a : c = d : b$ и другія. 597. $x : (a+1) = (b+1) : (a-1)$
 и другія. 600. 6; 8; 10. 601. 10,95 (съ нед.). 602. $12a^2b^2$.
 603. $10(a-1)^2$. 604. $1=\frac{bm}{cn}$. 605. $\frac{2ab^2}{3}=\frac{3}{2}$. 606. $\frac{3b}{a^2}=30$.
 607. $\frac{2x}{3}=\frac{11}{14}$. 608. $\frac{10}{x}=\frac{5}{12}$. 609. $\frac{a-b}{b}=\frac{c}{x}$. 610. $\frac{8}{x}=\frac{13}{10}$.
 611. $\frac{a}{x}=\frac{m+n}{m-n}$. 612. $\frac{a}{a+b}=\frac{x}{a}$; $x=\frac{a^2}{a+b}$. 613. $\frac{m+n}{a}=\frac{n}{x}$;
 $x=\frac{an}{m+n}$. 614. $\frac{10}{25}=\frac{x}{20}$; $x=8$. 615. 119. 616. 88.
 617. 7 членовъ. 618. Последняя уплата 54 руб., число
 уплатъ 15. 619. Черезъ 6 дней. 620. $\frac{5}{7}$. 621. $\frac{2}{3}$.
 622. 3 р. 45 к., всего уплатили 40 р. 50 к. 623. $\sqrt[4]{\frac{77869}{78125}}$.
 624. 4. 625. Выгоднѣе предложеніе 2-го покупателя на 1132 р.
 626. 9, 27, 81, 243; или -18; +54, -162, +486.
 627. 13286 р. 628. Первый членъ = $\frac{5}{2}$, знамен. = 2. 629. Число

зеренъ равно $2^{64}-1$, что составляетъ 18 446 744 073 709 551 615.

630. $x=1$. 631. $x=2$. 632. $x=9$. 633. $x=3$. 634. Посторонний корень $x=\frac{1}{3}$, удовлетворяющий уравнению $2-\sqrt{3x}=1$.

635. Посторонние корни: $x_1=4$, $x_2=3$, удовлетворяющие уравнению $x+\sqrt{25-x^2}=7$. 636. $x_1=4$, $x_2=3$. 637. $x=-3$; корень $x=4$ посторонний. 638. Посторонние корни: $x_1=12$, $x_2=5$.

639. $x_1=12$, $x_2=5$. 640. $x=49$. 641. $x=8$.

642. $x=5$. 643. $x_1=24$; корень $x_2=840$ посторонний, удовлетворяющий уравнению: $\sqrt{2x+1}-\sqrt{x+1}=12$. 644. $x_1=+2$, $x_2=-2$, $x_3=+1$, $x_4=-1$.

645. ± 3 , ± 1 . 646. $\pm\sqrt{3}$. 647. ± 3 .

$\pm\sqrt{-1}$. 648. $\pm\sqrt{3}$; $\pm\sqrt{-1}$. 649. ± 2 , $\pm\sqrt{-\frac{1}{2}}$. 650. ± 2 ,

корни $x=\pm\sqrt{-1}$ посторонние. 651. 1) q должно быть положительное число, меньшее 4; 2) q должно быть отриц. число; 3) q должно быть полож. число, большее 4; 4) $q=4$; 5) $q=0$.

652. $x=4+\sqrt{32}$, $y=-4+\sqrt{32}$; или $x=4-\sqrt{32}$, $y=-4-\sqrt{32}$.

653. $x=15\frac{1}{6}$, $y=9\frac{1}{6}$. 654. $x=2$, $y=4$; или $x=-2$, $y=-4$.

655. $x_1=5$, $y_1=3$, или $x_2=3$, $y_2=5$. 656. $x_1=4$, $y_1=2$;

или $x_2=1$, $y_2=4$. 657. $x=\frac{9+\sqrt{57}}{6}$, $y=\frac{-6\pm\sqrt{57}}{3}$. 658. $x=1$,

$y=2$. 659. $x_1=1$, $y_1=5$; $x_2=-\frac{47}{287}$, $y_2=-\frac{1237}{287}$. 660. Для x получаются 4 значения: 7, -7, 4 и -4; соответственно этимъ

значениямъ y будетъ: 4, -4, 7 и -7. 661. $x=\frac{b\pm\sqrt{2ab-a^2}}{2}$,

$y=\frac{b\pm\sqrt{2ab-a^2}}{2}$. 662. 37. 663. 96. 664. 74. 665. 258.

666. 401. 667. 698. 668. 4835. 669. 8 или 9. 670. 3 или 4.

671. 1,7 или 1,8. 672. 1,9 или 2,0. 673. 1,3 или 1,4.

674. 0,94 или 0,95. 675. 3,04 или 3,05. 676. 1,4 или 1,5.

677. $\frac{6}{7}$ или $\frac{7}{7}$ (до $\frac{1}{7}$). 678. $\frac{1}{3}$ или $\frac{2}{3}$ (до $\frac{1}{3}$). 679. $\frac{5}{6}$ или $\frac{6}{6}$

(до $\frac{1}{6}$). 680. $\frac{3}{10}$ или $\frac{4}{10}$ (до $\frac{1}{10}$). 681. $\frac{5}{10}$ или $\frac{6}{10}$ (до $\frac{1}{10}$).

682. $\frac{7}{10}$ или $\frac{8}{10}$ (до $\frac{1}{10}$). 683. 1,28 или 1,29. 684. \sqrt{x} , \sqrt{a} .

$$\sqrt{(a+b)^3}=(a+b)\sqrt{a+b}. \quad 685. \sqrt{3}, \sqrt{2}, \sqrt{10}. \quad 686. \sqrt[3]{3a^2b^4} =$$

$$=b\sqrt[3]{3a^2b} \quad 687. ab\sqrt{2b} \quad 688. \sqrt[3]{11a^2b^2}. \quad 689. \sqrt[5]{2ab^4c^{10}}=c^2\sqrt[5]{2ab^4}.$$

$$690. b\sqrt[12]{12ab}. \quad 691. \sqrt[12]{2a} \text{ и } \sqrt[12]{a^2}. \quad 692. \sqrt[30]{x^{15}}, \sqrt[30]{y^{10}}, \sqrt[30]{z^6}.$$

$$693. \sqrt[6]{a^4}, \sqrt[6]{a} \quad 694. \sqrt[6]{8}, \sqrt[6]{25}. \quad 695. \sqrt[12]{16}, \sqrt[12]{27}. \quad 696. \sqrt[30]{3^{15}},$$

$$\sqrt[30]{4^6}, \sqrt[30]{12^5}. \quad 697. \sqrt[10]{\frac{1}{32}}, \sqrt[10]{\frac{9}{63}}, \sqrt[10]{\frac{1}{3}}. \quad 698. \sqrt[36]{y^{12}z^6}, \sqrt[36]{y^3z^6},$$

$$\sqrt[36]{y^4z^2}. \quad 699. 2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}, 5\sqrt{2}. \quad 700. \frac{2}{3}\sqrt{3}, \frac{4}{3}\sqrt{3}, \frac{7}{3}\sqrt{3}.$$

$$701. \sqrt[3]{4}, 2\sqrt[3]{2}, 3\sqrt[3]{4}. \quad 702. \frac{2}{5}\sqrt[3]{25}, \frac{4}{5}\sqrt[3]{25}, \frac{3}{5}\sqrt[3]{25}. \quad 703. a\sqrt{ax},$$

$$x\sqrt{ax}, \sqrt{ax}, \quad 704. 3ax\sqrt{2ax}, 2a^2x\sqrt{2ax}, \sqrt{2ax}. \quad 705. \frac{1}{x}\sqrt{ax}, \frac{1}{3a}\sqrt{ax},$$

$$x\sqrt{ax}, 0,5\sqrt{ax} \quad 706. \frac{x}{a}\sqrt{ab}, \frac{x^2}{b}\sqrt{ab}, \frac{x^3}{ab}\sqrt{ab}. \quad 707. 8\sqrt{2} \quad 708. -13\sqrt{3}.$$

$$709. 1\frac{13}{15}\sqrt{15}. \quad 710. (2a^2b+ab-3)\sqrt{ab}. \quad 711. 2p^3x\sqrt{2px}. \quad 712. 4\sqrt[3]{a^2+}$$

$$+3\sqrt[3]{a}. \quad 713. 8a\sqrt[3]{2a^2}. \quad 714. -a\sqrt{1+x^2}. \quad 715. 3\sqrt[3]{4}. \quad 716. 15.$$

$$717. 180\sqrt{25}. \quad 718. 6a^3. \quad 719. \frac{16x}{a}. \quad 720. 4ab^3. \quad 721. \sqrt[6]{6750}.$$

$$722. 2\sqrt[12]{81}. \quad 723. \frac{1}{2}\sqrt[6]{\frac{1}{6}}. \quad 724. 8x^8\sqrt[8]{24x}. \quad 725. \sqrt[6]{2}. \quad 726. \sqrt[6]{40a^2} =$$

$$=2a\sqrt[6]{10}. \quad 727. 6\sqrt[4]{\frac{9}{10}}a=0,6\sqrt[4]{9000a}. \quad 728. 2a\sqrt[3]{2a}. \quad 729. 10\sqrt[3]{xz^9} =$$

$$=10z^3\sqrt[3]{x}. \quad 730. \sqrt[6]{x} \quad 731. \sqrt[6]{128}=2\sqrt[6]{2}. \quad 732. 4a\sqrt[6]{9m^2n}.$$

$$733. \frac{1}{4}ab\sqrt{2ab} \quad 734. a\sqrt[8]{16ax^2}=2a\sqrt[8]{2ax^2}. \quad 735. 9a^4x^2\sqrt[3]{(a+b)^2}.$$

$$736. (1+x)\sqrt{1+x}. \quad 737. x^9 \quad 738. 81a^9b^9\sqrt[3]{a^2b}. \quad 739. \sqrt[4]{\left(\frac{2a}{1+a}\right)^3}.$$

$$740. \sqrt[3]{3ax}. \quad 741. \sqrt{a}. \quad 742. -0,001a^7a^4. \quad 743. \frac{2}{81}ax^{4m+1}.$$

$$744. \sqrt[6]{a}. \quad 745. \sqrt[8]{a}. \quad 746. \sqrt[6]{ab}. \quad 747. \sqrt[6]{12}. \quad 748. \sqrt[4]{a^3}. \quad 749. \sqrt[8]{a^7}.$$

750. $\sqrt[6]{a^3} = \sqrt{a}$. 751. $\sqrt[8]{\frac{1}{16}a^7x^4}$. 752. $\sqrt{5} = 2, 23 \dots$ 753. $\sqrt{12} = 3, 46 \dots$
 754. $\sqrt{8} = 2, 82 \dots$ 755. $\sqrt[3]{\sqrt{117649}} = \sqrt[3]{343} = 7$. 756. $5 - 2\sqrt{6}$.
 757. $\sqrt[3]{a^2} - 4$. 758. $2a + 2\sqrt{a^2 - x^2}$. 759. $\frac{1}{2}$. 760. 2. 761. $8\sqrt{6} - 18$.
 762. $4a + 12\sqrt{ab} + 9b - 2\sqrt{ac} - 3\sqrt{bc} + \frac{1}{4}c$. 763. -12 . 764. $\frac{4x\sqrt{x^2 - a^2}}{a^2}$.
 765. $\frac{1}{1-x^2}$. 766. a^{-3} ; x^{-2} ; $(a+1)^{-1}$. 767. x^{-1} ; x^{-3} ; $(1+x)^{-2}$.
 768. $\frac{1}{25}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{16}$. 769. -1 ; $\frac{1}{4}$. 770. 8; 100. 771. $\frac{8}{125}$; $\frac{10000}{81}$.
 772. $a^{-2}b^{-1}$; $2a^{-3}b^{-4}$. 773. $\frac{1}{2}ax^{-1}$; $\frac{1}{3}a^{-1}xy^{-2}z^{-3}$. 774. $a(a+x)^{-1}$;
 $2a(a-x)^{-1}$. 775. $3ab(1+x)^{-2}(1-x)^{-3}$. 776. $a^0 = 1$; x ; x^{-1} . 777. $14a^4b^2$.
 778. $9a^0x^0y^3 = 9y^3$. 779. $35(a+b)^{-1}$. 780. a^9 ; x^{-3} . 781. x^4 ; x^{-4} .
 782. $2a^2b^3$. 783. $5ab^{-4}x^{-1}$. 784. a^{-8} ; a^{-8} ; a^8 . 785. $4a^4b^{-6}$.
 786. $4x^6y^4$. 787. $27(1-x)^{-6}(1+x)^6$. 788. $\frac{a^{-4}x^2}{b^2y^{-8}}$. 789. a^{-4} ; x^{-2} ;
 $(a+b)^{-1}$. 790. $2a^{-1}b^2c^{-3}$. 791. $3x^{-1}y^{-2}z^6$. 792. $\frac{2^6b^{12}c^{18}x^{12}y^6}{3^6a^{18}}$.
 793. $\frac{3y}{ax^3}$. 794. $4a^{-2} - 1$. 795. $a^{-4} - 2a^{-2} + 1$. 796. $4(a+x)^{-6}y^{10}z^{-4}$.
 797. $\frac{25}{49}a^{-4}b^3m^{-1}n^{-1}$. 798. $\frac{3}{a^2}$, $\frac{1}{a^2}$. 799. $\frac{1}{a^3}$, $\frac{2}{a^3}$. 800. $(a+b)^{\frac{1}{2}}$;
 $(1+x)^{\frac{1}{3}}$, $(1+x)^{\frac{2}{3}}$. 801. $a^{\frac{1}{2}}$, $x^{\frac{1}{2}}$, $x^{\frac{5}{2}}$. 802. $(2ab)^{\frac{1}{3}}$. 803. $(3a)^{\frac{1}{2}}$.
 $(2a)^{\frac{1}{3}}$. 804. $4(2a)^{\frac{1}{2}}$, $(6b^2x^{-1})^{\frac{1}{3}}$. 805. \sqrt{a} , $\sqrt[3]{a}$, $\sqrt[3]{a^2}$. 806. $\frac{1}{\sqrt{a}}$, $\frac{1}{\sqrt{a^2}}$.
 807. $\sqrt[3]{1+x}$, $\sqrt[3]{(1+x)^2}$. 808. $\sqrt[3]{3\sqrt{a}\sqrt{b}\sqrt{(1+x)^2}}$. 810. $x^{\frac{7}{6}}$.
 811. $a^{\frac{15}{4}}$. 812. $a^{\frac{13}{6}}$. 813. $\frac{5ax}{3y}$. 814. $a^{\frac{1}{4}}$, $a^{\frac{1}{4}}$. 815. $\frac{5}{2}(a-1)^{\frac{1}{3}}$.
 816. $5ac^{-\frac{1}{12}}$. 817. $\frac{1}{4}\sqrt[3]{3a^{-\frac{1}{3}}b^{-\frac{8}{3}}}$. 818. $a^{\frac{3}{2}}$; $a^{\frac{3}{2}}$; $a^{\frac{3}{8}}$. 819. a , a .
 820. $2ab^{\frac{1}{3}}$. 821. $3a^{-1}b^{\frac{1}{6}}c^{-\frac{1}{6}}$. 822. $a^{\frac{1}{4}}$, $a^{\frac{1}{6}}$. 823. $(1-x)^{\frac{1}{3}}$.

824. $(a+b)^{-\frac{1}{6}}$. 825. $2a^{-\frac{1}{3}}b^{0,1}$. 826. $a+b - 2a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}$. 827. $x^{\frac{4}{3}} -$
 $-x^{\frac{2}{3}}$. 828. $4a^{\frac{2}{3}} + 2a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{4}b$. 829. $x^{-1} + 2x^{\frac{5}{6}} + x^{\frac{2}{3}} - 2x^0 - 2x^{\frac{1}{6}} + x$.
 830. $a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{12}}c^{-\frac{8}{3}}d^{-\frac{4}{3}}(a+b)^2$. 831. $\log_{10}1 = 0$; $\log_{10}10 = 1$;
 $\log_{10}100 = 2$; $\log_{10}0,1 = -2$; $\log_a N = x$. 832. $1000 = 10^3$;
 $0,001 = 10^{-3}$; $4 = 16^{\frac{1}{2}}$; $P = a^y$. 833. 1, 2, -1 , -2 , $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$;
 $\frac{1}{4}$, $-\frac{1}{4}$. 834. 1, 2, 3, 4; -1 , -2 , -3 , -4 . 835. 12; 6;
 4; 3; 1; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$. 836. $2 \log a + 3 \log b$. 837. $\log 5 + 3 \log a +$
 $+ 2 \log x$. 838. $3(\log m + \log n)$. 839. $\log 2 + 2 \log a - \log 3 -$
 $- 3 \log b$. 840. $\log 4 + 3 \log a - 3 \log b - \log 5 - \log m - 4 \log n$
 $- \frac{1}{2} \log x$. 841. $\frac{1}{2}(\log a + \log b)$. 842. $\frac{1}{3}(\log 7 + 3 \log a + \log b)$.
 843. $\log 4 + \frac{1}{5}(\log 2 + \log a + 3 \log b)$. 844. $\log 7 + 3 \log a + \log b +$
 $+ \frac{1}{3} \log c$. 845. $\frac{1}{2}(\log 10 + \log a + \frac{2}{3} \log b)$. 846. $\frac{1}{2}[\log a + \frac{1}{3}(\log b +$
 $+ \frac{1}{2} \log c)] = \frac{1}{2} \log a + \frac{1}{6} \log b + \frac{1}{12} \log c$. 847. $2 \log a + \frac{1}{2}(\log 2 + \log b) -$
 $- \log 8 - 3 \log x - 2 \log y$. 848. $\log(a+b) + \log(a-b)$.
 849. $2 \log(a-b)$. 850. $x = ab$. 851. $x = \frac{a}{b}$. 852. $x = a^2$.
 853. $x = \frac{a^2b^3}{c}$. 854. $x = \sqrt{a}$. 855. $x = \sqrt[3]{ab}$. 856. $x = \sqrt{a\sqrt{b\sqrt[3]{c^2}}}$.
 857. 0, 1, 2, 3; 0; 8; 1; 4; 1, 1, 3. 858. $\bar{3}, 62195$; $\bar{2}, 92620$;
 $\bar{1}, 99660$, $\bar{6}, 44000$. 859. $-1, 26436$; $-0, 91963$; $-3, 92370$;
 $-0, 99770$. 860. -1 , -2 , -3 , -5 , -7 . 861. $\bar{1}$, $\bar{1}$, $\bar{2}$, $\bar{3}$,
 $\bar{4}$, $\bar{6}$. 862. 0,95424; 1,41497; 2,75315; 1,76005; 0,87005;
 1,87961. 863. 4,75088. 864. 1,00015. 865. $\bar{2}, 57803$.
 866. 737, 3; 22, 37; 1,026; 1384. 867. 46,0077... 868. 204,857...
 869. 3,23653... 870. 0,380733... 871. 5580, 875. 872. 0,082514.
 873. 0,231873... 874. 0,000122066... 875. $\bar{4}, 69924$; 0,41649.
 876. $\bar{4}, 29302$; 1,62667. 877. $\bar{9}, 18203$. 878. $\bar{6}, 61665$.
 879. $\bar{88}, 20320$. 880. $\bar{6}, 68208$. 881. 4,87773. 882. 56,11310.
 883. $\bar{3}, 15775$. 884. $\bar{1}, 40549$. 885. $\bar{1}, 83391$. 886. $\bar{1}, 78678$.
 887. 2,48544... 888. 0,933125. 889. 26,0641. 890. 11767,8.

891. 1,54. 892. 1937,23. 893. —1678,65. 894. —3,2573.

895. 7,15966... 896. 1,23531. 897. —0,78106. 898. 8763 р. 20 к.

899. 49860 р. 900. 32880700 чел. 901. Въ 14 съ небольшимъ лѣтъ. 902. Около $17\frac{1}{2}$ лѣтъ. 903. 30402 р.

904. По 5%. 905. Черезъ 7 лѣтъ. 906. Образуется

сумма рублей: $6000 \cdot 1,05^{10} + 400(1,05^9 + 1,05^8 + 1,05^7 + \dots + 1) =$
 $= 6000 \cdot 0,05^{10} + 400 \cdot \frac{1,05^{10} - 1}{0,05}$, что составитъ 14804 р.

907. Къ концу 6-го года долгъ будетъ $5000 \cdot 1,06^6 -$
 $- 400(1,06^5 + 1,06^4 + \dots + 1) = 5000 \cdot 1,06^6 - 400 \cdot \frac{1,06^6 - 1}{0,06}$, что со-
ставитъ 9883 р.